

口腔专业·2018.11.26·空暇记忆·口组（8-10）

第八单元 龋病

牙釉质龋按其发生的部位可分为平滑面龋和窝沟龋。

1. 早期牙釉质龋，无明显缺损，病损呈（ ），顶朝向釉牙本质界，淡棕黄色。典型的病变由里及表可分为四层：透明层、（ ）、病损体部、表层。
2. 牙本质龋镜下改变由里及表可分为下列四层：透明层、脱矿层、（ ）、坏死崩解层。
3. 牙骨质龋好发于（ ），引起牙骨质龋的细菌常沿着穿通纤维的方向侵入，并沿着牙骨质生长线向四周扩散，使牙骨质脱矿，有机物分解。

第九单元 牙髓炎

一、急性牙髓炎

急性牙髓炎多数由牙髓充血发展而来或为（ ）的急性发作，常因深龋感染牙髓所致。

急性牙髓炎	特点
急性浆液性牙髓炎	以浆液渗出为主，严重水肿
急性化脓性牙髓炎	牙髓中有大量的中性粒细胞浸润，形成脓肿

二、慢性牙髓炎

慢性牙髓炎是牙髓炎中最常见者。根据牙髓腔是否穿通将慢性牙髓炎分为慢性闭锁性牙髓炎和慢性溃疡性牙髓炎和慢性增生性牙髓炎（牙髓息肉）。

慢性牙髓炎	特点	组织病理
慢性闭锁性牙髓炎	非开放	含有肉芽组织为慢性牙髓炎特点
慢性溃疡性牙髓炎	穿髓孔较大，暴露的牙髓表面有溃疡形成	
慢性增生性牙髓炎	穿髓孔极大，龋洞内充满柔软红色息肉，探诊易出血。	

第十单元 根尖周炎

第一节 急性根尖周炎

常见的排脓途径有：

1. 经黏膜下或皮下排脓，此为（ ）的排脓途径。
2. 通过根管自龋洞至口腔，因其对周围组织破坏较小，故为（ ）的排脓途径。
3. 沿牙周膜自龈沟或牙周袋排脓，多见于乳牙及有深牙周袋的牙。

急性根尖周炎	特点
急性浆液性根尖周炎	浆液渗出，组织水肿
急性化脓性根尖周炎	大量中性粒细胞游出血管，形成小脓肿。

第二节 慢性根尖周炎

慢性根尖周炎常见类型是慢性根尖脓肿、根尖肉芽肿和根尖囊肿三种类型。

一、慢性根尖脓肿

慢性根尖脓肿又称慢性（ ）脓肿，病变可分为无瘘型和有瘘型。肉芽组织的外周包绕着纤维结缔组织。上皮来源：malassez上皮剩余肉芽组织内口腔上皮或皮肤表皮。

二、根尖肉芽肿

上皮可能来源于：①malassez上皮剩余。②经瘘管口长入的口腔黏膜上皮或皮肤上皮。

③牙周袋上皮。④呼吸道上皮，这种情况见于病变与上颌窦或鼻腔相通的病例。

三、根尖囊肿

根尖囊肿是颌骨内（ ）的牙源性囊肿。相关牙拔除后，若其根尖炎症未作适当处理而继发囊肿，则称为残余囊肿。

慢性根尖周炎(X线诊断标准)	特点
慢性根尖脓肿	中央为坏死液化组织和脓细胞, 脓肿周围为炎性肉芽组织
根尖肉芽肿	根尖部为肉芽组织内含泡沫细胞, 含铁血黄素和胆固醇晶体沉积
根尖囊肿	囊壁可分为内、外两层, 囊腔内含棕黄色透明囊液 囊液含胆固醇结晶

金英杰·全国专业备考