

110-1

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

**2019 年临床执业医师资格考试  
模拟试卷  
(医学综合笔试部分)**

报考类别：临床执业医师

第一单元

考生姓名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_

考场号：\_\_\_\_\_

## 答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

# 第一单元

## A1 型题

### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1.《执业医师法》明确规定,医师在执业过程中应当履行的职责是

- A.以病人为中心,实行人道主义精神
- B.防病治病,救死扶伤,保护人民健康
- C.防病治病,救死扶伤
- D.遵守职业道德,保护患者隐私
- E.树立敬业精神,尽职尽责为患者服务

2.某地级市卫生行政部门接到举报,称市中心医院妇产科主治医师陶某违反《母婴保健法》及其实施办法相关规定,未经市级卫生行政部门批准擅自从事母婴保健专项技术服务,经查证举报属实,依法给予陶某行政处罚。陶某的违法行为是

- A.擅自开展宫腔镜手术
- B.擅自从事助产技术服务
- C.擅自开展孕妇营养咨询和指导
- D.擅自开展婴儿保健
- E.擅自从事婚前医学检查

3.未经患者或其家属同意,对患者进行实验性治疗的,由卫生行政部门给予的处理是

- A.暂停执业活动 3~6 个月
- B.给予行政处分
- C.暂停执业活动 6 个月~12 个月
- D.吊销医师执业证书
- E.追究刑事责任

4.不按规定使用麻醉药品、精神药物,情节严重的,由卫生行政部门给予的处理是

- A.暂停执业活动 3~6 个月

B.给予行政处分

C.吊销医师执业证书

D.暂停执业活动 6 个月~1 年

E.追究刑事责任

5.医务人员收受药品生产企业的财物,情节不严重时,应对其给予的处罚是

A.警告

B.没收违法所得

C.追究刑事责任

D.吊销执业证书

E.罚款

6.因抢救急危患者,未能及时书写病历的,有关医务人员应在抢救结束后据实补记,并加以注明,其期限是

A.6 小时内

B.2 小时内

C.4 小时内

D.8 小时内

E.12 小时内

7.男,70 岁。因腹主动脉瘤在某市级医院接受手术治疗,术中发生大出血,经抢救无效死亡。其子女要求复印患者在该医院的全部病历资料,而院方只同意复印其中一部分。根据《医疗事故处理条例》规定,其子女有权复印的病历资料是

A.疑难病例讨论记录

B.手术及麻醉记录单

C.上级医师查房记录

D.死亡病例讨论记录



配套名师高清视频

- E. 会诊意见
8. 糖尿病患者尿量增多的原因是
- 饮水过多
  - 肾小球滤过率增高
  - 小管液溶质浓度过高
  - 肾交感神经紧张度降低
  - 肾小管重吸收 NaCl 量增加
9. CO<sub>2</sub> 在血液中最主要的运输形式是
- 去氧血红蛋白
  - 氨基甲酰血红蛋白
  - 物理溶解
  - 碳酸氢盐
  - 氧合血红蛋白
10. 肾小球滤过膜中, 阻挡大分子物质滤过的主要屏障是
- 肾小囊脏层足细胞足突
  - 肾小球毛细血管内皮细胞
  - 肾小囊脏层足细胞足突裂隙膜
  - 肾小球毛细血管内皮下基膜
  - 肾小囊脏层足细胞胞体
11. 患者经抗肿瘤治疗后尿检发现大量葡萄糖和氨基酸, 推测其肾单位受损部位是
- 近端小管
  - 肾小球
  - 集合管
  - 髓祥升支粗段
  - 远端小管
12. 肾小管对 HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 重吸收的叙述错误的是
- 主要在近端小管重吸收
  - 与 H<sup>+</sup> 的分泌有关
  - 以 CO<sub>2</sub> 的形式重吸收
  - 需碳酸酶的参与
  - 滞后于 Cl<sup>-</sup> 的重吸收
13. 用力牵拉肌肉时, 肌张力突然降低的原因是
- 肌梭抑制
  - 拮抗剂抑制
  - 骨骼肌疲劳
  - 协同肌兴奋
  - 腱器官兴奋
14. 特异性投射系统的特点是
- 对催眠药和麻醉药敏感
  - 点对点投射到大脑皮层特定区域
  - 上行激活系统是其结构
  - 改变大脑皮层兴奋状态是其功能
  - 弥散投射到大脑皮层广泛区域
15. 能引起骨骼肌神经-肌接头处产生终板电位的神经递质是
- 去甲肾上腺素
  - 谷氨酸
  - 乙酰胆碱
  - 多巴胺
  - 肾上腺素
16. 属于牵涉痛的情况
- 胆囊炎患者 Murphy 征阳性
  - 阑尾炎患者麦氏点压痛阳性
  - 冠心病患者胸骨后疼痛
  - 右下肺炎患者右肩部疼痛
  - 肋间神经炎患者电击样痛
17. 影响神经纤维动作电位幅度的主要因素是
- 刺激强度及刺激时间
  - 细胞内、外的 Na<sup>+</sup> 浓度差
  - 阈电位水平
  - 锋电位
  - 神经纤维的长度
18. 下列各项生理功能活动中, 属于条件反射的是
- 异物接触角膜引起眼睑闭合
  - 闻到食物香味引起唾液分泌
  - 强光刺激视网膜引起瞳孔缩小
  - 咀嚼、吞咽食物引起胃酸分泌
  - 叩击股四头肌肌腱引起小腿前伸
19. 对脑和长骨的发育最为重要的激素是
- 雌性激素
  - 甲状腺激素
  - 雄性激素
  - 甲状旁腺激素

- E.生长激素
- 20.月经周期中,促进卵泡发育成熟的主要激素是
- A.雌激素  
B.人绒毛膜促性腺激素  
C.黄体生成素  
D.卵泡刺激素  
E.孕激素
- 21.引起肺泡回缩的主要因素是
- A.大气压  
B.肺内压  
C.胸膜腔内压  
D.肺泡表面张力  
E.支气管平滑肌收缩
- 22.下丘脑控制生物节律日周期节律的关键部位是
- A.室旁核  
B.外侧区  
C.视前区  
D.腹内侧区  
E.视交叉上核
- 23.兴奋性突出后电位是由于突出后膜提高了对下列哪些离子的通透性引起的
- A. $\text{Na}^+$ , $\text{K}^+$ ,尤其是 $\text{Na}^+$   
B. $\text{K}^+$ , $\text{Na}^+$ ,尤其是 $\text{K}^+$   
C. $\text{Cl}^-$ , $\text{Na}^+$ ,尤其是 $\text{Cl}^-$   
D. $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Na}^+$ ,尤其是 $\text{Ca}^{2+}$   
E. $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Na}^+$ ,尤其是 $\text{Na}^+$
- 24.医患关系出现物化趋势的最主要原因是
- A.患者过多依赖医学高技术的检测手段  
B.医学高技术手段的大量应用  
C.医院分科越来越细,医生日益专业  
D.患者对医生的信任感降低  
E.医生工作量加大
- 25.现代医学伦理学中,对生命的看法已转变为
- A.生命价值论  
B.生命质量论

- C.生命神圣论  
D.生命质量与生命价值相统一的理论  
E.生命神圣与生命质量生命价值相统一的理论
- 26.1948年,世界医学大会以希波克拉底誓词为蓝本,形成了著名的
- A.《悉尼宣言》  
B.《阿拉木图宣言》  
C.《日内瓦宣言》  
D.《赫尔辛基宣言》  
E.《医学伦理学日内瓦协议法》
- 27.下列符合临终关怀伦理要求的做法是
- A.满足临终患者结束生命的要求  
B.帮助临终患者抗拒死亡  
C.优先考虑临终患者家属的权益  
D.尽力满足临终患者的生活需求  
E.建议临终患者选择安乐死
- 28.下列符合动物实验伦理要求的是
- A.对医学研究中的低等动物无需考虑人道问题  
B.尽可能用高等动物代替低等动物  
C.医学研究的科学性不能以牺牲动物的福利为代价  
D.尽可能用活体动物代替无知觉的实验材料  
E.用尽可能少的实验动物获得尽可能多的实验数据
- 29.由于伦理方面的原因,目前尚未在人类身上成为现实的辅助生殖技术是
- A.体外授精  
B.代孕技术  
C.无性生殖  
D.同源人工授精  
E.异源人工授精
- 30.简单的工作因情绪压力而提高学习效率,而复杂的工作则受压力而降低效率的是
- A.沙赫特-辛格的二因素学说  
B.阿诺德的认知评价学说



配套名师高清视频

- C.叶克斯-杜德生法则  
 D.坎农-巴德法则  
 E.詹姆斯-兰格法则
- 31.医患交流中,能够使得沟通更为有效与顺畅的方法是
- A.尽量多用书面沟通  
 B.避免表达态度和情感  
 C.尽量使用医学术语  
 D.善用问句引导话题  
 E.提供的信息越多越好
- 32.心理应激对健康影响的生理机制是
- A.心理-神经-免疫机制  
 B.心理-神经-内分泌中介机制  
 C.塞里的全身适应综合征  
 D.心理-神经中介机制  
 E.以上都正确
- 33.某种心理测验在某一人群中测查结果的标准量数是
- A.信度  
 B.常模  
 C.量表  
 D.效度  
 E.标准化
- 34.精神分析学派认为,在心理地形图中,当前能被注意到的各种心理活动为
- A.想象  
 B.意识  
 C.前意识  
 D.表象  
 E.潜意识
- 35.不适合采取心理治疗的心理障碍是
- A.性行为障碍  
 B.儿童行为障碍  
 C.综合性医院的非精神病  
 D.适应问题  
 E.精神分裂症急性发作期
- 36.关于随机抽样研究中,下列描述哪项是错误的
- A.采集样本应遵循随机化原则  
 B.实行抽样时,要使总体中每个个体都有同等机会被抽到  
 C.调查者可在总体中随意抽取任意部分作为样本  
 D.抽取的样本对总体要有代表性  
 E.严格控制的随机抽样有助于减少样本的偏性
- 37.如果需要比较3~5个月男婴与7~8岁男童的身高变异程度,应采用下列何种指标
- A.x  
 B.S  
 C.Sx  
 D.CV  
 E.Sp
- 38.对正态分布曲线的描述错误的是
- A.正态分布曲线以均数为中心  
 B.正态分布曲线上下完全对称  
 C.正态分布曲线是左右完全对称的钟形曲线  
 D.正态分布曲线由两个参数固定  
 E.正态分布曲线在横轴均数上方所在处曲线为最高点
- 39.有关筛检,错误的是
- A.目的是早期发现罕见病病例  
 B.应能迅速出结果  
 C.筛检试验应费用低廉  
 D.检查对象为表面上无病的人  
 E.筛检试验应对人体无害
- 40.两样本均数比较的t检验,其目的是检验
- A.两样本均数是否相等  
 B.两样本所属的总体均数是否相等  
 C.两样本所属总体的均数相差有多大  
 D.两样本所属总体的均数为多大  
 E.两样本均数相差有多大
- 41.某医师欲采用横断面调查研究的方法,调查高血压病在人群中的分布情况,选择最合适的指标为

- A.病死率
- B.发病率
- C.死亡率
- D.患病率
- E.二代发病率

42.某学者在某镇开展了一项持续多年的啤酒狂欢节饮酒者与心血管疾病死亡关系的研究。研究初,有70名啤酒狂欢节饮酒者和1500名未饮酒者,在研究结束时,7名啤酒狂欢节饮酒者死于心血管疾病,45名啤酒狂欢节未饮酒者死于心血管疾病。该研究为

- A.生态学研究
- B.临床试验
- C.病例对照研究
- D.队列研究
- E.横断面研究

43.分析胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关,可以选用的统计方法是

- A.t 检验
- B.F 检验
- C. $X^2$  检验
- D.相关分析
- E.秩和检验

44.肌肉组织中氨基酸脱氨基的主要方式是

- A.转氨基作用
- B.氧化脱氨基作用
- C.联合脱氨基作用
- D.嘌呤核苷酸循环
- E.非氧化脱氨基作用

45.下列关于尿素循环的叙述正确的是

- A.分解尿素提供能量
- B.全部在线粒体内发生
- C.将有毒的物质转变为无毒的物质
- D.合成尿素不需要能量
- E.全部在细胞质内进行

46.不参加尿素循环的氨基酸是

- A.赖氨酸

- B.精氨酸
- C.鸟氨酸
- D.天冬氨酸
- E.精氨酸代琥珀酸

47.将骨骼肌中生成的氨转运至肝的主要氨基酸是

- A.亮氨酸
- B.缬氨酸
- C.甘氨酸
- D.脯氨酸
- E.丙氨酸

48.一碳单位的载体是

- A.二氢叶酸
- B.四氢叶酸
- C.生物素
- D.焦磷酸硫胺素
- E.硫辛酸

49.嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸合成的共同原料是

- A.丙氨酸
- B.谷氨酸
- C.甘氨酸
- D.天冬酰胺
- E.天冬氨酸

50.运输内源性甘油三酯的脂蛋白是

- A.IDL
- B.VLDL
- C.LDL
- D.CM
- E.HDL

51.胆固醇不能转化为

- A.维生素 D
- B.雄激素
- C.雌激素
- D.醛固酮
- E.胆色素

52.下列关于酮体的描述错误的是

- A.酮体包括乙酰乙酸, $\beta$ -羟丁酸和丙酮
- B.合成原料是丙酮酸氧化生成的乙



配套名师高清视频

## 酰 CoA

- C.可以在肝的线粒体内生成
- D.酮体只能在肝外组织氧化
- E.酮体是肝输出能量的一种形式

53.下列关于胆色素的叙述,正确的是

- A.以血红素为主要成分
- B.胆汁酸为其代谢终产物
- C.在血中主要与球蛋白结合而运输
- D.铁卟啉化合物的分解代谢产物
- E.可以转变成细胞色素

54.可抑制细胞氧化磷酸化速率的物质是

- A.磷酸戊糖
- B.胰岛素
- C.细胞色素 C
- D.一氧化碳
- E.磷酸激酶

55.大鼠出生后饲以去脂饮食,结果将引起下列哪种脂质缺乏

- A.磷脂酰胆碱
- B.甘油三脂
- C.鞘磷脂
- D.胆固醇
- E.前列腺素

56.体内脂肪大量动员时,肝内生成的乙

酰 CoA 主要生成

- A.胆固醇
- B.二氧化碳和水
- C.葡萄糖
- D.酮体
- E.草酰乙酸

57.关于脂肪酸  $\beta$  氧化的叙述错误的是

- A.酶系存在于线粒体中
- B.不发生脱水反应
- C.需要 FAD 及  $\text{NAD}^+$  为受氢体
- D.脂肪酸的活化是必要的步骤
- E.每进行一次  $\beta$  氧化产生 2 分子乙

酰 CoA

58.与“黑死病”有关的病原菌是

- A.炭疽芽胞杆菌

- B.幽门螺杆菌
- C.白喉棒状杆菌
- D.嗜肺军团菌
- E.鼠疫耶氏菌

59.以下不能引起性病的病原微生物是

- A.梅毒螺旋体
- B.沙眼衣原体
- C.风疹病毒
- D.解脲支原体
- E.淋球菌

60.淋病奈瑟菌的形态特点是

- A.革兰阴性双球菌
- B.革兰阴性球杆菌
- C.革兰阴性螺形菌
- D.革兰阳性四联球菌
- E.革兰阳性链球菌

61.老年人动脉粥样硬化引起的脑萎缩属于

- A.神经性萎缩
- B.废用性萎缩
- C.压迫性萎缩
- D.营养不良性萎缩
- E.生理性萎缩

62.下列病变中属于不可逆性改变的是

- A.细胞水肿
- B.线粒体膜破裂
- C.核碎裂
- D.线粒体肿胀
- E.粗面内质网脱颗粒

63.慢性支气管炎患者发生阻塞性通气功能障碍的病变基础是

- A.支气管,上皮细胞变性、坏死
- B.支气管平滑肌萎缩
- C.支气管软骨萎缩、纤维化
- D.支气管腺体增生、肥大
- E.细支气管炎及细支气管周围炎

64.细胞坏死的主要形态学特征是

- A.核分裂
- B.细胞核异型



- C. 线粒体肿胀  
D. 细胞核碎裂  
E. 细胞质脂质增多
65. 梗死与坏疽的主要区别是  
A. 动脉阻塞的程度  
B. 静脉回流的好坏  
C. 有无明显腐败菌感染  
D. 病变的严重程度  
E. 发生的部位
66. 肝硬化时, 脾肿大的主要原因是  
A. 脾窦巨噬细胞增多  
B. 脾索纤维组织增生  
C. 脾窦淋巴细胞聚集  
D. 淋巴小结内大量中性粒细胞浸润  
E. 脾窦扩张红细胞淤滞
67. 下列哪种组织细胞再生能力最强  
A. 骨组织  
B. 神经节细胞  
C. 上皮细胞  
D. 心肌细胞  
E. 平滑肌细胞
68. 下列哪种新生的细胞是机化时出现的特征细胞  
A. 平滑肌细胞  
B. 成纤维细胞  
C. 类上皮细胞  
D. 横纹肌细胞  
E. 上皮细胞
69. 男, 45 岁。HBsAg(+)20 年。超声检查: 肝脏回声不均匀, 脾大, 门静脉增宽, 中等量腹水。肝穿刺病理的特征性发现是  
A. 肝细胞变性坏死  
B. 弥漫性肝纤维化  
C. 肝细胞气球样变  
D. 毛细胆管胆汁淤积  
E. 假小叶形成
70. 栓塞时常伴有 DIC 发生, 主要见于下列哪种栓塞  
A. 血栓栓塞  
B. 脂肪栓塞  
C. 羊水栓塞  
D. 空气栓塞  
E. 化脓菌栓塞
71. 急性心力衰竭导致下列哪项病变  
A. 肺气肿  
B. 肺不张  
C. 肺水肿  
D. 肺脓肿  
E. 肺褐色硬化
72. 股骨骨折后因处理不当, 大量脂肪滴进入血液, 该脂肪栓子常栓塞于  
A. 左心室  
B. 左心房  
C. 肺静脉及其分支  
D. 主动脉分支  
E. 肺动脉及其分支
73. 贫血性梗死主要发生于  
A. 心, 肠, 肾  
B. 心, 肺, 脾  
C. 心, 肾, 脾  
D. 大脑, 肺, 肾  
E. 小肠, 肝, 心
74. 硫脲类抗甲状腺作用是由于  
A. 抑制垂体前叶促甲状腺素的分泌  
B. 抑制甲状腺对碘的摄取  
C. 抑制碘离子的氧化和碘化酪氨酸的缩合  
D. 抑制甲状腺球蛋白的水解, 使甲状腺素释放减少  
E. 加速甲状腺素的破坏
75. 延缓肠道碳水化合物吸收的是  
A. 磺脲类降血糖药  
B. 双胍类降血糖药  
C.  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂  
D. 噻唑烷二酮类  
E. 胰岛素
76. 关于第三代头孢菌素的特点描述正确的是



配套名师高清视频

A.对铜绿假单胞菌作用较弱  
B.主要用于轻、中度呼吸道和尿路感染  
C.对革兰阴性菌有较强的作用  
D.对肾脏毒性较第一、二代头孢菌素大  
E.对 $\beta$ 内酰胺酶的稳定性较第一、二代头孢菌素低

77.红霉素是下列哪种疾病的首选用药

- A.支原体肺炎
- B.感染性心内膜炎
- C.立克次体感染
- D.斑疹伤寒
- E.泌尿道感染

78.对铜绿假单胞菌作用最强的氨基苷类抗生素是

- A.卡那霉素
- B.庆大霉素
- C.阿米卡星
- D.妥布霉素
- E.链霉素

79.普萘洛尔的药理作用为

- A.松弛支气管平滑肌
- B.升高眼内压
- C.拮抗交感神经活性
- D.促进肾素释放
- E.促进血小板聚集

80.延缓普鲁卡因局部吸收的药物是

- A.去甲肾上腺素
- B.异丙肾上腺素
- C.胰岛素
- D.肾上腺素
- E.庆大霉素

81.不属于苯二氮草类药物的作用特点是

- A.具有抗焦虑作用
- B.具有外周性肌松作用
- C.具有催眠作用
- D.具有镇静作用
- E.用于癫痫持续状态

82.下列哪一作用与阿司匹林引起的反应无关

- A.上腹不适、恶心、呕吐
- B.出血时间延长
- C.荨麻疹
- D.头痛、眩晕、耳鸣、视听力减退
- E.口干、出汗、心悸

83.增加左旋多巴抗帕金森氏病疗效,减少不良反应的药物是

- A.卡比多巴
- B.维生素 $B_6$
- C.利血平
- D.苯乙肼
- E.丙胺太林

84.产妇临产前2~4小时内不宜使用的药物是

- A.哌替啶
- B.丙磺舒
- C.阿司匹林
- D.喷他佐辛
- E.布洛芬

85.下列药物中对脑血管具有较强扩张作用的钙拮抗药是

- A.硝苯地平
- B.维拉帕米
- C.尼群地平
- D.地尔硫革
- E.尼莫地平

86.胎儿娩出前2~4小时内不宜使用的镇痛药物是

- A.喷他佐辛
- B.哌替啶
- C.布洛芬
- D.对乙酰氨基酚
- E.丙磺舒

87.治疗细菌性痢疾最常选用的药物是

- A.磺胺嘧啶
- B.多西环素
- C.妥布霉素
- D.阿米卡星
- E.庆大霉素

- 88.关于新型隐球菌的特点,下列哪项错误
- 主要经消化道传播
  - 主要存在于土壤和鸽粪中
  - 多数是外源性感染
  - 最易侵犯中枢神经系统
  - 菌体外有肥厚的荚膜
- 89.初次体液免疫应答产生抗体的特点是
- 滴度高
  - 亲和力低
  - 主要为 IgG
  - 主要为 IgA
  - 持续时间长
- 90.关于 IL-2 的生物学效应,错误的是
- 以自分泌和旁分泌方式发挥作用
  - 抑制 Th1 细胞分泌 IFN- $\gamma$
  - 增强 NK 细胞、单核细胞的杀伤活性
  - 促进 T 细胞和 B 细胞的增殖分化
  - 诱导 LAK 细胞形成
- 91.属于 II 型超敏反应性疾病的是
- 过敏性休克
  - 血清病
  - 荨麻疹
  - 过敏性鼻炎
  - 新生儿溶血
- 92.属于黏膜免疫系统的免疫器官是
- 扁桃体
  - 脾脏
  - 骨髓
  - 胸腺
  - 肝脏
- 93.解除免疫耐受的方法是
- 注射大量耐受原
  - 注射糖皮质激素
  - 注射与耐受原有共同抗原决定簇的抗原
  - 切除动物胸腺
  - 以亚致死量 X 线照射动物
- 94.与自身免疫性疾病的发生无关的是
- 长期使用广谱抗生素
  - 某些与自身组织成分具有共同抗原性的微生物感染
  - 自身组织或器官 MHC-II 类抗原的异常表达
  - 隐蔽抗原的释放
  - 机体免疫系统功能失常
- 95.作为乙型肝炎病毒感染者,哪种指标是病毒复制的标志
- HBeAg
  - HBsAg
  - HBcAg
  - 抗 HBe
  - 抗 HBs
- 96.树突状细胞有别于其他 APC 的特点是
- 刺激活化的 T 细胞增殖
  - 刺激记忆 T 细胞增殖
  - 刺激初始 T 细胞增殖
  - 刺激 CD4<sup>+</sup>T 细胞增殖
  - 刺激 CD8<sup>+</sup>T 细胞增殖
- 97.与 B 细胞活化第二信号产生密切相关的膜表面分子间的作用是
- B7 分子与 CD28 分子之间的相互作用
  - CD4 分子与 MHC-II 类分子间的相互作用
  - BCR-Ig $\alpha$ /Ig $\beta$  复合物与抗原间的相互作用
  - IL-2 与 IL-2R 间的相互作用
  - CD40L 与 CD40 分子间的相互作用
- 98.女,32 岁。神经衰弱 3 个月余,未经治疗,主要表现为头痛,失眠,脑力疲乏,精神易兴奋。应选择的治疗药物是
- 利培酮
  - 氯氮平
  - 地西泮
  - 喹硫平
  - 氯丙嗪
- 99.女,43 岁。乏力、厌食、嗜睡 5 年,逐渐加重 2 年,20 年前产后大出血休克,昏迷



配套名师高清视频

7 小时,产后闭经至今。具体治疗不详,近 3 年多中断治疗。首选的治疗药物是

- A. 雌激素
- B. 血管加压素
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 孕激素
- E. 左旋甲状腺素钠

100. 女,30 岁。3 个月来工作较累,近 3 周来出现兴趣缺乏,易疲劳,言语少,动作迟缓,自觉脑子笨,没有以前聪明,早醒,食欲减退,腹胀,便秘,全身酸痛,有时感心悸、气急。总觉自己患了不治之症,给家庭带来许多麻烦。该患者最可能的诊断是

- A. 焦虑症
- B. 抑郁症
- C. 疑病症
- D. 神经衰弱
- E. 心身疾病

101. 男,30 岁。饥饿性上腹痛 2 年,进食后可缓解。胃镜检查:十二指肠溃疡愈合期,快速尿素酶试验阳性。最有效的治疗方案是

- A. 奥美拉唑+枸橼酸铋钾+克拉霉素
- B. 法莫替丁+阿莫西林+克拉霉素
- C. 西咪替丁+克拉霉素+诺氟沙星
- D. 奥美拉唑+阿莫西林+替硝唑
- E. 奥美拉唑+硫糖铝

102. 女,40 岁。闭经、溢乳半年,磁共振发现垂体 1.5 cm×1.0 cm 占位病变,需做激素检查。下列无助于诊断的检查是

- A. 血管加压素
- B. 生长激素
- C. 促肾上腺皮质激素
- D. 泌乳素
- E. 促甲状腺激素

103. 女,26 岁。患重症肌无力 5 年,因感臀后肌无力加重,大量服用溴化吡啶斯的明后出现流口水、大量出汗、肌束颤动、腹痛。此种表现是由于

- A. 乙酰胆碱(ACh)神经元的后发放

B. 中枢 ACh 神经元传递减慢

C. 神经肌肉接头处 ACh 兴奋传递加速

D. ACh 毒蕈碱样作用亢进

E. ACh 烟碱样作用亢进

104. 男,56 岁。间断发热 1 个月,进行性少尿、咯血 10 天,查体:BP 165/100 mmHg,双肺听诊可闻及湿啰音。双下肢水肿。尿常规:蛋白(++)。尿沉渣镜检:RBC40~50/HP。血肌酐 455 μmol/L,血尿素 18.5 mmol/L,ANA(-),抗中性粒细胞胞浆抗体(+). B 超示双肾增大。该患者肾脏最可能的病理特征是

- A. 肾小球纤维化,玻璃样变
- B. 弥漫性 GBM 增厚,钉突形成
- C. 新月体形成
- D. 系膜局灶性节段性增宽或弥漫性增宽
- E. 系膜局灶性节段性硬化、玻璃样变性

105. 男,34 岁。腰背部疼痛 3 个月,伴有乏力、盗汗。查体:双下肢感觉、运动功能正常。X 线显示椎间隙狭窄,腰大肌影增宽。最适宜的治疗方法是

- A. 局部注射抗感染药物
- B. 加强腰背肌锻炼
- C. 腰背部理疗按摩
- D. 抗结核药物治疗
- E. 立即行病灶清除手术

106. 女,34 岁。右下肢浅静脉迂曲扩张,长期不予外理,并发症不包括

- A. 色素沉着
- B. 皮肤和皮下硬结
- C. 难愈性溃疡
- D. 足趾坏死
- E. 皮肤萎缩

107. 男,27 岁。3 年来劳累时感心前区闷痛及头晕。查伴:胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及 4/6 级收缩期喷射样杂音,无震颤。可使杂音减轻的因素是

- A. 静脉推注毛花苷丙
- B. 静脉滴注硝酸甘油

- C.口服硝酸异山梨酯
- D.口服地高辛
- E.口服美托洛尔

108.某患者咳嗽、发热3天到医院诊,被医院初步诊断为疑似人感染高致病性禽流感,应住院治疗,但患者以工作离不开为由予以拒绝。医院对该患者应采取的措施是

- A.定期随访
- B.立即单独隔离治疗
- C.请示卫生行政部门
- D.居家观察
- E.尊重患者的自主决定权

109.初产妇,妊娠40周,产力正常,胎心140次/分,头位,双顶径10 cm,先露浮,宫口2 cm,对角径11 cm。正确的处理是

- A.剖宫产
- B.葡萄糖静脉滴注
- C.继续观察产程进展
- D.哌替啶肌内注射
- E.稀释缩宫素静滴

110.男,6个月。患法洛四联症,2天来反复于哭闹时突然四肢抽搐,青紫加重,神志不清,呼吸急促,持续时间约2~3分钟。主要原因是

- A.心包炎
- B.脑栓塞
- C.心力衰竭
- D.脑炎
- E.肺动脉梗阻

111.男,35岁。持续高热、恶心、呕吐、食欲不振伴腹泻5天入院。查体:皮肤、巩膜轻度黄染,胸部可见数枚淡红色斑丘疹,脾脏肋下可触及。实验室检查:血WBC  $3.2 \times 10^9/L$ ,Plt  $100 \times 10^9/L$ ,ALT 140U/L,TBil  $145 \mu\text{mol/L}$ 。肥达反应O 1:32。该疾病的特征性病理变化是

- A.肠黏膜淤血水肿
- B.全身单核巨噬细胞系统增生
- C.嗜酸性脓肿
- D.中性粒细胞浸润

E.干酪样坏死性肉芽肿

112.男,74岁。COPD患者,近来活动耐力下降就诊,针对患者因迷走神经张力过高所致气道狭窄,宜选用的药物是

- A.白三烯调节剂
- B.异丙托溴铵
- C.吸入型糖皮质激素
- D.沙丁胺醇
- E.茶碱



配套名师高清视频

113.男,65岁。腹部手术后出现疼痛,使用吗啡镇痛治疗,复查血气示pH 7.32,PaCO<sub>2</sub> 50 mmHg,PaO<sub>2</sub> 54 mmHg,该患者低氧血症最可能的发生机制是

- A.肺内分流
- B.氧耗量增加
- C.弥散功能障碍
- D.肺泡通气量下降
- E.通气/血流比例失衡

114.男,65岁。间断腹胀、上腹隐痛25年。胃镜检查提示:胃体黏膜变薄,血管透见,皱襞稀疏患者可能缺乏的维生素是

- A.维生素B<sub>4</sub>
- B.维生素B<sub>12</sub>
- C.维生素C
- D.维生素B<sub>2</sub>
- E.维生素D

115.男,32岁。因肝损伤急症手术。曾患甲型肝炎已治愈。术中见肝右叶外侧5 cm裂口,深3 cm 术后肝肾功能检查正常,食欲、体力恢复正常。肝脏损伤得以顺利修复,从内环境分析,主要起再生作用的是

- A.不稳定细胞
- B.稳定细胞
- C.纤维细胞
- D.肥大细胞
- E.永久性细胞

116.男,15岁。因发热、乏力、刷牙时牙龈出血1周入院。查体:T 38.5℃,牙龈肿胀,胸骨压痛(+),双下肢小腿出现散在出血

点及痕斑。血常规: Hb 80 g/l, WBC  $10.1 \times 10^9/L$ , PLT  $30 \times 10^9/L$ ; 骨髓增生极度活跃, 原始细胞占 0.60, POX 染色呈弱阳性, 非特异性酯酶染色阳性, 可被 NaF 抑制, 该患者原始细胞最可能的免疫表型是

- A. CD8<sup>+</sup>
- B. CD41<sup>+</sup>
- C. CD14<sup>+</sup>
- D. CD3<sup>+</sup>
- E. CD4<sup>+</sup>

117. 男, 31 岁。右小腿被撞伤, 创口出血, 骨外露 24 小时。X 线片示右胫腓骨下段粉碎性骨折, 最易出现的并发症是

### B1 型题

- A. 感染
- B. 神经血管损伤
- C. 骨筋膜室综合征
- D. 坠积性肺炎
- E. 急性骨萎缩

118. 男, 38 岁支气管哮喘。用“沙美特罗/氟替卡松”每日 3 次, 效果仍然不佳, 则应采取的措施是

- A. 加大药物用量
- B. 加用茶碱类药物
- C. 加用酮替芬
- D. 色甘酸钠
- E. 加用白三烯调节剂口服

### 答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(119~120 题共用备选答案)

- A. apo A I
- B. apo A II
- C. apo B100
- D. apo C I
- E. apo C II

119. 能作为 LPL 激活剂的是

120. 能被 HDL 受体识别的是

(121~122 题共用备选答案)

- A. CAP
- B. 操纵基因
- C. 辅阻遏蛋白
- D. 启动子
- E. 阻遏蛋白

121. 参与乳糖操纵子正性调控的蛋白因子是

122. 与辅阻遏物结合后才与操纵基因结合的成分是

(123~125 题共用备选答案)

- A. 乳头状瘤

B. 移行细胞癌

C. 血管肉瘤

D. 畸胎瘤

E. 脂肪瘤

123. 来源于上皮组织的恶性肿瘤是

124. 含有多个胚房成分的肿瘤是

125. 来源于间叶组织的恶性肿瘤是

(126~127 题共用备选答案)

A. 肺炎链球菌

B. 葡萄球菌

C. 铜绿假单胞(绿脓杆)菌

D. 克雷伯杆菌

E. 肺炎支原体

126. 不引起肺组织坏死和空洞形成的肺炎致病菌是

127. 最易引起间质性肺炎改变的致病菌是

(128~129 题共用备选答案)

A. 气道阻力增大

B. 肺泡容易扩张

C. 肺顺应性增大

D.肺泡表面张力增大

E.肺活量增加

128.肺泡表面活性物质分泌减少,将使

129.迷走神经兴奋时

(130~131 题共用备选答案)

A.6-磷酸果糖-1,6-双磷酸果糖

B.3-磷酸甘油酸—丙酮酸

C.丙酮酸—乳酸

D.6-磷酸葡萄糖-6-磷酸果糖

E.丙酮酸-乙酰 CoA

130.需消耗 ATP 的过程是

131.发生底物水平磷酸化的过程是

(132~133 题共用备选答案)

A.乙琥胺

B.异丙嗪

C.氯丙嗪

D.地西洋

E.苯妥英钠

132.治疗脊髓损伤引起肌强直的药物是

133.治疗癫痫大发作和局限性发作的物是物是

物是物是

(134~136 题共用备选答案)

A.窦道

B.糜烂

C.空洞

D.瘘管

E.溃疡

134.肺内干酪样坏死灶液化并经支气管排出形成

**A3/A4 型题**

135.慢性宫颈炎局部黏膜上皮坏死脱落形成

136.慢性化脓性骨髓炎向皮肤表面破溃后形成

(137~138 题共用备选答案)

A.软骨细胞瘤

B.肾母细胞瘤

C.神经纤维细胞瘤

D.髓母细胞瘤

E.成熟性畸胎瘤

137.属于恶性肿瘤的是

138.含有 2 个胚层以上的肿瘤是

(139~140 题共用备选答案)

A.支原体

B.衣原体

C.病毒

D.真菌

E.立克次体

139.无细胞壁的原核细胞型微生物是

140.具有典型细胞核和完善细胞器的微生物是生物是

(141~142 题共用备选答案)

A.2 日

B.7 日

C.3 日

D.1 日

E.5 日

141.急诊处方的用药日数一般不得超过

142.普通处方的用药日数一般不得超过



配套名师高清视频

### 答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(143~145 题共用题干)

男,68 岁。排便时突然跌倒,意识丧失,呼吸断续,有陈旧心肌梗死和糖尿病病史,

无高血压病史,诊断为心脏骤停。

143.该患者既往超声心动图检查未发现异常,其心脏骤停最可能的病因是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 预激综合征
- C. 冠心病
- D. 梗阻性肥厚型心肌病
- E. 主动脉夹层

144. 心电图示心搏停顿, 此时首选的药物是

- A. 普鲁卡因酰胺
- B. 胺碘酮
- C. 普罗帕酮
- D. 肾上腺素
- E. 碳酸氢钠

145. 最佳的给药途径是

- A. 皮下注射
- B. 心内注射
- C. 肌肉注射
- D. 气管内给药
- E. 静脉注射

(146~147 题共用题干)

男, 40 岁。烧伤后 3 小时入院。疼痛剧烈, 感口渴。面色苍白, 心率 150 次/分, BP 85/65 mmHg, 头颈部、躯干部布满大小不等水疱, 可见潮红创面。两上肢呈焦黄色无水疱。

146. 该病员的烧伤总面积估计为

- A. 7×9%
- B. 6×9%
- C. 5×9%
- D. 4×9%
- E. 3×9%

147. 该病员 III 度烧伤面积为

- A. 1×9%
- B. 2×9%
- C. 3×9%
- D. 4×9%
- E. 5×9%

(148~150 题共用题干)

女, 26 岁。足月妊娠, 临产 10 小时, 宫口扩张 2 cm, 自觉下腹部持续疼痛, 孕妇烦躁不安, 疼痛喊叫, 宫缩频率高, 子宫下段收缩最强

148. 患者初步诊断是

- A. 正常分娩
- B. 协调性宫缩乏力
- C. 不协调性宫缩乏力
- D. 胎位不正
- E. 骨盆狭窄

149. 患者最可能的原因是

- A. 子宫畸形
- B. 羊水过多
- C. 多胎妊娠
- D. 巨大胎儿
- E. 头盆不称

150. 此时应首选的措施是

- A. 静脉滴注缩宫素
- B. 肌肉注射哌替啶
- C. 行剖宫产
- D. 人工破膜
- E. 无需任何处理

本单元试卷到此结束



# 参考答案

## 第一单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	E	C	D	B	A	B	C	D	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	E	E	B	C	D	B	B	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	E	A	B	E	C	D	E	C	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	B	B	E	C	D	B	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	D	C	D	C	A	E	B	E	B
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	B	D	D	E	D	E	E	C	A
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	C	E	D	C	E	C	B	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
C	E	C	C	C	C	A	D	C	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
B	E	A	A	E	B	E	A	B	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
E	A	C	A	A	C	E	C	C	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
D	A	A	C	D	D	E	B	A	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
B	B	D	B	B	C	A	E	E	A

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A	E	B	D	C	A	E	D	A	A
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	C	A	C	B	A	D	E	A	D
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	B	C	D	E	B	B	C	E	B

8.【解析】本题考核尿液生成的调节。肾小管液中形成的渗透压,是對抗肾小管重吸收水分的力量。糖尿病患者由于肾小管不能将葡萄糖完全重吸收回血,使小管液中的葡萄糖含量增多,小管液溶质浓度过高,渗透压增高,从而阻碍水和 NaCl 的重吸收。故本题正确答案为 C。

10.【解析】本题考核肾小球的滤过膜。肾小球的滤过膜由毛细血管内皮细胞、内皮下基膜、肾小囊脏层上皮足细胞构成,其主要屏障作用的是基膜,基膜是阻挡大分子物质的机械屏障。故本题正确答案为 D。

11.【解析】本题考核肾小管的转运功能。近端小管是大部分物质的主要重吸收部位,滤过液中的约 67%  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{K}^+$  和水被重吸收,还有 85%的  $\text{HCO}_3^-$  以及全部的葡萄糖、氨基酸都在此被重吸收。故本题正确答案为 A。

12.【解析】本题考核肾小管对  $\text{HCO}_3^-$  重吸收的特点。 $\text{HCO}_3^-$  是以  $\text{CO}_2$  形式重吸收,肾小管对  $\text{HCO}_3^-$  重吸收优先于  $\text{Cl}^-$  的重吸收,若  $\text{HCO}_3^-$  滤过量超过  $\text{H}^+$  的分泌量,多余部分随尿排出。故本题正确答案为 E。

13.【解析】本题考核腱器官的作用。当肌肉受到牵拉时,首先兴奋肌梭而发动牵张反射,导致受牵拉的肌肉收缩;当牵拉进一步加大时,兴奋腱器官,使牵张反射受到抑制,这样可避免牵拉的肌肉受到损伤。故本题正确答案为 E。

14.【解析】本题考核特异性投射系统的特点。特异性投射系统是指丘脑特意感觉接替核及其投射至大脑皮层神经通路,其特点为:①投射的细胞群为丘脑的第一、第二细胞;②投向大脑皮层的特定区域;③是点对点的投射;④引起特定感觉,激发大脑皮层发出神经冲动;⑤不受药物的影响。故本题正确答案为 B。

16.【解析】本题考核牵涉痛的概念及临床疾病。牵涉痛是指某些内脏疾病引起远隔的体表部位发生疼痛或痛觉过敏。常见牵涉痛:冠心病心肌缺血时心前区、左肩和左上臂疼痛;胆囊炎、胆石症发作时右肩区疼痛;阑尾炎时上腹部、脐周疼痛;肾结石腹股沟区疼痛,右下肺炎患者右肩部疼痛为牵涉痛。故本题正确答案为 D。

17.【解析】本题考核兴奋性突触后电位的离子通透性的特点。兴奋性突触后电位是由于突触后膜对钠、钾离子的通透性增加,发生的局部去极化电位;抑制性突触后电位是由于突触后膜对  $\text{Cl}^-$  离子的通透性增加,突触后膜发生的局部超极化电位;故本题正确答案为 B。

18.【解析】本题考核条件反射。条件反射是指通过后天的学习训练而形成的反射,使

机体适应环境的变化,如闻到食物香味引起唾液分泌。非条件反射是指生来就有的、数量有限、比较固定和形成低级的反射活动,包括防御反射、食物反射、性反射、吸吮反射等。其余选项都是由反射弧组成的反射。故本题正确答案为 B。

19.【解析】本题考核甲状腺激素的作用。甲状腺激素是胎儿和新生儿脑发育的关键激素,是影响神经系统发育最重要的激素,特别是对骨和大脑的发育尤为重要。故本题正确答案为 B。

36.【解析】本题考核调查或研究的随机化原则。随机不等于随意,要抽取具有代表性的样本,贯彻随机化原则是提高组间均衡性的一个重要手段。故本题正确答案为 C。

37.【解析】本题考核变异系数概念和意义的理解。变异系数(CV)是衡量资料中各观察值变异程度的统计量。主要用于:观察值度量单位不同时变异大小的比较,如身高与体重变异程度的比较;均数相差悬殊时,儿童身高与成人身高变异程度的;变异系数越大,表示变异程度越大。故本题正确答案为 D。

38.【解析】本题考核正态分布曲线的特点。正态分布曲线又名高斯分布,因形态也称钟型曲线,有以下特征:①正态曲线在横轴上方均数处最高;②正态分布以均数为中心,左右对称,而非上下对称;③正态分布有两个参数固定,即均数和标准差,均数决定曲线的位置,标准差决定曲线的形状;④正态曲线下面积的分布有一定规律。故本题正确答案为 B。

40.【解析】本题考核 t 检验的意义。假设检验也称显著性检验,是统计推断的主要内容,其目的是比较样本代表的总体参数之间有无差别。其基本思想是首先通过对所需比较的总体提出一个无差别的假设,然后通过样本数据看是否拒绝这个假设。因此,两样本均数比较的 t 检验,其实际目的是检验两样本所属(所代表)的总体均数是否相等。故本题正确答案为 B。

41.【解析】本题考核疾病分布常用指标。①病死率是指一定时期内,患某病的全部患者中因该病死亡者所占的比例,即该病死亡人数/患该病人数,主要用于说明疾病的严重程度,也可用来反应医疗水平和诊断能力;②发病率是表示特定人群在一定时间内(一般为一年)发生某病新病例出现的频率;③患病率指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占的比值,适用于病程长的慢性病或流行情况,患病率=新旧病例/平均人口数;④死亡率是指在一定时间内(一般为一年),某人群中死于某病(或死于所有原因)的频率;⑤继发率又称“二代发病率”,指某传染病易感接触者中,在最短潜伏期最长潜伏期之间发病的人数占所有易感人群者总数的百分率。故本题正确答案为 D。

43.【解析】本题考核统计学假设检验方法的选择。 $X^2$ 检验又称卡方检验。它是处理测试数据的一种常用方法,在分类变量资料的统计推断中的应用,包括:两个率或两个构成比比较的卡方检验;多个率或多个构成比的比较的卡方检验,以及分类资料的相关分析等。题干中说胎儿不同出生体重和围产儿死亡率之间是否有关,属于分类变量资料两个率的比较,故用  $X^2$  检验。故本题正确答案为 C。

44.【解析】本题考核肌肉中氨基酸脱氨基的方式。人体中氨基酸主要是在 L-谷氨酸脱氢酶的作用下与  $\alpha$ -酮戊二酸联合脱氨基,但肌肉中 L-谷氨酸脱氢酶活性低,主要以嘌呤核苷酸循环的方式脱氨基。故本题正确答案为 D。

45.【解析】本题考核尿素循环。尿素循环也称鸟氨酸循环,氨基酸代谢脱下的  $\text{NH}_3$  在

肝内通过鸟氨酸循环形成无毒无害的尿素,是体内氨的主要去路。鸟氨酸循环主要经历 5 个步骤:除第一步是在线粒体进行的,其余四步都是在细胞质内进行的。尿素合成需要消耗 3 分子 ATP。其限速酶为:氨基甲酰磷酸合成酶。故本题正确答案为 C。

46.【解析】本题考核尿素循环。尿素循环也称鸟氨酸循环,氨基酸代谢脱下的  $\text{NH}_3$  在肝内通过鸟氨酸循环形成尿素,是体内氨的主要去路。鸟氨酸循环主要经历 5 个步骤:①在肝细胞线粒体中  $\text{NH}_3$ 、 $\text{CO}_2$ 、ATP 缩合成氨基甲酰磷酸;②在氨基甲酰磷酸与鸟氨酸反应生成瓜氨酸;③瓜氨酸与天冬氨酸反应生成精氨酸代琥珀酸;④精氨酸代琥珀酸裂解成精氨酸和延胡索酸;⑤精氨酸水解释放尿素再次生成鸟氨酸,鸟氨酸再次参与第二步生成瓜氨酸。故本题正确答案为 A。

47.【解析】本题考核骨骼肌中氨基酸的代谢途径。肌肉中的氨以无毒的丙氨酸形式运输到肝,丙氨酸脱下的氨在肝合成尿素,脱氨后形成的丙酮酸异生成葡萄糖经血液循环回肌肉。故本题正确答案为 E。

48.【解析】本题考核一碳单位的载体。一碳单位的载体是四氢叶酸,是合成嘌呤和嘧啶的原料,是联系氨基酸和核酸之间的纽带。故本题正确答案为 B。

49.【解析】本题考核嘌呤和嘧啶的合成原料。嘌呤的合成有两条途径,①从头合成,主要原料为:甘氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、 $\text{CO}_2$ 、磷酸戊糖、一碳单位;②补救合成,游离的嘌呤碱基、磷酸核糖焦磷酸;嘧啶合成有两条途径,①从头合成,主要原料为:天冬氨酸、谷氨酰胺、 $\text{CO}_2$ 、磷酸戊糖;谷氨酰胺+ $\text{HCO}_3^-$ 合成氨基甲酰磷酸;②补救合成,嘧啶碱基和嘧啶核糖焦磷酸。故本题正确答案为 E。

50.【解析】本题考核体内脂载脂蛋白的功能。CM 转运外源性的甘油三酯和胆固醇;VLDL 转运内源性的甘油三酯和胆固醇;LDL 转运内源性胆固醇;HDL 逆向转运胆固醇至肝将其降解,从而降低血中胆固醇浓度,故具有抗动脉粥样硬化的作用。故本题正确答案为 B。

51.【解析】本题考核胆固醇在体内转化和去路。有三条途径:①转化为胆汁酸盐(最主要的去路);②转化为类固醇激素,即在肾上腺皮质转化为皮质醇、醛固酮、雄激素;在睾丸间质细胞转化为睾酮;在卵巢及黄体转化为雌激素;③转化为 7-脱氢胆固醇,后者在紫外线的照射下转化为  $\text{VitD}_3$ ,调节钙磷代谢。胆色素为衰老红细胞的代谢产物。故本题正确答案为 E。

52.【解析】本题考核酮体的特点。酮体是脂肪酸在肝中氧化的中间产物,包括丙酮、乙酰乙酸和  $\beta$ -羟丁酸;肝内缺乏利用酮体的酶,故酮体是肝内合成,肝外利用,是心、脑的重要能源物质,故酮体是肝输出能量的一种形式;当机体饥饿时,脂肪组织大量动员,活化的脂肪酸经  $\beta$  氧化生成乙酰 CoA,在肝脏的线粒体内合成酮体。故本题正确答案为 B。

55.【解析】本题考核必需脂肪酸。人体内必需脂肪酸包括:亚油酸、亚麻酸和花生四烯酸,只能从食物获取。合成前列腺素的花生四烯酸只能从食物中获取。因此对大鼠去脂饮食可引起前列腺素减少。故本题正确答案为 E。

56.【解析】本题考核脂肪大量动员乙酰 CoA 的去路。正常情况下,血中酮体含量很少,在饥饿、高脂低糖膳食及糖尿病时,葡萄糖利用减少,脂肪动员加强,脂肪酸分解增多,乙酰-CoA 大量生成,继而生成酮体氧化功能。故本题正确答案为 D。

57.【解析】本题考核脂肪酸的  $\beta$  氧化过程。①关键酶:肉毒碱脂酰转移酶-1;②部位:

线粒体;③脂肪酸 $\beta$ 氧化的过程:a.脂肪酸的活化:乙酰 CoA  $\rightarrow$  脂酰 CoA; b.脂肪酸的 $\beta$ 氧化:脱氢(FAD) $\rightarrow$ 加水 $\rightarrow$ 再脱氢(NAD) $\rightarrow$ 硫解; c.产物:1分子乙酰 CoA +少2个碳原子的脂酰 CoA。故本题正确答案为 E。

61.【解析】本题考查萎缩的概念及类型。萎缩是指发育正常的组织细胞体积的缩小、数目减少。老年人动脉粥样硬化引起脑细胞供血不足,故属于营养不良性萎缩。故本题正确答案为 D。

62.【解析】本题考查组织细胞损伤的分类及特点。组织细胞损伤分为变性和死亡,变性属于可复性损伤;死亡属于不可复性损伤,包括凋亡和坏死;细胞坏死的主要形态学特征为细胞核的改变:①核固缩②核碎裂③核溶解。除 D 项外,其余项都是变性的表现。故本题正确答案为 C。

64.【解析】本题考查细胞坏死的形态学特征。细胞坏死的主要形态学特征为细胞核的改变:①核固缩②核碎裂③核溶解。核分裂是正常细胞分化的过程,细胞核异型性是肿瘤细胞的表现,细胞肿胀和细胞质脂质增多是细胞变性的表现。故本题正确答案为 D。

65.【解析】本题考查梗死与坏疽的区别。是指机体局部组织细胞的死亡;坏疽是指组织坏死后继发腐败菌的感染,使坏死组织呈黑色、污绿色,并伴有恶臭的病理过程。其最本质的区别是有无腐败菌的感染。故本题正确答案为 C。

67.【解析】本题考查组织细胞的再生能力。根据再生能力的强弱将组织细胞分为:①不稳定细胞:此类细胞的再生能力很强,不断的分裂增殖,以代替衰老或破坏的细胞,如被覆上皮细胞、淋巴造血细胞、间皮细胞等;②稳定细胞:在生理情况下,这类细胞处于静止状态,当受到组织损伤的刺激时,表现出较强的再生能力,如各种腺细胞(肝、胰腺、乳腺、内分泌腺、肾小管的上皮细胞等)。③永久性细胞:此类细胞几乎无再生能力,主要为骨骼肌细胞、神经细胞、心肌细胞。故本题正确答案为 C。

68.【解析】本题考查机化的概念。机化是指组织细胞坏死后由肉芽组织取代的过程。肉有组织主要由成纤维细胞和新生的毛细血管组成,故机化时的特征细胞为成纤维细胞。故本题正确答案为 B。

70.【解析】本题考查羊水栓塞引起猝死的机制。羊水栓塞是分娩过程中较为严重的并发症,羊水栓塞引起猝死的机制为:①羊水中胎儿代谢产物入血引起过敏性休克;②羊水栓子阻塞肺动脉及羊水内含有血管活性物质引起反射性血管痉挛;③羊水具有致活凝血酶的作用引起 DIC。故本题正确答案为 C。

71.【解析】本题考查急性左心衰的病理特点。急性左心衰时,由于左心腔压力升高,阻碍肺静脉回流,肺淤血致肺泡壁毛细血管通透性增高,引起肺水肿的发生。故本题正确答案为 C。

72.【解析】本题考查脂肪栓塞。股骨骨折后,大量脂滴可经静脉入右心,再到达肺,引起肺动脉及其分支栓塞。故本题正确答案为 E。

73.【解析】本题考查贫血性梗死的发生部位。贫血性梗死常发生于侧支循环不丰富的实质性脏器,如心、脾、脑、肾等。故本题正确答案为 C。

74.【解析】本题考查硫脲类药物抗甲状腺的作用机制。硫脲类药物抑制甲状腺过氧化

物酶,进而抑制酪氨酸的碘化及偶联,减少甲状腺激素的合成。本题正确答案为 C。

75.【解析】本题考核  $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂抗糖尿病的机制。 $\alpha$ -葡萄糖苷酶抑制剂通过竞争性抑制双糖类水解酶,延缓肠道单糖的吸收,尤其是水化合物的吸收,主要适用于餐后血糖升高的患者;磺脲类降血糖药属于促胰岛素分泌剂,刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素而降低血糖;双胍类药物主要用于伴有肥胖的糖尿病患者,可促进脂肪组织摄取葡萄糖,降低糖在肠道的吸收及糖异生,抑制胰高血糖素的作用;噻唑烷二酮类属于胰岛素增敏剂,与激活过氧化物酶体增殖因子受体有关。故本题正确答案为 C。

76.【解析】本题考核第三代头孢菌素的特点。第三代头孢菌素的特点:①主要用于危及生命的尿路感染、脑膜炎、脓毒症等;②对 G-菌的有较强的作用,但 G<sup>+</sup>作用较一、二代弱;③肾脏毒性:一代>二代,三代、四代无肾毒性;④对铜绿假单胞菌作用较强;⑤对  $\beta$  内酰胺酶有较高的稳定性。故本题正确答案为 C。

77.【解析】本题考核红霉素的临床应用。红霉素是大环内脂类抗生素,通过抑制细菌蛋白质的合成抗菌。临床常用于衣原体、白喉、支原体、空肠弯曲菌、军团菌感染的首选。口诀:依白万支空军首选红。故本题正确答案为 A。

78.【解析】本题考核铜绿假单胞菌的敏感抗生素。铜绿假单胞菌感染首选药为:氨基糖苷类妥布霉素,它的抗铜绿假单胞菌的作用是庆大霉素的 2~5 倍。三代头孢、喹诺酮类(儿童禁忌)也有较强的抗铜绿假单胞菌的作用。故本题正确答案为 D。

81.【解析】本题考核苯二氮草类药物的作用特点。苯二氮草类药物具有:抗焦虑、镇静催眠、中枢性的肌松作用,抗癫痫的持续状态。故本题正确答案为 B。

82.【解析】本题考核阿司匹林的副作用。阿司匹林的副作用为:胃肠道反应、凝血功能障碍、水杨酸反应、过敏反应、瑞夷综合征。故本题正确答案为 E。记忆口诀:为、您、扬、名、义。偶可引起头痛、眩晕、耳鸣、听力减退等。

83.【解析】本题考核卡比多巴抗帕金森的机制。卡比多巴仅能抑制外周多巴胺脱羧酶的活性,从而减少多巴胺在外周组织中的生成,提高脑内多巴胺的浓度;卡比多巴不易通过血脑屏障,这样既能提高左旋多巴的疗效,又能减轻其外周的副作用,但卡比多巴自身不具有抗帕金森的作用。故本题正确答案为 A。

84.【解析】本题考核哌替啶的临床应用。哌替啶阿片类受体激动剂,与吗啡作用相同,有轻微的兴奋作用,但不影响产程,故可以用于分娩之痛,因新生儿对哌替啶呼吸抑制作用较为敏感,故在产妇临产前 2~4 小时内不宜使用。故本题正确答案为 A。

85.【解析】本题考核钙拮抗药的药理特点。硝苯地平、尼群地平、尼莫地平均属于二氢吡啶类  $Ca^{2+}$  拮抗剂,但尼莫地平舒张脑血管的作用较强,能增加脑血流了,故常用于脑血管疾病的首选。地尔硫草、地尔硫草属于非二氢吡啶类钙通道拮抗剂,维拉帕米是阵发性室上性心动过速的首选。故本题正确答案为 E。

112.【解析】迷走神经张力过高则会导致气道狭窄,根据题意,应该选择抗胆碱药,异丙托溴铵属于吸入型抗胆碱药,可以阻断节后迷走神经通路,降低迷走神经兴奋性而舒张支气管,从而可以改善夜间喘憋症状的作用。其余选项类型的药物均不能起到抗胆碱的作用,故不选。

110-2

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

# 2019 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别:临床执业医师

第二单元

考生姓名:\_\_\_\_\_

准考证号:\_\_\_\_\_

考场号:\_\_\_\_\_

## 答题须知

1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用2B铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。



## 第二单元

## A1 型题

## 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 癔痕性幽门梗阻最突出的临床表现是
- A. 消瘦  
B. 呕吐胃内容物及胆汁  
C. 移动性浊音阳性  
D. 呕吐宿食, 不含胆汁  
E. 持续呃逆
2. 职业中毒诊断前提和基本条件是
- A. 病史和临床检查  
B. 生成环境调查  
C. 接触有害物质的时间  
D. 病理证实  
E. 职业史及劳动卫生条件
3. 主动脉瓣狭窄时心脏震颤出现在
- A. 胸骨右缘第 2 肋间, 收缩期  
B. 胸骨左缘第 2 肋间, 连续性  
C. 胸骨左缘第 2 肋间, 收缩期  
D. 胸骨左缘第 2 肋间, 舒张期  
E. 胸骨右缘第 2 肋间, 舒张期
4. 某县药品监督管理部门接到某药店将保健食品作为药品出售给患者的举报后, 立即对该药店进行了查处, 并依照《药品管理法》的规定, 将其销售给患者的保健食品认定为
- A. 按假药论处的药  
B. 食品  
C. 假药  
D. 劣药  
E. 按劣药论处的药
5. 参与经典途径激活补体的是
- A. IgE  
B. LPS  
C. IgD  
D. IgM  
E. IgA
6. 判断小儿支气管肺炎严重程度的指标是
- A. 白细胞高低  
B. 有无累及其他系统  
C. 呼吸频率  
D. 胸片显示程度  
E. 感染菌群
7. 类风湿关节炎治疗改善病情的抗风湿药联合治疗方案是
- A. 甲氨蝶呤+来氟米特  
B. 双氯芬酸钠+来氟米特  
C. 甲氨蝶呤+硫酸氨基葡萄糖  
D. 对乙酰氨基酚+硫酸氨基葡萄糖  
E. 双氯芬酸钠+泼尼松
8. 人重度肥胖是指体重至少超过标准体重的
- A. 10%  
B. 20%  
C. 30%  
D. 40%  
E. 50%



配套名师高清视频

9. 初产妇总产程不超过
- 14 小时
  - 16 小时
  - 18 小时
  - 20 小时
  - 22 小时
10. 病原为真核细胞型微生物的疾病是
- 传染性单核细胞增多症
  - 水痘
  - 结核
  - 鹅口疮
  - 霍乱
11. 卵巢动静脉通过的韧带是
- 圆韧带
  - 主韧带
  - 宫骶韧带
  - 骨盆漏斗韧带
  - 阔韧带
12. 国家实行特殊管理的药品不包括
- 疫苗
  - 麻醉药品
  - 精神药品
  - 医疗用毒性药品
  - 放射性药品
13. 最易形成潜伏感染的病毒是
- 麻疹病毒
  - 流感病毒
  - 脊髓灰质炎
  - 狂犬病
  - 水痘-带状疱疹病毒
14. 慢性阻塞性肺疾病患者存在的“持续气流受限”是指
- 阻塞性通气功能障碍不能完全恢复
  - 支气管舒张试验阳性
  - 功能残气量显著增加
  - 支气管激发试验阳性
  - 存在限制性通气功能障碍
15. 胎头矢状缝与骨盆入口右斜径一致的胎位是
- 枕左后
  - 枕右前
  - 枕左横
  - 枕左前
  - 枕右横
16. 伤寒最严重的并发症是
- 肠出血
  - 心肌炎
  - 中毒性肝炎
  - 肺炎
  - 肠穿孔
17. 鉴别肝癌和肝血管瘤最佳的检查方法是
- 腹部 MRI
  - 腹部多普勒超声
  - 放射性核素肝扫描
  - 腹部 CT 平扫
  - 内镜超声
18. 严重胸腹联合损伤后, 必须首先处理的是
- 呼吸骤停
  - 粉碎性胸腰椎骨折
  - 急性弥漫性腹膜炎
  - 闭合性液气胸
  - 轻度血压下降
19. 关于子宫, 正确的是
- 成年的子宫长 7~8 cm, 宽 4~5 cm, 厚 4~5 cm
  - 子宫体与子宫颈的比例, 成年人为 1:2
  - 子宫峡部的上端是组织学内口
  - 子宫体与子宫颈之间形成最狭窄的部分为子宫峡部
  - 经产妇的子宫颈外口是圆形

20.《疫苗流通和预防接种管理条例》规定的预防接种异常反应情形是

A.合格疫苗在规范接种过程中相关各方均无过错但造成受种者机体组织器官损害

B.受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期,接种后偶合发病

C.因心理因素发生的个体或者群体的心因性反应

D.因疫苗质量不合格给受种者造成的损害

E.因疫苗本身特性引起的接种后一般反应

21.诊断胃十二指肠溃疡首选的检查是

A.上消化道造影

B.腹部超声

C.胃镜

D.腹部增强 CT

E.内镜超声

22.抑制体内环氧酶活性的药物是

A.施慧达

B.卡托普利

C.阿司匹林

D.雷米替丁

E.缬沙坦

23.一般头皮裂伤清创的时限不应超过

A.8 小时

B.12 小时

C.24 小时

D.36 小时

E.48 小时

24.小儿疱疹性咽峡炎的病原体是

A.鼻病毒

B.柯萨奇病毒

C.腺病毒

D.金黄色葡萄球菌

E.流感嗜血杆菌

25.婴儿期“生理性贫血”的发生时间是

A.生后 1 个月

B.生后 2 个月

C.生后 2~3 个月

D.生后 3 个月

E.生后 4 个月

26.右肾盂内 1.3 cm 单发结石,静脉尿路造影显示右肾轻度积水,肾功能正常,首选的治疗方法是

A.药物治疗

B.经皮肾镜碎石

C.经输尿管镜碎石

D.体外冲击波碎石

E.肾盂切开取石

27.关于原发性甲状腺功能减退症替代治疗,不正确的是

A.从小剂量开始逐增至最佳剂量

B.替代过程中需要定期监测

C.替代用量应注意个体化

D.确诊后即刻足量替代

E.TSH 是评价疗效的最佳指标

28.心房颤动时 f 波的频率为

A.250~300 次/分

B.<150 次/分

C.150~200 次/分

D.>600 次/分

E.350~600 次/分

29.日本血吸虫病的临床分型不包括

A.急性血吸虫病

B.异位血吸虫病

C.晚期血吸虫病

D.肝硬化型血吸虫病

E.慢性血吸虫病

30.判断慢性胃炎有无活动的病理学依据是



配套名师高清视频

- A. 浆细胞浸润  
B. 中性粒细胞浸润  
C. 淋巴滤泡形成  
D. 淋巴细胞浸润  
E. 肠上皮化生
31. 尿渗透压降低常见于  
A. 糖尿病  
B. 甲状旁腺功能亢进症  
C. 甲状腺功能亢进症  
D. 中枢性尿崩症  
E. 原发性醛固酮增多症
32. 淋病是何种类型的炎症  
A. 慢性化脓性炎症  
B. 急性化脓性炎症  
C. 急性变质性炎症  
D. 出血性炎  
E. 浆液性炎症
33. 胰腺癌最常见的组织类型为  
A. 导管细胞癌  
B. 腺泡细胞癌  
C. 多形性腺癌  
D. 纤维细胞腺癌  
E. 黏液癌
34. 心尖部收缩中晚期喀喇音提示  
A. 二尖瓣脱垂  
B. 室壁瘤形成  
C. 二尖瓣狭窄  
D. 主动脉瓣关闭不全  
E. 室间隔穿孔
35. 反映心力衰竭时心肌收缩减弱, 下面哪项指标最合适  
A. 心输出量减少  
B. 心脏指数减少  
C. 射血分数减少  
D. 肺动脉压增高  
E. 中心静脉压增高
36. 骨折治疗原则中的首要步骤是  
A. 功能锻炼  
B. 内固定  
C. 包扎  
D. 复位  
E. 外固定
37. 慢性肺源性心脏病患者胸部 X 线片典型的心脏形态特征是  
A. 心脏普大  
B. 心脏向右扩大  
C. 心脏向左下扩大  
D. 心尖上翘  
E. 心腰部凹陷
38. 结核性心包炎初期最关键的治疗是  
A. 口服泼尼松  
B. 抗结核治疗  
C. 营养支持治疗  
D. 心包穿刺引流  
E. 口服利尿药
39. 下列属于副交感神经作用的是  
A. 逼尿肌收缩  
B. 糖原分解增加  
C. 瞳孔增大  
D. 骨骼肌血管舒张  
E. 消化道括约肌收缩
40. 采用吲哚美辛治疗动脉导管未闭的最佳年龄段是  
A. 学龄前期  
B. 学龄期  
C. 青春期  
D. 幼儿期  
E. 新生儿期
41. 肝硬化门静脉高压最常见的并发症是  
A. 自发性细菌性腹膜炎  
B. 原发性肝癌  
C. 肝肾综合征

- D. 上消化道出血  
E. 肝性脑病
42. 正常思维一般都具有
- A. 目的性  
B. 连贯性  
C. 逻辑性  
D. 实践性  
E. 以上都对
43. 偏头痛的预防性治疗药物是
- A. 苯噻啶  
B. 英明格  
C. 咖啡因麦角胺  
D. 小剂量阿司匹林  
E. 吲哚美辛
44. 甲状腺癌最常见的病理类型是
- A. 滤泡状癌  
B. 乳头状癌  
C. 未分化癌  
D. 髓样癌  
E. 腺癌
45. 佝偻病颅骨软化多发生于
- A. 1~3 个月  
B. 9~12 个月  
C. 6~9 个月  
D. 3~6 个月  
E. 12 个月以上
46. 治疗社区获得性肺炎时,可覆盖非典型病原体的抗生素是
- A. 头孢菌素类  
B. 糖肽类  
C. 青霉素类  
D. 氨基糖苷类  
E. 大环内酯类
47. 有关Ⅲ度胎盘早剥的说法,错误的是
- A. 剧烈腹痛后,阴道流血  
B. 阴道出血量与全身症状不成正比
- C. 无痛性阴道流血  
D. 子宫板状  
E. 子宫底升高
48. 胃腺癌的最好发部位是
- A. 胃窦  
B. 幽门  
C. 胃体  
D. 贲门  
E. 胃底
49. 评估呼吸气流是否受限最常用的指标是
- A. 残气量/肺总量(RV/TLC)  
B. FEV<sub>1</sub>% 预计值  
C. 峰流速(PEF)  
D. FEV<sub>1</sub>/FVC  
E. 用力肺活量(FVC)
50. 引起继发性肺动脉高压最常见的原
- 因是
- A. 结缔组织病  
B. 肺血栓栓塞  
C. 慢性阻塞性肺疾病  
D. 间质性肺炎  
E. 肺结核
51. 催化转录合成 RNA 的酶是
- A. 反转录酶  
B. 引物酶  
C. RNA 聚合酶  
D. DNA 指导的 RNA 聚合酶  
E. 拓扑异构酶
52. 子宫肌瘤的症状与下列关系密切的是
- A. 肌瘤的大小  
B. 肌瘤生长部位(宫体、宫颈)  
C. 发生年龄  
D. 肌瘤数目  
E. 肌瘤与肌层的关系(黏膜下、浆膜下、壁间)



配套名师高清视频

- 53.必需脂肪酸与非必需脂肪酸的区别是
- 前者不能在人体内消化,而后者可以
  - 后者不能在人体内消化,而前者可以
  - 所含氮元素的量不一样
  - 前者不能在人体合成,而后者可以
  - 后者不能在人体合成,而前者可以
- 54.正常脐带内含有
- 一条脐动脉,一条脐静脉
  - 两条脐动脉,两条脐静脉
  - 两条脐动脉,一条脐静脉
  - 一条脐动脉,两条脐静脉
  - 两条脐动脉
- 55.肾性与中枢性尿崩症的鉴别方法是
- 加压素试验
  - 测定尿渗透压和血钠
  - 测定尿渗透压和比重
  - 测定血浆和尿渗透压
  - 禁水(禁饮)试验
- 56.属于十二指肠溃疡手术后早期并发症的是
- 术后胃瘫
  - 营养性并发症
  - 早期倾倒综合征
  - 残胃癌
  - 碱性反流性胃炎
- 57.关于糖皮质激素的抗炎作用,正确的叙述是
- 促进创口愈合
  - 能提高集体的防御功能
  - 对抗各种原因,如物理、生物等引起的各种炎症
  - 抑制病原体生长
  - 直接杀灭病原体
- 58.主动脉瓣狭窄为
- 梨形心
  - 普大型心
  - 左室增大,主动脉明显扩张
  - 心室收缩时心房反向膨出
  - 心影正常或左室,左房轻度增大
- 59.尿毒症患者血液系统的临床表现为
- 低色素小细胞性贫血
  - 白细胞出现中毒颗粒,核左移
  - 贫血常为中、重度
  - 血小板异常增多
  - 促红细胞生成素增加
- 60.确诊感染性心内膜炎除血培养多次阳性外,还应有
- 指甲下裂片状出血
  - 新出现的心脏病理性杂音
  - Janeway 损害
  - Roth 斑
  - 转移性脓肿
- 61.胃酸进入十二指肠后实现反馈抑制胃液分泌涉及的激素是
- 胃动素
  - 胰泌素
  - 胆汁
  - 抑胃肽
  - 促胰液素
- 62.不符合乙状结肠扭转临床特点的是
- 呕吐早且频繁
  - 可见不对称腹胀或肠型
  - 钡灌肠影呈“鸟嘴”形
  - 腹部压痛及肌紧张不明显
  - 腹部 X 线可见马蹄状充气肠袢
- 63.本能冲动和被压抑愿望属于
- 意识冲突
  - 前意识冲突
  - 潜意识冲突
  - 下意识冲突
  - 意识控制
- 64.有关脾破裂,以下不正确的是

- A.行脾切除术  
B.行脾缝合修补术  
C.可收集腹腔内出血行自家输血  
D.待失血性休克好转后手术  
E.白细胞计数升高
- 65.有权批准医疗机构取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡的部门是  
A.该区的县级人民政府卫生行政部门  
B.该区的市级人民政府卫生行政部门  
C.该区的省级人民政府卫生行政部门  
D.该区的市级公安部门  
E.医学会
- 66.临床预防服务的对象是  
A.遗传病人  
B.健康人  
C.病房病人  
D.传染病人  
E.慢性病病人
- 67.慢性乙型肝炎最重要的治疗药物是  
A.扶正化瘀胶囊  
B.恩替卡韦  
C.甘草酸二胺  
D.利巴韦林  
E.胸腺肽
- 68.硅沉着病的特征性病理改变是  
A.圆形小阴影  
B.肺间质纤维化  
C.硅结节  
D.肺泡结构破坏  
E.肺脏体积增大,含气量减少
- 69.胃癌最常见的病理类型是  
A.鳞状细胞癌  
B.小细胞癌  
C.未分化癌  
D.印戒细胞癌  
E.腺癌
- 70.基因表达调控的主要环节是  
A.基因扩增  
B.翻译起始  
C.转录后加工  
D.转录起始  
E.翻译后加工



配套名师高清视频

## A2 型题

### 答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 71.男,32岁。醉酒受凉,次日高热、寒战、胸痛、咳嗽、咳黏液痰,量渐增多,并有脓性痰,有臭味。可能的诊断是  
A.原发性肺脓肿  
B.血源性肺脓肿  
C.急性脓气胸  
D.干酪性肺炎  
E.金黄色葡萄球菌肺炎
- 72.女,27岁,已婚。突发腹痛、阴道流血1天,血压 60/40 mmHg。体检发现一侧下腹部持续剧烈疼痛,阴道后穹窿穿刺抽出不凝血。最有价值的体征是  
A.一侧下腹部持续性剧烈疼痛  
B.突发腹痛  
C.阴道后穹窿穿刺抽出不凝血  
D.阴道流血1天  
E.血压 60/40 mmHg
- 73.女,26岁。活动后突然左下腹剧痛,伴有恶心、呕吐。月经规律,末次月经为8天前。妇科检查:左侧附件区可触及手拳大

小囊实性包块,触痛,推移后疼痛加剧。首先考虑为

- A. 卵巢黄体破裂
- B. 急性盆腔炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 急性阑尾炎
- E. 输卵管妊娠破裂

74. 女, 50 岁。因低位直肠癌行 Dixon 术, 术后吻合口位于齿状上 1 cm。患者术后最可能出现的情况是

- A. 排尿功能障碍
- B. 性功能障碍
- C. 排便功能完全正常
- D. 排便前无明显便意, 排便控制不理想
- E. 排便前有便意, 但不能控制排便

75. 患儿, 18 天。过期产儿, 出生时重 4.2 kg, 哭声低哑, 反应迟钝, 食量少, 黄疸未退, 便秘, 体重低, 腹胀。该患儿最可能的诊断是

- A. 先天愚型
- B. 苯丙酮尿症
- C. 甲状腺功能减退症
- D. 先天性巨结肠
- E. 黏多糖病

76. 女, 42 岁。右下肢畏寒、疼痛间断发作 4 年。吸烟 8 年余。无高血压、糖尿病病史。查体: 右下肢皮温降低, 足背动脉搏动减弱。治疗措施中错误的是

- A. 戒烟
- B. 链激酶溶栓治疗
- C. 抗凝药物治疗
- D. 腰交感神经节切除术
- E. 高压氧舱治疗

77. 女, 40 岁。畏寒、高热伴腰痛。尿频、尿急, 尿痛 2 天。查体: 左侧肾区有疼痛和叩击痛, 尿 WBC 40~50/HP, 白细胞管型

5/HP。血 WBC  $15.4 \times 10^{12}/L$ , N 0.87。最可能的诊断是

- A. 急性膀胱炎
- B. 尿路结石
- C. 急性肾盂肾炎
- D. 急性肾小球肾炎
- E. 尿路综合征

78. 女性, 24 岁。活动后心悸气急 3 月。检查发现肝大, 质地中等, 表面平滑, 有压痛, 腹部移动性浊音阳性, 下肢压陷性水肿。最可能的诊断是

- A. 肝硬化腹水
- B. 肝癌伴腹水
- C. 肺结核伴结核性腹膜炎
- D. 肾病综合征伴腹水
- E. 右心衰竭、肝淤血伴腹水

79. 女, 36 岁。4 年前车祸外伤导致左股骨颈骨折, 急诊行闭合复位螺钉内固定术, 1 年前逐渐出现左髋疼痛, 行走时加重, 髋部活动受限, 最可能出现的情况是

- A. 髋关节感染
- B. 股骨头坏死
- C. 股骨颈骨折不愈合
- D. 骨关节炎
- E. 股骨颈再次骨折

80. 初孕妇, 26 岁, 规律宫缩 12 小时, 羊膜囊完整, 胎头 S=+1, 胎心 140 次/分。对该患者的处理是

- A. 无需处理
- B. 立即行人工破膜
- C. 立即剖宫产
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 会阴剪切

81. 女, 25 岁。乏力 3 个月。查体: BP 170/105 mmHg。实验室检查: Hb 84 g/L; 尿常规: 蛋白(++), 颗粒管型 2~3/低倍视野;



血 BUN 12.3 mmol/L, SCr 276.8  $\mu$ mol/L。对该患者不应该采取的措施是

- A. 低磷饮食
- B. 控制血压
- C. 根据尿量适当限水
- D. 低钠饮食
- E. 高蛋白饮食

82. 女, 71 岁。服用氟桂利嗪 3 个月后出现动作徐缓, 僵硬, 手部震颤, 跌倒一次。美多丝肼治疗无效。查体: 智能正常, 面具脸, 四肢肌力正常, 肌张力高。最可能的诊断是

- A. 血管性帕金森综合征
- B. 帕金森叠加综合征
- C. 外伤性帕金森综合征
- D. 药物性帕金森综合征
- E. 原发性帕金森病

83. 女, 20 岁。2 日来出现皮肤紫癜, 以下肢为主, 两侧对称, 颜色鲜艳, 高出皮肤表面, 伴有腹痛, 应诊断为

- A. 血小板减少性紫癜
- B. 急性白血病
- C. 过敏性紫癜
- D. 急性关节炎
- E. 急腹症

84. 女, 7 岁。肾病综合征初治, 体重 25 kg, 泼尼松每次 25 mg, 每天 2 次。治疗 2 周后, 水肿消失, 4 周时尿蛋白转阴。此时判断该患儿疗效为

- A. 激素部分敏感
- B. 激素依赖
- C. 激素敏感
- D. 激素不耐受
- E. 激素耐药

85. 女, 38 岁。因患再生障碍性贫血入院治疗, 既往曾多次输血。此时应考虑输注

- A. 浓缩红细胞
- B. 辐照红细胞
- C. 全血
- D. 去除白细胞的红细胞
- E. 悬浮红细胞

86. 男, 52 岁。糖尿病肾病伴高血压, BP 170/100 mmHg, 心率 54 次/分, 血肌酐 158  $\mu$ mol/L。最适宜的治疗药物组合是

- A. 氢氯噻嗪、吲达帕胺
- B. 美托洛尔、维拉帕米
- C. 氨氯地平、缬沙坦
- D. 普萘洛尔、卡托普利
- E. 螺内酯、福辛普利

87. 男, 28 岁。腰痛伴右下肢麻木疼痛 1 周, 查体: 直腿抬高试验(+). CT 示 L<sub>4-5</sub> 椎间盘向右后侧突出, 压迫硬膜囊。目前首选的治疗方法是

- A. 腰背肌功能锻炼
- B. 经皮髓核切吸术
- C. 椎板减压髓核摘除术
- D. 卧床休息、理疗
- E. 腰椎内固定植骨融合术

88. 女, 22 岁。突发右侧胸痛伴胸闷 1 小时, 搬重物时突发右侧胸痛, 疼痛剧烈, 深呼吸时加重, BP 100/65 mmHg, 最可能的诊断是

- A. 肺栓塞
- B. 自发性气胸
- C. 主动脉夹层
- D. 肋间神经痛
- E. 心肌梗死

89. 初孕妇, 28 岁。妊娠 34 周, 用胰岛素治疗糖尿病, 今晨 5 时清醒, 心慌、出汗。此时最有效的处理措施是

- A. 检测血糖
- B. 检测成糖及酮体



配套名师高清视频

C. 静脉注射胰岛素

D. 进食

E. 测量体温

90. 男, 71 岁。活动时胸痛 2 年, 停止活动后症状可迅速缓解。查体: BP 100/60 mmHg, 心电图示  $SV_1 + RV_5 > 4.0\text{mv}$ , 超声心动图示室间隔厚度 1.5cm, 左室后壁厚度 1.5cm。最有诊断价值的体征是

A. 心尖抬举样搏动

B. 主动脉瓣区 S2 逆分裂

C. 心尖部闻及 S4

D. 主动脉瓣区收缩期杂音

E. 主动脉瓣区 S2 减弱

91. 患者, 56 岁。活动后气短、乏力间断胸部咳嗽、咳少量白粘痰半年。查体: 未见阳性体征, 血常规。既往吸烟 30 年, X 线片未见异常。未明确诊断, 宜首选的检查是

A. 超声心动图

B. 动脉血气分析

C. 肺部 CT

D. 肺功能

E. 支气管镜

92. 男, 35 岁。体检发现肝大。肝肋下 2 cm, 质地中等, 表面光滑, 边缘整齐无触痛, 肝功能检查正常。最可能的诊断是

A. 慢性肝炎

B. 肝癌

C. 肝棘球蚴病

D. 肝硬化代偿期

E. 肝腺瘤

93. 女, 45 岁。左乳头溢液 10 余天, 无不适症状。查体: 乳房视诊无异常发现, 未扪及肿块, 无压痛, 按压左乳晕外上方可见黄褐色溢液。门诊首选的检查是

A. 热图像检查

B. 钼靶 X 线摄片

C. B 型超声检查

D. 近红外线扫描

E. 溢液涂片细胞学检查

94. 女, 40 岁。外伤致右胸积血, 右侧呼吸音弱, 叩诊为浊音, 胸穿抽出混浊胸液。最应该采取的治疗措施是

A. 胸穿

B. 开胸止血

C. 胸腔闭式引流

D. 患肺切除术

E. 无需特殊处理

95. 男, 50 岁。车祸致下腹部受伤 2 小时。查体: T 36.8 °C, P 90 次/分, R 20 次/分, BP 140/70 mmHg, 双肺呼吸音清, 未闻及干湿啰音, 心律齐, 未闻及杂音, 下腹膨隆, 有压痛, 无肌紧张, 移动性浊音阴性, 耻骨联合处压痛, 骨盆分离挤压试验阳性, 予导尿, 导尿管插入后仍未引出尿液, 导尿管尖端见血迹, 最可能的原因是

A. 导尿管阻塞

B. 导尿管插入方法不对

C. 骨盆骨折并膀胱损伤

D. 导尿管插入深度不足

E. 骨盆骨折合并尿道断裂

96. 女, 31 岁。发热伴刺激性干咳 3 天, 一周前陪伴 5 岁女儿住院, 女儿 4 天前好转已出院, 查体: T 38.5 °C, 心肺正常, 血常规正常, 胸部 X 线片示右下肺少许薄片状阴影, 该患者经验性治疗首选的药物是

A. 阿莫西林

B. 阿奇霉素

C. 头孢呋辛

D. 奥司他韦

E. 阿米卡星

97. 女, 60 岁。上腹胀、隐痛 2 个月, 伴食欲减退、乏力、消瘦、大便发黑。查体: 消

瘦,浅表淋巴结无肿大。上消化道钡剂造影见胃窦部小弯侧黏膜紊乱,可见直径 3.5 cm 不规则充盈缺损,胃壁僵直。其最常见的转移途径是

- A. 胃肠道内转移
- B. 腹腔内种植
- C. 直接浸润
- D. 淋巴转移
- E. 血行转移

98. 男性,40 岁。因外伤性股骨干骨折而入院。入院次日突然出现呼吸困难,继发昏迷,皮下出血,血压 80/60 mmHg,其诊断最可能是

- A. 继发感染
- B. 大血管破裂
- C. 脂肪栓塞
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 骨折断端严重再移位

99. 男,22 岁。乏力,纳差 1 个月,水肿少尿伴血压升高 1 周,尿蛋白(++),尿 RBC 30~50/HP,血 Hb 76 g/L,补体 C3 正常,肌酐 421  $\mu\text{mol/L}$ 。B 超提示双肾,增大,血清抗肾小球基底膜抗体阳性,最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 II 型
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 急进性肾小球肾炎 III 型
- D. 急进性肾小球肾炎 I 型
- E. 急性肾小管坏死

100. 女,51 岁。白带带血 1 个月。复查,宫颈中度糜烂,易出血,子宫大小质地正常,附件正常。阴道镜下多点活检报告为 CIN III。其处理恰当的是

- A. 子宫根治术
- B. 子宫全切术
- C. 诊断性刮宫
- D. 定期随访

E. 激光治疗

101. 女,20 岁。左乳肿块 2 年,生长缓慢。查体:左乳外上象限扪及 2.5cm 分叶块,质硬,光滑,边界清楚,活动,无压痛,左侧腋窝未扪及肿大淋巴结。最可能的诊断是

- A. 乳腺癌
- B. 乳房纤维腺瘤
- C. 乳房肉瘤
- D. 乳腺囊性增生症
- E. 乳管内乳头状瘤



配套名师高清视频

102. 女,34 岁。双侧乳房胀痛 5 年余。胀痛症状在月经前出现,自己在乳房触及到不规则的“包块”,来月经后症状缓解,“包块”变小,另外与情绪和疲劳有一定关系。对这种疾病的描述,错误的是

- A. 多在双侧乳房出现不适症状
- B. 癌变发生率高,视为癌前病变
- C. 腺体可能会发生增生、萎缩等变化
- D. 常见于 25~45 岁的女性
- E. 一般认为与内分泌紊乱有关

103. 女,60 岁。被家人发现其昏迷在浴室中,浴室使用的是燃气热水器。查体:皮肤潮红,瞳孔正常大小,口唇樱桃红色。最可能的诊断是

- A. 一氧化碳中毒
- B. 安眠药中毒
- C. 有机磷农药中毒
- D. 乙醇中毒
- E. 阿托品中毒

104. 男,22 岁。乏力,纳差 1 个月,水肿少尿伴血压升高 1 周,尿蛋白(++),尿 RBC 30~50/HP,血 Hb 76g/L,补体 C3 正常,肌酐 421  $\mu\text{mol/L}$ 。B 超提示双肾,增大,血清抗肾小球基底膜抗体阳性,最可能的诊断是

- A. 急进性肾小球肾炎 II 型

- B.急性肾小球肾炎  
 C.急进性肾小球肾炎Ⅲ型  
 D.急进性肾小球肾炎Ⅰ型  
 E.急性肾小管坏死

105.女,26岁。停经19周,剧烈腹痛1天,超声提示单胎妊娠合并子宫肌壁间肌瘤,考虑该肌瘤为

- A.囊性变  
 B.玻璃样变  
 C.红色样变  
 D.肉瘤样变  
 E.钙化

106.男,30岁,个体户。有冶游史1周,2天前自觉尿痛、尿频,尿道口出脓。查体:尿道口有大量脓性分泌物。此时可能性最大的疾病是

- A.梅毒  
 B.生殖器疱疹  
 C.淋病  
 D.天疱疹  
 E.艾滋病

107.男,22岁。右腹部胀痛伴血尿3月余,KUB+IVU诊断右肾盂结石,大小1.8cm×1.2cm,右肾轻度积水,肾功能正常,首选的治疗方法

- A.药物排石  
 B.体外冲击波碎石  
 C.右肾盂切开取石术  
 D.经皮肾镜激光碎石

- E.抗感染

108.初产妇,26岁。妊娠40周,临产后产程进展顺利,胎头拨露时,胎心110次/分。应采取的措施是

- A.滴注稀释缩宫素  
 B.立即剖宫产  
 C.吸氧等待自然分娩  
 D.用胎儿监护仪器检测是否缺氧  
 E.会阴侧切,胎头吸引分娩

109.男,50岁。呕血、黑便4小时。发病前曾食硬质食物。发现HBsAg阳性30年。查体:P 108次/分,BP 90/60 mmHg。烦躁、面色苍白、皮肤湿冷。应首选考虑的出血原因是

- A.食管胃底静脉曲张破裂  
 B.食管肿瘤  
 C.胃溃疡  
 D.十二指肠溃疡  
 E.急性胃黏膜病变

110.女,50岁。头颈部、双上肢浅Ⅱ度烧伤。伤后第3天出现黑便,约700 mL。查体:P 107次/分,BP 85/60 mmHg。最可能的原因是

- A.胆道出血  
 B.消化性溃疡出血  
 C.应激性溃疡出血  
 D.食管溃疡  
 E.慢性胃炎出血

### B1型题

### 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(111~112题共用备选答案)

- A.中枢交感神经抑制剂

B.血管紧张素转换酶抑制剂

- C.β受体阻断剂

D.钙通道阻滞剂

E.血管紧张素Ⅱ受体阻断剂

111.合并支气管哮喘的高血压患者不宜选用的是

112.无合并症的老年单纯收缩期高血压患者首选的降压药是

(113~114题共用备选答案)

A.增生

B.化生

C.渗出

D.转化

E.伪膜

113.细菌性痢疾的渗出和坏死物形成的是

114.成纤维细胞损伤后转变为成骨细胞的是

(115~116题共用备选答案)

A.尿量少,CVP 很高

B.尿量少,CVP 很低

C.尿量多,CVP 较低

D.尿量多,CVP 偏高

E.尿量多,CVP 正常

115.说明抗休克治疗时血容量仍不足的是

116.说明抗休克治疗时液体已补足的是

(117~119题共用备选答案)

A.全神贯注

B.精确操作

C.合理配伍

D.镇静从容

E.争分夺秒

117.询问病史的道德要求是

118.急救工作对医生的道德要求是

119.药物治疗对医生的道德要求是

(120~121题共用备选答案)

A.微小病变肾病

B.系膜增生性肾小球肾炎

C.硬化性肾小球肾炎

D.新月体性肾小球肾炎

E.毛细血管内增生性肾小球肾炎

120.急性肾小球肾炎的病理类型是

121.急进性肾小球肾炎的病理类型是

(122~123题共用备选答案)

A.有创机械通气

B.无创机械通气

C.间断高浓度吸氧

D.持续高频呼吸机通气

E.持续低流量吸氧

122.慢性阻塞性肺疾病(COPD)的氧疗最常用的是

123.COPD急性加重伴呼吸功能不全早期,为防止呼吸功能不全加重最常用的是

(124~125题共用备选答案)

A.雌激素

B.孕激素

C.雄激素

D.甲硝唑

E.克霉唑

124.治疗滴虫性阴道炎宜选用的药物是

125.治疗外阴阴道念珠菌病宜选用的药物是

物是

(126~128题共用备选答案)

A.柯萨奇病毒

B.腺病毒

C.带状疱疹病毒

D.呼吸道合胞病毒

E.人类疱疹病毒6型

126.幼儿急疹的病原是



配套名师高清视频

127.咽结合膜热的病原是

128.疱疹性咽峡炎的病原是

(129~130 题共用备选答案)

A.慢性肺源性心脏病

B.高血压心脏病伴左心功能不全

C.扩张型心肌病

D.梅毒性心肌炎

E.风湿性心脏病

129.出现 Aschoff 细胞的是

130.出现心衰细胞的是

### A3/A4 型题

#### 答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(131~132 题共用题干)

男,30 岁。胃溃疡病史 3 年,今突发上腹剧痛、面色苍白、大汗。查体:全腹压痛,腹肌紧张,似穿孔。

131.胃溃疡穿孔多见的部位是

A.胃大弯

B.胃小弯

C.胃体

D.胃窦

E.胃底部

132.急性穿孔诊断后手术治疗效果最好的时间是

A.8 小时

B.10 小时

C.12 小时

D.24 小时

E.48 小时

(133~134 题共用题干)

女,33 岁。发现左乳房包块 10 天,无不适症状。查体:乳房视诊无异常,左乳房外上象限可触及 1.5cm×1.5cm 包块,质硬,不光滑,活动度良好,左腋窝未触及肿大淋巴结。钼靶 X 线片检查示 1.5cm×1.5cm 密度

增高影,周边有小毛刺,中央可见聚集细小钙化点。

133.准备手术治疗,以下可选择的术式中,必须在术后放疗的是

A.乳腺癌根治术

B.全乳房切除术

C.保留胸大、小肌的改良根治术

D.保留胸大肌的改良根治术

E.保留乳房的乳腺癌切除术

134.该患者首选的化疗方案的药物是

A.长春新碱、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶

B.环磷酰胺、泼尼松、氟尿嘧啶

C.环磷酰胺、甲氨蝶呤、氟尿嘧啶

D.长春新碱、阿霉素、氟尿嘧啶

E.长春新碱、环磷酰胺、氟尿嘧啶

(135~136 题共用题干)

女,32 岁。G2P1,既往月经规律,月经量少,身体健康,要求长期采取避孕措施。

135.首选的避孕方法是

A.紧急避孕药

B.宫内节育器

C.安全期避孕

D.长效口服避孕药

E.外用杀精子剂

136.其避孕原理是

A.阻止精子跟卵子相遇

B.抑制卵巢排卵

C.影响精子获能

D.干扰受精卵着床

E.改变宫颈黏液性状

(137~138 题共用题干)

女,50岁。右腹股沟下方包块3年,平卧后可变小。4小时前搬重物后,包块突然增大,并出现胀痛,逐渐加重。1小时前出现右下腹阵发性绞痛。查体:表情痛苦,肠鸣音亢进,可闻及气过水声。右腹股沟下方可及3 cm×3 cm包块,触痛明显,无搏动感,平卧手法还纳未成功。

137.如行外科治疗,传统术式中最常用的是

A.Shouldice 法

B.Ferguson 法

C.Halsted 法

D.Bassini 法

E.McVay 法

138.处理疝囊后,一般将切断的腹股沟韧带修复缝合在

A.精索后方与联合腱上

B.精索前方下腹外斜肌腱膜上

C.耻骨肌筋膜上

D.精索后方与腹外斜肌腱膜上

E.精索前方与联合腱上

(139~140 题共用题干)

女,62岁。胸闷、气促2周。查体:吸气时 BP 85/60 mmHg,呼气时 BP 100/75 mmHg,心尖搏动减弱,心界向两侧扩大,心率125次/分,律齐,心音低钝、遥远,心脏各瓣

膜区未闻及杂音。

139.与上述临床表现相符合的体征是

A.DeMusset 征

B.Corrigan 征

C.Ewart 征

D.Quincke 征

E.Traube 征

140.最有助于确诊的辅助检查是

A.胸部 X 线片

B.动态血压监测

C.超声心动图

D.心电图

E.肺功能

(141~142 题共用题干)

男,28岁。车祸后胸痛、呼吸困难40分钟。曾咳出少量血痰,无恶心、呕吐,无腹胀、腹痛,无意识障碍。查体:P 118次/分,R 26次/分,BP 90/60 mmHg。气管右偏,左侧胸壁皮肤淤青,无皮下气肿,左侧4、5、7肋骨触痛明显,可触及骨擦感,左胸叩诊鼓音,呼吸音减弱,心律齐,未闻及心脏杂音。腹软,无压痛,肝脾肋下未触及。四肢活动尚可,病理反射未引出。辅助检查:Hb 100 g/L,RBC  $3.2 \times 10^{12}/L$ ,胸部 X 线片示4、5、7侧肋骨折,左侧气胸,肺组织物70%,左侧胸腔中等量积液。

141.需要立即给予的处理是

A.加压包扎固定胸廓

B.胸腔闭式引流

C.静脉输血

D.剖腹探查

E.穿刺排气减压

142.根据患者目前病情推断,最有可能合并存在的是



配套名师高清视频

- A. 连枷胸
- B. 张力性气胸
- C. 创伤性气胸
- D. 开放性气胸
- E. 闭合性气胸

(143~144 题共用题干)

男,71 岁。间断咳嗽咳痰 20 余年,加重伴喘憋 1 周。近 2 天出现嗜睡。查体,意识模糊。口唇发绀,球结膜水肿,双肺满布哮鸣音。双下肢水肿。

143. 该患者出现意识障碍最主要的机制是

- A. 心源性休克
- B. 电解质紊乱
- C. 肺性脑病
- D. 感染中毒性脑病
- E. 脑出血

144. 患者经吸氧治疗后呼吸困难进一步加重。血气分析示 pH 7.10, PaO<sub>2</sub> 65 mmHg, PaCO<sub>2</sub> 102 mmHg, 查体:昏睡,口唇发绀,双肺散在干湿性啰音。此时,应首选的治疗措施是

- A. 糖皮质激素静脉滴注
- B. 大剂量利尿剂静脉滴注
- C. 呼吸兴奋剂静脉滴注
- D. 静脉应用广谱抗生素
- E. 机械通气

(145~146 题共用题干)

女,28 岁。进行性痛经 8 年,婚后 5 年未孕。妇科检查:子宫大小正常,后位,固定,盆底可触及多个痛性结节,右侧附件区触及直径约 6 cm 的囊性包块,不活动,左侧附件区组织略增厚。

145. 首先考虑的诊断是

- A. 盆腔结核
- B. 原发性痛经
- C. 慢性盆腔炎
- D. 卵巢肿瘤
- E. 子宫内膜异位症

146. 首选的治疗方案为

- A. 手术治疗
- B. 孕激素治疗
- C. 抗感染治疗
- D. 抗结核治疗
- E. 镇痛治疗

(147~148 题共用题干)

男,50 岁。因胆道梗阻并发休克入院,使用去甲肾上腺素升压,血压不易维持,波动较大,应用氢化可的松后血压上升并维持平稳,治疗 3 天时,患者出现精神失常,躁狂。

147. 患者出现精神失常,躁狂,因氢化可的松

- A. 提高中枢神经的兴奋性
- B. 加速蛋白质的分解代谢
- C. 过量引起感染的扩散
- D. 减少脑组织对葡萄糖的利用
- E. 增强升压药的作用

148. 加用氢化可的松后,去甲肾上腺素升压作用增强的这种现象是

- A. 两种药物作用的协同
- B. 糖皮质激素的允许作用
- C. 糖皮质激素的刺激作用
- D. 糖皮质激素的抗感染作用
- E. 两种药物作用的叠加

(149~150 题共用题干)

女,26 岁。因甲状腺功能亢进行甲状腺切除,术后第二天出现手足抽搐。



149.最可能的原因是

- A.喉上或喉返神经损伤
- B.甲状腺功能低下
- C.甲状腺危
- D.甲状旁腺功能低下
- E.喉头水肿

150.采用的治疗方法是

- A.颈部理疗
- B.口服甲状腺素片
- C.口服复方碘化钾溶液
- D.静脉注射 10% 葡萄糖酸钙
- E.气管切开

本单元试卷到此结束



## 参考答案

### 第二单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	E	A	C	D	B	A	E	E	D
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	E	A	D	E	A	A	D	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	C	B	C	D	D	E	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	A	A	C	D	D	B	A	E
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
D	E	A	B	D	E	C	A	D	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	D	C	A	A	C	E	C	B
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
E	A	C	D	B	B	B	C	E	D
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
A	C	C	D	C	B	C	E	B	B
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	D	C	C	D	C	B	B	D	E
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
C	D	E	C	E	B	D	C	D	B
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
B	B	A	C	C	C	B	E	A	C
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
C	D	E	B	C	E	A	E	C	E

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	E	B	D	E	E	B	A	E	B
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
B	A	E	C	B	D	E	C	C	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
B	A	C	E	E	A	D	B	D	D

35.【解析】左室射血分数,即 LVEF(Left Ventricular Ejection Fractions),是指:每搏输出量占心室舒张末期容积量的百分比。心室收缩时并不能将心室的血液全部射入动脉,正常人静息状态下,心室舒张期的容积;左心室约为 145mL,右心室约为 137mL,搏出量为 60~80mL,即射血完毕时心室尚有一定量的余血,把搏出量占心室舒张期容积的百分比称为射血分数,一般 50%以上属于正常范围,人体安静时的射血分数约为 55%~65%。正常情况下左室射血分数为 $\geq 50\%$ ;右心室射血分数为 $\geq 40\%$ 。若小于此值即为心功能不全。射血分数与心肌的收缩能力有关,心肌收缩能力越强,则每搏输出量越多,射血分数也越大。

38.【解析】①结核性心包炎治疗:尽早抗结核治疗,并给予足够的剂量和较长的疗程,直至结核活动停止 1 年左右方可停药。晚期若出现心脏压塞,可行心包穿刺抽液术。依据题意:结核性心包炎早期治疗,应该是抗结核治疗,故最佳答案为 B。(注意:结核性胸膜炎的早期治疗是药物治疗+反复穿刺抽液;结核性心包炎的早期治疗是药物治疗。)②糖皮质激素的疗效不确切,不作为常规,故 A 错。营养支持、口服利尿药属一般性治疗,故 CE 错。

49.【解析】一秒用力呼气容积/用力肺活量( $FEV_1/FVC$ )是评估气流受限的一项敏感指标,也是临床上诊断慢阻肺最常见的指标。使用支气管扩张剂后, $FEV_1/FVC < 0.70$ ,可确定为持续气流受限(D 对)。残气量/肺总量( $RV/TLC$ ) $> 0.40$ 对诊断阻塞性肺气肿有重要价值。 $FEV_1\%$ 预计值为评价 COPD 严重程度的指标。峰流速(PEF)、用力肺活量(FVC)对诊断早期气流受限价值不大。故 ABCE 错。

50.【解析】过去曾将肺动脉高压分为原发性和继发性两类,ABCDE 都是继发性肺动脉高压的原因,但临床上以慢性阻塞性肺疾病(COPD)最多见,约占 80%~90%(C)。

58.【解析】X 线检查示:心影正常或左心室轻度增大,左心房可能轻度增大,升主动脉根部常见狭窄后扩张。在侧位透视下可见主动脉瓣钙化。晚期可有肺淤血征象。梨形心见于二尖瓣狭窄时左心房扩大,心腰膨隆。普大型心见于扩张型心肌病;长期高血压导致左心室肥厚增大,严重时导致主动脉明显扩张。心室收缩时心房反向膨出是二尖瓣关闭不全的典型 X 线表现。

60.【解析】感染性心内膜炎常出现原有心脏杂音强度和性质的变化。75%~85%的患者血培养阳性,为诊断本病最直接的证据。还出现心脏短期内出现的高调杂音或原有的杂音迅速改变。

71.【解析】①原发性肺脓肿又称为吸入性肺脓肿,患者多有吸入感染的因素,如齿、口、咽喉的感染灶,或手术、醉酒、劳累和脑血管病等病史,患者急性起病,寒战、高热,咳大量脓臭痰;②血源性肺脓肿多先有原发病灶引起的畏寒、高热等感染中毒症的表现;③急性脓气

胸大多数继发于肺部感染(如肺炎、脓胸),特别发生在婴幼儿;④干酪性肺炎系结核杆菌引起,多有结核中毒症状,如长期不规则低热、盗汗、乏力、食欲减退等;⑤金黄色葡萄球菌肺炎的典型痰为黄色脓性痰或粉红色乳状脓性痰,故本题选 A。

78.【解析】①患者活动后心悸气急,肝大、腹水、下肢水肿等体循环淤血征,可诊断为右心衰竭(E)。②肝硬化晚期一般表现为肝脏缩小,且很少出现活动后心悸气急。肝癌常表现为肝脏肿大,质硬,表面结节或肿块状,不光滑。肺结核临床上罕见(肝脏血液循环丰富)。题干所述与肾病综合征无关。因此 ABCD 项均错。

95.【解析】骨盆挤压试验和分离试验阳性为骨盆骨折的特有体征。患者高空坠落伤,髂骨挤压分离试验阳性,应诊断为骨盆骨折。患者骨盆骨折后尿潴留,导尿管不能插入,应考虑尿道断裂,而不是膀胱破裂,膀胱破裂者导尿管可插入膀胱。

98.【解析】据骨折后突然出现呼吸困难,考虑肺梗死,因此最可能的诊断是脂肪栓塞。

101.【解析】年轻女性,乳房肿块光滑、质硬、活动,为乳腺纤维腺瘤的特点,诊断为乳房纤维腺瘤。

102.【解析】①与月经周期有关的乳房胀痛+乳房肿块,为乳腺囊性增生病的特点;②本病可见于一侧或双侧乳房;③8 版外科学 P255 认为“应特别注意乳腺癌与乳腺病同时存在的可能”,暗示乳腺病与乳腺癌是两个不同的疾病,并不是癌前病变。故 B 错,答案为 B。

103.【解析】口唇樱桃红色为一氧化碳中毒的特征性体征。

(122~123 题)【解析】①慢阻肺患者宜采用长期持续低流量给氧,从而可以提高生活质量和生存率。促使患者在静息状态下氧分压在 60 mmHg 以上,而吸入高浓度氧后可导致 CO<sub>2</sub> 麻醉(选 E);②慢阻肺早期肺功能不全,所以持续低流量吸氧不能保证需求,患者尚未昏迷,可用无创机械通气(选 B),其余均不选。

(133~134 题)【解析】①中年女性患者左乳房无痛性肿块,位于外上象限(乳癌好发部位),钼靶摄片示肿块影,周边毛刺征,应诊断为左乳腺癌。保留乳房的乳癌切除术只完整切除了肿块、清扫了腋淋巴结,并没有切除乳房,为预防局部复发,术后必须辅以放射治疗(E);②HER-2 基因过度表达者,可给予曲妥珠单抗(商品名赫赛汀)进行靶向治疗有一定效果。雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)是决定是否进行内分泌治疗的指标;③乳腺癌的化疗常采用 CMF 或 CAF 方案。CMF 方案为环磷酰胺+甲氨蝶呤+氟尿嘧啶,CAF 方案为环磷酰胺+阿霉素+氟尿嘧啶。

110-3

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

# 2019 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业医师

第三单元

考生姓名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_

考场号：\_\_\_\_\_

## 答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8. 考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 第三单元

## A1 型题

## 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 下列临床表现与急性肾小球肾炎不符合的是

- A. 链球菌感染后两周出现血尿、蛋白尿
- B. 病程中出现  $C_3$  下降
- C. 高血压持续 2 个月以上
- D. 可并发心力衰竭
- E. 部分患者要有 ASO 水平升高

2. 疏松结缔组织的弥漫性化脓性炎症属于

- A. 肉芽肿
- B. 浆液性炎
- C. 卡他性炎
- D. 蜂窝织炎
- E. 纤维素性炎

3. 体内脂肪大量动员时, 肝内乙酰 CoA 主要生成的物质是

- A. 胆固醇
- B. 酮体
- C. 葡萄糖
- D. 脂肪酸
- E. 二氧化碳和水

4. 区别血红蛋白尿与血尿的主要方法

- A. 尿蛋白电泳
- B. 尿沉渣镜检
- C. 尿蛋白定性试验
- D. 尿比重
- E. 尿胆红素

5. 慢性肾衰竭失代偿期是指 GFR(肾小球滤过滤)的范围是

A. >25 mL/分

B. 25~50 mL/分

C. 50~60 mL/分

D. 60~70 mL/分

E. 70~80 mL/分

6. 最常出现 ANCA(中性粒细胞胞浆抗体)阳性的肾病是

- A. 急进性肾小球肾炎
- B. 急性肾小球肾炎
- C. 狼疮肾炎
- D. 急性间质性肾炎
- E. 急性肾小管坏死

7. 对上、下尿路感染无鉴别意义的是

- A. 尿渗透压
- B. 尿培养
- C. 抗体包被细菌
- D. 尿白细胞管型
- E. 肾区叩痛

8. 口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血者, 下列化验最先上升的是

- A. 网织红细胞
- B. 血红蛋白
- C. MCV
- D. MCH
- E. MCHC

9. 下列可出现原位溶血的疾病是

- A. 遗传性球形细胞增多症
- B. G6PD 缺乏症
- C. 骨髓增生异常综合征



配套名师高清视频

- D.异常血红蛋白病  
E.阵发性睡眠性血红蛋白尿
- 10.高钾血症常见的临床表现是  
A.心动过缓  
B.肠蠕动消失  
C.四肢肌张力增强  
D.便秘  
E.心动过速
- 11.狼疮肾炎诱导期治疗中,以下免疫抑制剂首选的是  
A.硫唑嘌呤  
B.甲氨蝶呤  
C.环磷酰胺  
D.来氟米特  
E.雷公藤
- 12.鹿角形肾结石引起泌尿道的病理生理改变,最严重的后果是  
A.尿路梗阻  
B.尿路感染  
C.尿路上皮恶变  
D.肾积水  
E.尿毒症
- 13.引起尖锐湿疣的病原体是  
A.人免疫缺陷病毒  
B.人乳头瘤病毒  
C.EB 病毒  
D.水痘-带状疱疹病毒  
E.巨细胞病毒
- 14.血管紧张素转换酶抑制剂最适用的临床情况是  
A.高血压伴主动脉瓣狭窄  
B.妊娠期高血压  
C.高血压伴左心室肥厚  
D.高血压伴高血钾血症  
E.高血压伴双侧肾动脉狭窄
- 15.有关肛裂的描述,正确的是  
A.老年人发病率高  
B.常伴发大出血  
C.最常见于膝胸位肛门 12 点处  
D.应以手术治疗为主  
E.多因慢性腹泻发生
- 16.肾癌典型的临床表现是  
A.消瘦、肿块和疼痛  
B.高血压、肿块和疼痛  
C.血尿、肿块和疼痛  
D.发热、肿块和疼痛  
E.水肿、肿块和疼痛
- 17.急性肾小球肾炎的主要临床表现是  
A.少尿,水肿,蛋白尿,低蛋白血症  
B.血尿,蛋白尿,水肿,低蛋白血症  
C.水肿,蛋白尿,血尿,高血压  
D.血尿,少尿,水肿,尿白尿  
E.水肿,少尿,蛋白尿,高血压
- 18.急性肾功能衰竭少尿期结束的标志是指 24 小时尿量至少增加至  
A.250 mL  
B.300 mL  
C.350 mL  
D.400 mL  
E.500 mL
- 19.肾病综合征最重要的诊断依据是  
A.24 小时尿蛋白>3.5 g,血浆白蛋白<30 g/L  
B.血浆白蛋白<30 g/L,血胆固醇及甘油三酯升高  
C.24 小时尿蛋白>3.5 g,双下肢凹陷性浮肿  
D.24 小时尿蛋白>3.5 g,血胆固醇及甘油三酯升高  
E.血胆固醇及甘油三酯升高,双下肢凹陷性浮肿
- 20.有关铁的描述,正确的是  
A.食物中的铁以二价铁为主  
B.肠黏膜吸收的铁为二价铁  
C.转铁蛋白结合的铁为二价铁  
D.体内铁蛋白中结合的铁为二价铁  
E.血红蛋白中为三价铁
- 21.不支持慢性粒细胞白血病加速期



的是

- A. 外周血中原始粒细胞大于等于 5%
- B. 骨髓中原始粒细胞大于等于 10%
- C. 外周血嗜碱性粒细胞大于 20%
- D. 不明原因的血小板进行性减少
- E. 不明原因的血小板进行性增加

22. 能同时启动内源和外源性凝血途径

引起 DIC 的是

- A. 羊水栓塞
- B. 急性早幼粒细胞白血病
- C. 广泛创伤
- D. 大型手术
- E. 严重感染

23. 下列属于 T 细胞淋巴瘤的是

- A. 边缘区淋巴瘤
- B. 滤泡性淋巴瘤
- C. 套细胞淋巴瘤
- D. 间变大细胞淋巴瘤
- E. Burkitt 淋巴瘤

24. 提示心包积液的体征是

- A. Musset 征
- B. 脉短绌
- C. Ewart 征
- D. Roth 斑
- E. Duroziez 征

25. 感染转为局限性化脓的主要原因是

- A. 人体抵抗力占优势
- B. 病灶局部组织血循障碍
- C. 病灶仍有大量细菌
- D. 抗生素使用剂量不足
- E. 致病菌毒力强大

26. 慢性心功能衰竭急性加重的最常见诱因是

- A. 肺部感染
- B. 心肌缺血
- C. 情绪激动
- D. 输液过多
- E. 输液过快

27. 高血压伴低钾血症应首先考虑

- A. 皮质醇增多症
- B. 原发性醛固酮增多症
- C. 嗜铬细胞瘤
- D. 肾实质性高血压
- E. 肾动脉狭窄

28. 具有典型 Whipple 三联征的疾病是

- A. 胰岛素瘤
- B. 胃泌素瘤
- C. 肠肽瘤
- D. 高血糖瘤
- E. 生长抑素瘤



配套名师高清视频

29. 胃癌淋巴结转移的常见部位是

- A. 右锁骨上
- B. 左锁骨上
- C. 右颈部
- D. 左颈部
- E. 左颌下

30. 鉴别室速与阵发性室上速最有力的证据是

- A. QRS 波群宽大畸形的程度
- B. 是否存在房室分离
- C. 心室率的快慢
- D. 静脉应用普罗帕酮是否可终止
- E. 对迷走神经刺激的反应

31. 变异型心绞痛抗心肌缺血治疗, 首选的药物是

- A. 抗血小板药
- B. 长效硝酸酯类
- C. 低分子肝素
- D. 钙通道阻滞剂
- E.  $\beta$  受体拮抗剂

32. 可使梗阻性肥厚型心肌病患者的胸骨左缘 3~4 肋间收缩期杂音减轻的方法是

- A. 做 Valsalva 动作
- B. 含服硝酸甘油
- C. 取站立位
- D. 应用强心药
- E. 口服  $\beta$  受体拮抗剂

33. Child 肝功能分级依据, 不包括

- A. 血胆红素清值  
 B. 血清白蛋白值  
 C. 食管静脉曲张程度  
 D. 是否存在腹水及其程度  
 E. 营养状态
34. 急诊肝衰竭实验室检查一般不会出现的结果是  
 A. 转氨酶增高  
 B. 胆红素增高  
 C. 凝血酶原时间缩短  
 D. 血肌酐增高  
 E. 纤维蛋白原减少
35. 血红素合成障碍所致的贫血  
 A. 再生障碍性贫血  
 B. 缺铁性贫血  
 C. 巨幼细胞贫血  
 D. 海洋性贫血  
 E. 自身免疫性溶血性贫血
36. 口服铁剂治疗有效的缺铁性贫血者, 下列化验最先上升的是  
 A. 网织红细胞  
 B. 血红蛋白  
 C. MCV  
 D. MCH  
 E. MCHC
37. 在 ITP 的免疫抑制治疗中, 最常用的免疫抑制剂是  
 A. 阿糖胞苷  
 B. 长春新碱  
 C. 柔红霉素  
 D. 左旋门冬酰胺酶  
 E. 足叶乙甙
38. 下列符合急性心包炎胸痛临床特点的是  
 A. 疼痛不放射  
 B. 吞咽动作时减轻  
 C. 随渗液量的增多而加重  
 D. 深呼吸时减轻  
 E. 咳嗽时加重
39. 急性心肌梗死发病后 12 天血清检查仍可能高于正常的指标是  
 A. 肌酸磷酸激酶的同工酶 CK-MB  
 B. 天门冬氨酸基转移酶  
 C. 肌钙蛋白 I  
 D. 肌酸磷酸激酶  
 E. 肌钙蛋白 T
40. 刺激悬雍垂后, 心率突然降至 68 次/分, 停止刺激未再变化, 最可能诊断为  
 A. 阵发性室上性心动过速  
 B. 窦性心动过速  
 C. 心房扑动  
 D. 阵发性室性心动过速  
 E. 阵发性房颤
41. 如果肠系膜上动脉起始部发生血栓栓塞, 造成血运障碍的所有肠段为  
 A. 十二指肠、空肠、回肠  
 B. 全部小肠和全部结肠  
 C. 全部小肠, 盲肠和升结肠  
 D. 升结肠和横结肠  
 E. 降结肠、乙状结肠和直肠
42. 肛裂“三联征”  
 A. 肛裂, 前哨痔和肝周脓肿  
 B. 肛裂, 肛乳头肥大和肛周脓肿  
 C. 肛裂, 前哨痔和肛乳头肥大  
 D. 肛裂, 大便失禁和肛乳头肥大  
 E. 肛裂, 前哨痔和大便失禁
43. 克罗恩病的手术指征不包括  
 A. 肠内瘘  
 B. 慢性肠穿孔  
 C. 发热、腹痛、体重下降  
 D. 肠管狭窄  
 E. 持续出血
44. 休克病人动态监测中心静脉压值为 25 cmH<sub>2</sub>O, 表示  
 A. 肺梗死  
 B. 静脉血管床过度收缩  
 C. 肺循环阻力增加  
 D. 血容量不足

- E.充血性心力衰竭
- 45.手术区皮肤消毒范围边缘至少距手术切口
- A.15 cm  
B.13 cm  
C.10 cm  
D.20 cm  
E.17 cm
- 46.关于创伤时应用止血带,正确的是
- A.止血带一般使用时间不超过4小时  
B.止血带每隔2小时松开2~3分钟  
C.紧急时可用电线充当止血带  
D.松开止血带时,伤口处不应加压,以免影响血供  
E.止血带的位置应在伤处的上一个关节处
- 47.外科救治感染性休克时不正确的做法是
- A.应用抗菌药物  
B.补充血容量  
C.抗休克同时抗感染  
D.使用皮质激素  
E.采用血管扩张药物治疗
- 48.下列开放性创伤中可以进行清创缝合的是
- A.面部锐器伤6小时的伤口  
B.已有脓性分泌物的伤口  
C.有明显局部红、肿、热、痛的伤口  
D.刚被手术缝针刺伤的伤口  
E.四肢损伤超过18小时的伤口
- 49.提示胸腔手术后内出血的指征是引流管中每小时引流出血液量持续超过
- A.150 mL  
B.100 mL  
C.150 mL  
D.200 mL  
E.250 mL
- 50.枕骨大孔疝的临床表现不包括
- A.昏迷

- B.呕吐  
C.颈项强直  
D.双侧瞳孔大小多变  
E.尿崩
- 51.癫痫用药应遵循的原则是
- A.按类型用药,联合用药、早期用药、小量起始  
B.个体化治疗、尽量单药、早期用药、足量起始  
C.按类型用药、联合用药、早期用药、长期治疗  
D.个体化治疗、联合用药、早期用药、长期治疗  
E.按类型用药、尽量单药、个体化治疗、足量起始
- 52.属于良性肿瘤的是
- A.神经鞘瘤  
B.精原细胞瘤  
C.唾液腺混合瘤  
D.霍奇金瘤  
E.Paget病
- 53.颅内肿瘤非定位症状的是
- A.头痛、视乳头水肿  
B.癫痫、幻嗅  
C.肢体运动和感觉障碍  
D.视力、视野障碍  
E.眼睑下垂、眼球运动障碍
- 54.腋窝 II 组淋巴结位于
- A.胸大肌外侧  
B.胸小肌外侧  
C.胸大、小肌间  
D.胸小肌后  
E.胸小肌内侧
- 55.对重型肝炎的判断下列最重要的是
- A.ALT>500 U/L  
B.总胆红素>171 mmol/L  
C.PTA<40%  
D.电解质紊乱  
E.WBC  $15 \times 10^9/L$



配套名师高清视频

56. 下列不属于内分泌腺体功能减退原因的是

- A. 肿瘤
- B. 增生
- C. 感染
- D. 药物
- E. 遗传

57. 关于甲亢手术治疗的适应证, 不正确的是

- A. 高功能腺瘤
- B. 中度以上原发甲亢
- C. 甲状腺肿大有压迫症状
- D. 青少年患者
- E. 抗甲状腺药物或放射性<sup>131</sup>I 治疗无效者

58. 肝硬化腹水形成的决定性因素是

- A. 中心静脉压增高
- B. 门静脉高压
- C. 醛固酮分泌增加
- D. 抗利尿激素增加
- E. 肝内淋巴液容量增加和淋巴回流不畅

59. 在腹股沟管的解剖结构中, 下列错误的是

- A. 内口为内环, 外口为皮下环
- B. 上壁为腹外斜肌的弓状下缘
- C. 下壁为腹股沟韧带和陷窝韧带
- D. 前壁为腹外斜肌腱膜
- E. 后壁为腹横筋膜和腹膜

60. 血栓闭塞性脉管炎查体的特异性体征是

- A. 足背动脉搏动消失
- B. Hoffman 征阳性
- C. Trendelenburg 试验阳性
- D. Perthies 试验阳性
- E. Buerger 试验阳性

61. 升结肠癌的主要表现是

- A. 便秘
- B. 肠梗阻

C. 便血

D. 贫血

E. 腹泻

62. 胸腔闭式引流管应插入液面下

- A. 1~2 cm
- B. 3~4 cm
- C. 5~6 cm
- D. 7~8 cm
- E. 10 cm 以上

63. 急性胰腺炎最常见的临床表现是

- A. 腹泻
- B. 呕吐
- C. 停止排气排便
- D. 黄疸
- E. 左上腹部疼痛

64. 伴有黄疸, 肝功能不全的急性胆囊炎、胆石症患者不应进行的检查是

- A. 肝功能检查
- B. B 超检查
- C. 胸腹透视
- D. 经皮肝穿刺造影
- E. MRCP

65. 某战士参加野营拉练归来途中自觉右小腿疼痛, 经休息治疗 2 周后无好转, 拍 X 线片检查发现右腓骨下段横行骨折线, 无移位, 其骨折的主要成因是

- A. 直接暴力
- B. 积累性劳损
- C. 间接暴力
- D. 肌拉力
- E. 骨髓炎

66. 不属于骨折特有体征的是

- A. 畸形
- B. 骨擦音
- C. 局部肿胀
- D. 局部异常活动
- E. 骨擦感

67. 股骨颈骨折的常见体征是患肢多呈

- A. 屈曲、内收、内旋畸形

- B.伸直、外展、内旋畸形
- C.短缩、内旋、外展畸形
- D.短缩、外旋、内收畸形
- E.屈曲、外展、内旋畸形

68.股骨颈骨折内收型其 Pauwels 角度是

- A.大于 50 度
- B.小于 50 度
- C.小于 40 度
- D.小于 30 度
- E.等于 30 度



配套名师高清视频

69.臀位娩出婴儿,生后发现左大腿肿胀、缩短畸形,并有异常活动。其首选的治疗方法应该是

- A.切开复位内固定手术
- B.手法复位,小夹板外固定
- C.垂直悬吊牵引
- D.蛙位石膏外固定
- E.将伤肢用绷带固定于胸腹部

70.肱骨髁上骨折后出现手指不能内收、外展,夹纸试验阳性,最可能损伤的神经是

- A.桡神经
- B.肌皮神经
- C.尺神经
- D.正中神经
- E.腋神经

71.颈椎病的鉴别诊断中,肩周炎不可能出现

- A.三角肌萎缩
- B.斜方肌痉挛
- C.肩痛及上臂痛
- D.前臂和手疼痛
- E.大范围活动时,疼痛加剧

72.出现咽下困难最早的是哪型食管癌

- A.髓质型
- B.溃疡型
- C.蕈伞型

- D.缩窄型
- E.混合型

73.Beck 三联征是指

- A.静脉压降低,心音微弱,动脉压降低
- B.静脉压升高,心音减弱,动脉压降低
- C.静脉压降低,心音有力,动脉压升高
- D.静脉压升高,心音有力,动脉压升高
- E.静脉压正常,心音正常,动脉压正常

74.右三叉神经病损表现为

A.右面部痛温觉障碍,张口下颌偏向右侧

B.右面部痛温觉障碍,张口下颌偏向左侧

C.右面部痛温觉障碍,右闭目不能

D.右面部痛温觉障碍,左闭目不能

E.左面部痛温觉障碍,张口下颌偏向右侧

75.早期诊断急性血源性骨髓炎最有价值的方法是

- A.X 线片
- B.CT
- C.核素骨扫描
- D.局部分层穿刺
- E.血培养

76.类风湿关节炎的临床特点不包括

- A.类风湿因子常阳性
- B.晨僵持续时间大于 1 小时
- C.非甾体抗炎药能改善关节疼痛
- D.反复发作虹膜睫状体炎
- E.多关节、小关节受累

77.对于膝关节骨关节炎的叙述,正确的是

- A.负重较少
- B.尽早行人工关节表面置换术
- C.晚期可出现关节畸形
- D.膝内翻时可行软组织松解
- E.主要病变是关节滑膜的退行性变

**A2 型题****答题说明**

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

78.男性,50 岁。因胃癌伴重度贫血入院,既往体健,无输血史,术前化验 Hb 56 g/L,为纠正贫血。下列最合适的输血治疗是

- A.输全血
- B.输浓缩红细胞
- C.输洗涤红细胞
- D.输去白细胞的红细胞
- E.输冷冻红细胞

79.女,40 岁。2 天前体检超声提示胆囊内 3cm 强回声团,后伴声影,胆囊壁厚 6mm。平素无不适。糖尿病病史 5 年,目前血糖控制良好。无腹部手术史,其他检查未见异常。最适合该患者治疗方案是

- A.腹腔镜胆囊切除术
- B.保守治疗
- C.ERCP 取石
- D.开腹胆囊切除术
- E.胆囊造瘘术

80.男,60 岁。上腹胀、隐痛伴皮肤黄染、食欲不振、厌油腻饮食 1 个月,症状进行性加重,体重共减轻 5kg。10 天前开始大便颜色逐渐变浅,近 2 天大便呈白陶土样。查体:巩膜明显黄染,肝肋下未触及,右肋缘下可触及肿大的胆囊底部,无触痛。实验室检查:血总胆红素 340  $\mu\text{mol/L}$ ,血 AFP5 $\mu\text{g/L}$ 。最可能的诊断

- A.胆囊结石
- B.肝门部胆管癌
- C.肝癌
- D.胆总管下段癌
- E.胆总管结石

81.男,35 岁。车祸后双侧股骨干骨折。BP 160/90 mmHg,中心静脉压 8  $\text{cmH}_2\text{O}$ ,首

选的处理措施是

- A.大量输血
- B.强心药治疗
- C.糖皮质激素治疗
- D.应用肾上腺素
- E.补液治疗

82.男性,45 岁。查体发现肝硬化 5 年。3 天前与朋友聚餐时出现呕血,鲜红色,量约 1 000 mL。患者出现头晕、心慌、出冷汗等。经输血、补液和应用止血药物治疗后病情好转,血压和心率恢复正常。1 天前出现睡眠障碍。并出现幻听和言语不清。化验检查示:血氨 130  $\mu\text{g/dl}$ ,血糖 5.6 mmol/L,尿素氮 7.2 mmol/L,该患者最可能的诊断是

- A.尿毒症
- B.肝性脑病
- C.乙型肝炎
- D.糖尿病酮症酸中毒
- E.脑血管意外

83.男,50 岁。呕血、黑便 4 小时。发病前曾食硬质食物。发现 HBsAg 阳性 30 年。查体:P 108 次/分,BP 90/60 mmHg。烦躁、面色苍白、皮肤湿冷。应首选考虑的出血原因是

- A.食管胃底静脉曲张破裂
- B.食管肿瘤
- C.胃溃疡
- D.十二指肠溃疡
- E.急性胃黏膜病变

84.男性,50 岁,安徽人。因反复腹泻腹胀 6 个月,呕血伴黑便 2 天就诊。体检:肝肋下 2 cm,脾肋下 4 cm。血常规示嗜酸性粒细胞增多,三系下降。肝脏 B 超提示网状分

隔样纤维化。首先考虑的诊断为

- A. 血吸虫肝硬化并发上消化道出血
- B. 乙肝肝硬化并发上消化道出血
- C. 肝细胞肝癌并发上消化道出血
- D. 门脉性肝硬化并发上消化道出血
- E. 急性出血性胃炎

85. 男, 8 岁额部多发性疖肿, 不慎碰伤额部, 致使局部红肿扩大, 弛张型高热、头痛、恶心、烦躁, 4 天后臀部皮下又发现一肿块, 疼痛、压痛明显, 且有波动感。诊断应考虑为

- A. 菌血症
- B. 败血症
- C. 毒血症
- D. 脓毒血症
- E. 冷脓肿

86. 男, 56 岁。皮肤黄染 1 个月, 逐渐加深, 伴皮肤瘙痒, 大便灰白色, 无发热。查体: T 36.8 °C, P 85 次/分, R 18 次/分, P 130/80 mmHg, 巩膜、皮肤黄染, 双肺呼吸音清、未闻及干湿性啰音, 心律齐。腹软, 肝肋下 4 cm, 未触及肿大胆囊, Murphy 征阴性。腹部 CT: 肝总管上段 2 cm×1.5 cm 占位病变, 最适宜的术式是

- A. 肝门胆管、胆囊、部分肝外胆管及部分肝门区的肝组织切除
- B. 全胰腺切除术
- C. ERCP 取石术
- D. 胰头十二指肠切除术
- E. 左三叶肝切除

87. 女性, 35 岁, 中上腹疼痛 8 小时, 伴寒战高热 4 小时, 以往曾因胆石症而行胆囊切除术。体格检查: 体温 39.2 °C, 巩膜可疑黄染, 腹平, 中上腹压痛明显, 轻度肌紧张及反跳痛, 肝区叩痛明显。拟诊为

- A. 急性出血性坏死性胰腺炎
- B. 急性坏疽性阑尾炎
- C. 急性绞窄性肠梗阻
- D. 急性梗阻性化脓性胆管炎

E. 急性消化性溃疡穿孔

88. 男, 18 岁。右小腿中段伤口反复流脓, 有时排出碎骨块 7 年。近 2 周高热, 伤口流脓周围红肿。X 线片示胫骨上段增粗, 可见死骨块, 周围有新生骨, 目前最佳治疗是

- A. 死骨摘除术
- B. 病灶清除+肌瓣填塞术
- C. 病灶清除+植骨
- D. 抗炎治疗
- E. 穿刺抽脓, 药物注入

89. 男, 20 岁。因交通事故头顶部可见直径 10 cm 血肿, 意识清楚, 恶心、呕吐, 急救处置时不恰当的措施是

- A. 血压、脉搏、呼吸检测
- B. 注意意识状态
- C. 穿刺抽吸头皮下血肿
- D. 给予镇静剂
- E. 给予脱水剂

90. 男, 60 岁。因肝硬化一次排放腹水 3 000 mL 而无尿, 诊断应首先考虑为

- A. 急性肝衰竭
- B. 急性心力衰竭
- C. 肾前性肾衰竭
- D. 肾后性肾衰竭
- E. 肾性肾衰竭



配套名师高清视频

91. 女, 28 岁。发现左颈前包块 1 个月。无多食, 易饥、怕热、消瘦。查体: T 36.5 °C, P 80 次/分, R 18 次/分, BP 120/80 mmHg。甲状腺左叶可触及直径 1 cm 质硬肿物, 表面不光滑, 颈部未触及肿大淋巴结。双肺呼吸音清, 未闻及干湿性啰音, 心律齐, 腹软, 无压痛。最有助于确诊的检查是

- A. 颈部增强 CT
- B. 甲状腺核素静态显影
- C. 颈部彩色多普勒超声
- D. 细针穿刺细胞学检查
- E. 血清甲状腺素水平

92. 女, 16 岁。四肢关节痛 6 个月, 近 2 个

月出现面颊部对称性红斑,有口腔溃疡反复发作,检查 WBC:  $2.3 \times 10^9/L$ ,血沉:46 mm/h,该患者的最可能诊断是

- A. 类风湿关节炎
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 重叠综合征
- D. 白塞病
- E. 风湿性关节炎

93. 男,70 岁。右腹股沟区肿块 3 年,平卧消失。查体:右耻骨结节外上方有一半球形肿块,未进入阴囊,可用手回纳,压住腹股沟韧带中点上方咳嗽时仍可见肿块突出。最可能的诊断是

- A. 股疝
- B. 腹股沟斜疝
- C. 腹股沟直疝
- D. 精索鞘膜积液
- E. 交通性鞘膜积液

94. 男,4 岁。近 3 个月发现右侧腹部有一肿物,增长迅速,行经腹肾切除术,病理为肾母细胞瘤。术后首选的辅助治疗方法是

- A. 化学治疗
- B. 放射治疗
- C. 生物治疗
- D. 基因、治疗
- E. 中医药治疗

95. 男,35 岁。右下肢疼痛 1 年。让其抬高右下肢 80 度,1 分钟后下肢皮肤苍白,再让其下肢垂于床沿,大约 1 分钟后下肢皮肤颜色方恢复正常。该检查结果提示

- A. Buerger 试验阳性
- B. 下肢静脉通畅度(Trendelenburg)试验阳性
- C. 大隐静脉瓣膜和小腿交通支静脉瓣膜功能(Perthes)试验阳性
- D. Pratt 试验阳性
- E. Lasegue 试验阳性

96. 女,40 岁。确诊为急性胰腺炎,内科正规治疗 2 周后体温仍在  $38 \sim 39^\circ\text{C}$ ,左上腹

部压痛明显。血淀粉酶  $256 \text{ U/L}$ ,血 WBC  $16 \times 10^9/L$ ,可能性最大的是

- A. 败血症
- B. 病情迁延未愈
- C. 合并急性胆囊炎
- D. 并发胰腺假性囊肿
- E. 并发胰腺脓肿

97. 女,40 岁,因宫颈癌接受化疗。近 3 天来常发生牙龈出血,血小板计数  $20 \times 10^9/L$ 。遂给予血小板输注,输注后 20 分钟,患者突然寒战、发热、恶心,体温  $39.5^\circ\text{C}$ ,血压正常,尿色正常。该患者很可能发生输血不良反应是

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 溶血性输血反应
- C. 过敏反应
- D. 细菌污染反应
- E. 循环超负荷

98. 男,46 岁,因双眼睑及四肢无力入院。入院诊断:重症肌无力。决定给予血浆置换治疗。在血浆置换过程中,患者出现面部瘙痒、潮红,胸部及四肢出现少量荨麻疹。体检:体温  $37.6^\circ\text{C}$ ,血压  $115/65 \text{ mmHg}$ ,该患者可能出现的输血反应为

- A. 非溶血性发热性输血反应
- B. 细菌污染反应
- C. 过敏反应
- D. 溶血性输血反应
- E. 循环超负荷

99. 男,35 岁。10 天前淋雨后出现发热,按“感冒”治疗效果不佳。1 天前突发寒战、右上腹痛。查体:T  $39^\circ\text{C}$ ,BP  $120/80 \text{ mmHg}$ 。双肺未闻及干湿性啰音,心律齐。肝肋下可触及,压痛明显,右腋前线第 8 肋间有叩痛。为明确诊断,应首选的检查是

- A. 肝功能
- B. 胸部 X 线片
- C. 肝炎病毒标志物检测
- D. 腹部 B 超



E.血甲胎蛋白

100.30岁女性,骑摩托车撞伤右髌部,经X线摄片确诊为右股骨颈头下型骨折,严重移位,闭合复位未成功,故行切开复位内固定术。发生哪种并发症的可能性最大

- A.脂肪栓塞
- B.坠积性肺炎
- C.急性骨萎缩
- D.关节强直
- E.缺血性骨坏死

101.男性,40岁。发热伴慢性腹泻40天,大便3~5次/日,暗红色,略带腥臭味,伴近2周来觉右上腹痛,体检:体温39.5℃,消瘦,肝肋下2cm,右腋前线第7、8肋间有明显压痛。外周血象:血红蛋白100g/L,白细胞总数 $12 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞0.86。胸部X线透视:右膈上升伴活动受限。超声波检查肝右叶外上方有一3cm×4.5cm大的液平段。肝穿刺抽出灰褐色脓液,细菌培养为革兰阴性杆菌。诊断最可能为

- A.细菌性肝脓肿
- B.阿米巴肝脓肿
- C.阿米巴肝脓肿继发细菌感染
- D.肝癌
- E.肝炎并发化脓性胆囊炎

102.患者65岁,晨起说话不流利,只能讲一两个简单的字,但能理解别人言语,也能理解书写的东西,然读出来有困难,病变应在优势半球

- A.颞上回后部
- B.颞中回后部
- C.顶叶角回
- D.额下回后部
- E.颞中及颞下回后部

103.女性,30岁。颈前肿块多年,近1个月来,肿块生长迅速,并出现声音嘶哑,颈前可触及2cm×3cm肿块,质地较硬,表面欠光滑。诊断首先考虑

- A.甲状舌骨囊肿
- B.结节性甲状腺肿单发结节
- C.甲状腺腺瘤囊内出血
- D.甲状腺癌
- E.慢性甲状腺炎

104.女,45岁。1年来久站或长时间行走时觉左下腹部胀痛不适。查体:T 36.5℃,P 80次/分,R 18次/分,BP 120/80mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。腹软,无压痛,立位左腹股沟韧带下方内侧突起半球形肿物,平卧时可缩小,咳嗽时无明显冲击感,压迫内环后肿物仍可复出。该患者最适宜的手术方法是

- A.Shouldice 法疝修补术
- B.McVay 法疝修补术
- C.Bassini 法疝修补术
- D.Halsted 法疝修补术
- E.Ferguson 法疝修补术



配套名师高清视频

105.男,22岁。大量饮酒后突发上腹部胀痛,伴恶心、呕吐2小时。查体:P102次/分,BP 110/60mmHg。双肺呼吸音清,未闻及干湿性啰音,心律齐。上腹部压痛明显,反跳痛(+),肠鸣音减弱。血尿常规及尿淀粉酶检查、立位腹部X线平片均未见明显异常。最可能的诊断

- A.急性肠梗阻
- B.胆囊结石
- C.急性胰腺炎
- D.急性胆囊炎
- E.上消化道穿孔

106.女性,10岁,背痛、低热、盗汗6个月。查体:轻度贫血貌,胸腰部后凸畸形,棘突叩痛(+),拾物试验(+)。首选检查是

- A.血沉
- B.碱性磷酸酶
- C.摄胸腰段脊柱X线片
- D.血常规
- E.肿瘤系列

**B1 型题****答题说明**

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(107~108 题共用备选答案)

- A. 中央前回
- B. 锥体外系统
- C. 小脑
- D. 枕叶
- E. 颞叶

107. 癫痫的复杂部分性发作的病损在

108. 帕金森病损在

(109~110 题共用备选答案)

- A. 微小病变肾病
- B. 新月体性肾小球肾炎
- C. 硬化性肾小球肾炎
- D. 系膜增生性肾小球肾炎
- E. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

109. 急进性肾小球肾炎病理类型

110. 急性肾小球肾炎的病理类型

(111~112 题共用备选答案)

- A. 劳累性心绞痛病程在 1 个月以内
- B. 劳累性心绞痛临床特点 1 个月以上无变化

C. 同等程度劳累所诱发的胸痛发作次数增加、严重程度加重及持续时间延长

D. 劳累性心绞痛病程在 3 个月以内

E. 劳累性心绞痛临床特点 3 个月以上无变化根据 ISFC/WHO 对缺血性心脏病的分类

111. 初发劳累性心绞痛是

112. 恶化型劳累性心绞痛是

(113~114 题共用备选答案)

- A. 血 vWF 测定
- B. PF<sub>3</sub> 有效性测定
- C. 血栓素 B<sub>2</sub> 测定
- D. 血 PC 测定
- E. 血 D-二聚体测定

113. 属于抗凝异常的实验室检查是

114. 属于纤溶异常的实验室检查是

(115~116 题共用备选答案)

A. Killip I 级

B. Killip II 级

C. Killip III 级

D. NYHA II 级

E. NYHA IV 级

115. 急性心肌梗死,肺部有湿啰音,但啰音范围小于 1/2 肺野,判断为

116. 风湿性心脏病,休息时有心悸,呼吸困难或心绞痛,任何活动均可加重上述症状。判断为

(117~118 题共用备选答案)

A. 无正确选项

B. 柯萨奇病毒 A 型

C. 柯萨奇病毒 B 型

D. 单纯疱疹病毒

E. 人类疱疹病毒 6 型

117. 与病毒性心肌炎有关的是

118. 幼儿急诊的病原为

(119~120 题共用备选答案)

A. 呼吸兴奋剂

B. 袪利尿剂

C. 强心剂

D. 镇静剂

E. 血管扩张剂

119. 容易引起 II 型呼吸衰竭加重的药物是

120. 在肺源性心脏病治疗中可引起碱中毒的药物是

(121~122 题共用备选答案)

A. 克林霉素

B. 头孢曲松

- C.青霉素
- D.氧氟沙星
- E.红霉素

121.孕妇感染生殖道沙眼衣原体首选的治疗药物是

122.孕妇感染苍白密螺旋体首选的治疗药物是

(123~124 题共用备选答案)

- A.骨髓
- B.淋巴结
- C.脾
- D.外周免疫器官

### A3/A4 型题

E.胸腺

123.B 细胞发育成熟的场所是

124.免疫应答发生的场所是

(125~126 题共用备选答案)

- A.脱落细胞检查
- B.内镜检查
- C.超声波断层检查
- D.甲胎蛋白定量测定
- E.选择性动脉造影

125.可发现局部黏膜早期食管癌的是

126.判断肝癌的疗效及预后应进行

### 答题说明

以下提供若干个案例,每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息,在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(127~129 题共用题干)

男,39岁。精神分裂病史18年,第3次入院,入院后给予氟哌啶醇治疗,3天后加至30 mg/d,第6天出现肌肉僵硬、震颤、吞咽困难。T 39.8℃,意识不清,大小便失禁,双手颤抖,静止性震颤。

127.该患者出现的情况最可能是

- A.迟发性运动障碍
- B.急性肌张力障碍
- C.恶性综合征
- D.5-羟色胺综合征
- E.药源性帕金森综合征

128.该患者首要的处理方法是

- A.换用非典型抗精神病药治疗
- B.降温、抗感染
- C.盐酸苯海索治疗
- D.立即给予电抽搐治疗
- E.即刻停用氟哌啶醇

129.针对该患者的情况,有效的治疗药物是

- A.α受体阻断剂
- B.多巴胺受体激动剂

- C.广谱抗生素
- D.苯二氮革类药物
- E.抗胆碱能药物

(130~132 题共用题干)

男,11岁。1个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛,逐渐加重,皮肤表面静脉曲张,皮温增高。X线片见左肢骨近端呈溶骨性破坏,伴有骨膜日光放射表现。

130.确诊该病的检查方法是

- A.CT
- B.MRI
- C.组织活检
- D.B超
- E.核素扫描

131.最可能的诊断是

- A.骨囊肿
- B.骨巨细胞瘤
- C.骨髓炎
- D.骨肉瘤
- E.骨结核

132.最适宜的治疗方法是

- A.放疗



配套名师高清视频

- B. 对症治疗
- C. 刮除植骨
- D. 单纯截肢术
- E. 放疗+保肢治疗

(133~134 题共用题干)

男,60 岁。因胃溃疡合并多次大出血,行胃大部切除术。

133. 该病人术后 4 天出现胃出血,最可能的原因是

- A. 术中止血不确切
- B. 吻合口缝线感染
- C. 吻合口部分粘膜坏死脱落
- D. 应激性溃疡
- E. 术后胃内残余血

134. 该病人术后可能出现的营养性并发症不包括

- A. 体重减轻
- B. 低血糖综合征
- C. 缺铁性贫血
- D. 骨质疏松
- E. 隐性骨质软化

135. 如果病人发生残胃癌,时间至少超过术后

- A. 1 年
- B. 2 年
- C. 3 年
- D. 4 年
- E. 5 年

(136~138 题共用题干)

男,28 岁。枕部着地,昏迷 5 分钟后清醒,并自己回到家中,其后出现头痛并逐渐加重伴呕吐,1 小时后不省人事,急送医院。查体:BP 160/90 mmHg,脉率 65 次/分,呼吸 15 次/分。浅昏迷,右枕部头皮挫伤,左侧瞳孔 4 mm,对光反应消失;右侧瞳孔 2.5 mm,对光反射应存在。

136. 最可能的诊断是

- A. 颅脑肿瘤
- B. 颅内血肿
- C. 脑栓塞

D. 蛛网膜下腔出血

E. 脑挫伤

137. 最适当的检查方法是

- A. 头颅超声
- B. 脑电图
- C. 头颅 MRI
- D. 头颅 X 线片
- E. 头颅 CT

138. 引起病人浅昏迷、左侧瞳孔散大最可能原因是

- A. 小脑幕切迹疝
- B. 枕骨大孔疝
- C. 动眼神经麻痹
- D. 右侧视神经损害
- E. 颈髓损伤

(139~142 题共用题干)

女性,48 岁。发作性剑突下及右下腹绞痛 3 天,伴有寒战,半年前有类似发作史。查体:体温 39℃,脉搏 110 次/分,血压 140/85 mmHg,血常规检查:WBC  $12 \times 10^9/L$ ,N 80%,神志清楚,皮肤、巩膜轻度黄染,右肋缘下扪及肿大的胆囊、触痛。

139. 该病人最可能的诊断是

- A. 细菌性肝脓肿
- B. 肝外胆管结石并胆管炎
- C. 急性化脓性胆囊炎
- D. 肝内胆管结石并胆管炎
- E. 急性梗阻性化脓性胆管炎

140. 首选的检查方法是

- A. 腹部 B 超
- B. MRCP
- C. ERCP
- D. PTC
- E. 腹部 CT

141. 该病人皮肤、巩膜黄染加重,体温升高至 40℃,脉搏 130 次/分,血压 90/60 mmHg,神志不清。此时最可能的诊断为

- A. 细菌性肝脓肿破裂
- B. 肝外胆管结石并胆管炎
- C. 急性化脓性胆囊炎穿孔

- D.肝内胆管结石并胆管炎  
E.急性梗阻性化脓性胆管炎  
142.该病人此时最有效的治疗是  
A.胆总管切开减压、T管引流  
B.联合使用大剂量抗生素  
C.补液、恢复血容量  
D.给予糖皮质激素  
E.物理降温,支持治疗  
(143~145题共用题干)

男,56岁。上腹不适、纳差3年。体重减轻、乏力半年。查体:贫血貌,上腹部轻压痛。Hb 88 g/L,MCV 115 fl。胃镜检查示胃体皱襞稀疏,黏膜血管透见。

- 143.应首先考虑的诊断是  
A.胃癌  
B.Menetrier病  
C.慢性萎缩性胃炎  
D.慢性淋巴细胞性胃炎  
E.慢性浅表性胃炎  
144.对诊断最有意义的辅助检查是  
A.血癌胚抗原  
B.血胃蛋白酶原  
C.血抗线粒体抗体 M<sub>2</sub> 亚型  
D.血壁细胞抗体  
E.血促胃液素  
145.该患者发生贫血最可能的机制是  
A.铁利用障碍  
B.慢性消化道失血  
C.蛋白质吸收障碍  
D.维生素 C 缺乏  
E.内因子缺乏  
(146~147题共用题干)

男,32岁。反复腰部胀痛1年余。B超见右肾盂结石,大小1.5 cm×1.0 cm;左肾积水,左输尿管上段结石,大小1.0 cm×0.7 cm。尿常规:RBC 5~10/HP,WBC 16~20/HP。总肾功能正常

146.要了解该患者肾功能,首选的检查方法是

- A.IVU  
B.MRI  
C.KUB  
D.复查B超  
E.CT平扫  
147.首选的治疗方法是  
A.右肾盂结石体外冲击波碎石  
B.左输尿管切开取石  
C.药物排石  
D.右肾盂切开取石  
E.左输尿管结石体外冲击波碎石  
(148~150题共用题干)

女,3岁,身高73 cm。智力低下,鼻梁低平,舌体宽厚,常伸出口外,腹轻胀,便秘,有脐疝。

- 148.最可能的诊断是  
A.先天性巨结肠  
B.先天性甲状腺功能低下  
C.21-三体综合征  
D.骨软骨发育不良  
E.黏多糖病  
149.为明确诊断,首选的检查是  
A.骨龄测定  
B.尿黏多糖测定  
C.染色体核型分析  
D.血 T<sub>3</sub>、T<sub>4</sub>、TSH  
E.B超检查肛管测压  
150.最佳的治疗方案是  
A.补充碘剂  
B.补充生长激素  
C.无需特殊治疗  
D.补充甲状腺激素  
E.补充多种维生素



配套名师高清视频

本单元试卷到此结束

## 参考答案

### 第三单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	B	B	B	A	B	A	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	E	B	C	C	C	C	D	A	B
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	D	C	A	A	B	A	B	E
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	C	C	B	A	B	E	E	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	C	C	E	A	A	E	A	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
E	A	A	D	C	B	D	B	B	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
D	B	E	D	B	C	D	A	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	D	B	A	D	D	C	B	A	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
E	B	A	A	D	A	D	D	C	C
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	C	B	A	E	A	C	D	E
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	D	D	B	C	C	E	B	B	E
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
A	C	D	E	B	E	B	E	D	B

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
E	C	A	D	A	D	C	E	B	C
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
D	E	C	B	E	B	E	A	C	A
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
E	A	C	D	E	A	E	B	D	D

25.【解析】①非特异性感染的结局有4种,即炎症好转、局限化脓、炎症扩展和转为慢性炎症。当人体抵抗力占优势时,感染可局限化(A),组织细胞崩解物和渗液可形成脓性物质,积聚于创面或组织间,或形成脓肿。②当致病菌毒力强大时,感染可迅速扩散。

40.【解析】阵发性室上性心动过速急性发作的治疗方法之一是刺激迷走神经:包括诱发恶心(用压舌板刺激悬雍垂,刺激悬雍垂后,心率突然降至68次/分);Valsalva法(深吸气后屏气,再用力作呼气动作)或Muller法(深呼气后屏气,再用力作吸气动作);颈动脉窦按摩;压迫眼球等。考虑为A。

44.【解析】中心静脉压(CVP)正常值在 $5\sim 10\text{cmH}_2\text{O}$ , $<5\text{cmH}_2\text{O}$ 表示血容量不足, $>15\text{cmH}_2\text{O}$ 提示心功能不全、静脉血管床过度收缩或肺循环阻力增高。 $>20\text{cmH}_2\text{O}$ 提示存在充血性心力衰竭。

54.【解析】以胸小肌为界,将腋区淋巴结分为三组:①I组(腋下组,胸小肌外侧组):包括乳腺外侧组、中央组、肩胛下组、腋静脉淋巴结、胸大小肌间淋巴结;②II组(腋中组,胸小肌后组):胸小肌深面的腋静脉淋巴结;③III组(腋上组,锁骨下组):胸小肌内侧锁骨下静脉淋巴结。

65.【解析】积累性劳损好发部位在第2、3跖骨和腓骨中下 $1/3$ 处,是指长期、反复、轻微的直接或间接力量集中在骨骼的某一点上发生骨折,骨折无移位,但愈合慢。故选B

67.【解析】股骨颈骨折临床表现为伤后髋部疼痛,下肢活动受限,不能站立和行走。下肢短缩、外旋、内收畸形,故本题选D。

68.【解析】(1)内收骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角(pauwels)大于 $50^\circ$ ,为内收骨折。由于骨折面接触较少,容易再移位,故属于不稳定性骨折。pauwels角越大,骨折端所遭受的剪切力越大,骨折越不稳定;(2)外展骨折:远端骨折线与两侧髂嵴连线的夹角小于 $30^\circ$ ,为外展骨折。由于骨折面接触多不容易再移位,故属于稳定性骨折。但若处理不当,如过度牵引,外旋,内收,或过早负重等,也可发生移位,成为不稳定性骨折。

69.【解析】产伤引起的新生儿股骨干骨折可将伤肢用绷带固定于胸腹部,2周后拆除绷带,骨折即可愈合。

70.【解析】尺神经腕部损伤主要表现为骨间肌、蚓状肌、拇收肌麻痹所致的环指、小指爪形手畸形,手指内收、外展障碍、Froment征,手部尺侧半和尺侧1个半手指感觉障碍,特别是小指感觉消失;②尺神经肘部损伤除上述表现外,另有环指、小指末节屈曲功能障碍,一般仅表现为屈曲无力。本例手指不能内收、外展、夹纸试验阳性,应诊断为尺神经损伤。

71.【解析】肩周炎多为慢性发病,肩关节钝痛或刀割样痛,活动受限或关节僵硬,夜间

及运动加重,可牵扯到前臂和手,除累及部位可有压痛外,亦可有广泛压痛。关节活动各方向受限,但以外展和外旋受限最显著。晚期关节完全僵硬。故选 D。

75.【解析】早期骨髓炎患儿 X 线检查一般正常。CT 有助于评价骨膜下脓肿、软组织脓肿以及骨破坏的定位。核素骨扫描虽然敏感,但特异性不高。血培养有助于诊断及指导合理选择抗生素。局部分层穿刺对早期诊断有重要价值。涂片检查有脓细胞或细菌则可明确诊断,并同时作细菌培养和药敏试验。故选 D。

77.【解析】骨关节炎多出现在负重关节如膝、髋等,故 A 错;骨关节炎症状十分严重、药物治疗无效的,且影响病人的日常生活,就应该考虑手术干预,如果药物治疗有效,则不必行手术,故 B 错;晚期可出现关节畸形,故本题选 C;软组织松解不能起到改善膝内翻的作用,且有一定创伤,故 D 错;主要病变是关节软骨的退行性变,故 E 错。





110-4

试卷标码:1602

将此标识码填涂在答题卡上指定位置

# 2019 年临床执业医师资格考试 模拟试卷

(医学综合笔试部分)

报考类别：临床执业医师

第四单元

考生姓名：\_\_\_\_\_

准考证号：\_\_\_\_\_

考场号：\_\_\_\_\_

## 答题须知

1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。

2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。

3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。

4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用2B铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。

5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。

6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。

7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。

8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。

9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。

10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

## 第四单元

### A1 型题

#### 答题说明

每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 治疗骨肉瘤应首选
  - 肿瘤切除术+化学治疗
  - 局部整块切除
  - 化学治疗
  - 放射治疗
  - 根治性切除+术前术后化疗
- 脓尿患者,一般抗炎治疗无效,普通培养无细菌生长,首先考虑
  - 肾盂肾炎
  - 膀胱肿瘤
  - 间质性膀胱炎
  - 泌尿系结核
  - 泌尿系结石
- 损伤出现明显血尿的是
  - 肾部分裂伤,肾盂肾盏黏膜破裂
  - 肾动脉血栓形成
  - 肾盂广泛裂伤
  - 输尿管断裂或被血块阻塞
  - 肾蒂血管断裂
- 急性血源性骨髓炎好发年龄应该是
  - 少年
  - 婴幼儿
  - 青年
  - 中壮年
  - 老年
- 关于精索静脉曲张的治疗,下列哪项是错误的
  - 无症状或症状轻者,可穿紧身内裤或用阴囊托带
  - 手术方式为高位结扎精索内静脉
  - 症状较重,或精液异常排除其他疾病时可以考虑手术
  - 腹腔镜手术可以同时结扎双侧曲张静脉
  - 对儿童Ⅲ度曲张患者可以观察
- hCG 妊娠期间分泌量达高峰的时间是
  - 妊娠 4~6 周
  - 妊娠 12~14 周
  - 妊娠 8~10 周
  - 妊娠 16~18 周
  - 妊娠 20~22 周
- 常伴有 AFP 升高的卵巢肿瘤是
  - 卵黄囊瘤
  - 颗粒细胞瘤
  - 成熟性畸胎瘤
  - 无性细胞瘤
  - 上皮性肿瘤
- 后尿道损伤最常见的后期并发症为
  - 尿道直肠瘘
  - 直肠损伤
  - 尿外渗
  - 阳痿
  - 尿道狭窄
- 腹股沟部隐睾最常见的并发症为
  - 腹股沟疝
  - 恶变



配套名师高清视频

- C.疼痛  
D.精索静脉曲张  
E.睾丸鞘膜积液
- 10.前列腺增生最重要的症状是  
A.排尿困难  
B.尿频  
C.尿失禁  
D.尿潴留  
E.尿流中断
- 11.睾丸肿瘤主要临床表现  
A.腹股沟淋巴结肿大  
B.睾丸疼痛  
C.血尿  
D.发热  
E.睾丸肿大,有沉重感
- 12.下列关于胎方位的描述正确的是  
A.指最先进入母体骨盆入口的胎儿部分  
B.指胎儿先露部指示点与母体骨盆的关系  
C.指母体纵轴与胎儿纵轴的关系  
D.指胎儿头部与母体骨盆的关系  
E.指胎儿在腹腔中的各种姿势
- 13.有先兆偏头痛最常见的先兆是  
A.听觉先兆  
B.视觉先兆  
C.感觉先兆  
D.言语先兆  
E.运动先兆
- 14.下列提示胎盘功能正常的情况是  
A.血清胎盘生乳素突然降低 50%  
B.NST 试验无反应型  
C.胎动<10 次/12 小时  
D.OCT 试验阳性  
E.尿雌激素/肌酐比值>15
- 15.孕妇尿中检出的激素,与胎儿胎盘功能关系最密切的是  
A.孕二醇  
B.皮质醇  
C.雌三醇  
D.雌二醇  
E.醛固酮
- 16.下列提示颅后窝骨折的临床表现是  
A.视神经损伤  
B.Battle 征  
C.嗅神经损伤  
D.眼镜征  
E.脑脊液鼻漏
- 17.防止子宫下垂最主要的韧带是  
A.子宫圆韧带  
B.子宫阔韧带  
C.腹股沟韧带  
D.子宫骶韧带  
E.子宫主韧带
- 18.晚期胚泡透明带消失后,相当于受精后第几日开始着床  
A.2~3 天  
B.4~5 天  
C.8~9 天  
D.6~7 天  
E.10~11 天
- 19.吉兰-巴雷综合症的脑脊液蛋白-细胞分离是指  
A.蛋白增高,细胞数正常  
B.蛋白增高,细胞数降低  
C.蛋白正常,细胞数正常  
D.蛋白降低,细胞数正常  
E.蛋白正常,细胞数增高
- 20.确诊前列腺癌最有帮助的检查是  
A.直肠指诊  
B.经直肠超声  
C.血 PSA  
D.CT  
E.前列腺穿刺活检
- 21.不能通过输血传播的病原是  
A.HIV

B. EB 病毒

C. 巨细胞病毒

D. 肝炎病毒

E. 单纯疱疹病毒

22. 导致输卵管妊娠的主要病因是

A. 输卵管妊娠史

B. 辅助生殖技术

C. 输卵管炎症

D. 输卵管发育不良或功能异常

E. 剖宫产史

23. 早产儿出生后立即出现进行性呼吸困难, 最可能发生的疾病是

A. 先天性心脏病

B. 胎粪吸入综合征

C. 吸入性肺炎

D. 湿肺

E. 新生儿呼吸窘迫综合征

24. 一侧肾癌主要治疗方法是

A. 肾肿瘤切除术

B. 单纯肾切除

C. 肾输尿管全切除

D. 根治性肾切除术

E. 化疗

25. 乳腺癌中, 一般分化低, 预后较差的病理类型是

A. 黏液腺癌

B. 髓样癌

C. 小管癌

D. 乳头状癌

E. 浸润性小叶癌

26. 无排卵性功能失调性子宫出血患者诊断性刮宫的病理结果不可能出现的是

A. 增生性子宫内膜

B. 单纯性增生

C. 复杂性增生

D. 萎缩型子宫内膜

E. 分泌期和增生期内膜并存

27. 用羊水指数法表示, 大于多少考虑羊

水过多

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 25 cm

D. 14 cm

E. 22 cm

28. 关于产力, 胎头在完成内旋转时, 除了子宫收缩力之外, 还有下述哪组肌肉参与

A. 膈肌

B. 腹肌

C. 胎儿躯干肌肉

D. 四肢骨骼肌

E. 肛提肌

29. 疱疹性咽峡炎的最常见的病原体是

A. 流感病毒

B. 副流感病毒

C. 单纯疱疹病毒

D. 柯萨奇病毒

E. 腺病毒

30. 关于子宫内膜癌的描述, 正确的是

A. 透明细胞癌是最常见的病理类型

B. 非激素依赖型比激素依赖型预后差

C. 早期患者首选治疗方法是放射治疗

D. 肿瘤侵及直肠黏膜时, 分期为 IVB

E. 血行转移是最常见的转移途径

31. 早期先兆流产最先出现的症状是

A. 停经

B. 子宫停止增大

C. 少量阴道流血

D. 阵发性腹痛

E. 妊娠试验由阳性转为阴性

32. 下列导致胎儿生长受限的因素最常见的是

A. 妊娠期糖尿病

B. 多次刮宫导致宫腔粘连

C. 妊娠期高血压疾病

D. 合并卵巢小囊肿

E. 羊水过多



配套名师高清视频

33. 心脏病孕妇妊娠期间, 最危险的时期是

- A. 妊娠 34~35 周
- B. 妊娠 28~31 周
- C. 妊娠 24~27 周
- D. 妊娠 32~34 周
- E. 产褥期 7 天后

34. 既往月经规律, 妊娠 42<sup>+5</sup> 周, 下列情况最不可能出现的是

- A. 羊水增多
- B. 羊水粪染
- C. 胎儿生长受限
- D. 胎盘功能正常
- E. 胎儿过熟综合征

35. 引起胎盘早剥的主要病因是

- A. 叶酸缺乏
- B. 胎动活跃
- C. 全身水肿
- D. 羊水过少
- E. 妊娠高血压疾病

36. 妊娠早期心脏病患者, 决定是否继续妊娠的主要依据是

- A. 患者年龄
- B. 孕妇的体重
- C. 胎儿大小
- D. 病变发生部位
- E. 心脏病种类

37. 健康育龄妇女出现恶心、食欲减退等消化道症状, 问诊时不应忽视的是

- A. 月经史
- B. 传染病史
- C. 肝炎病史
- D. 不结饮食史
- E. 胃炎病史

38. 确诊前置胎盘首选

- A. 产后检查胎膜破口距胎盘边缘 5 cm
- B. 腹部正位片, 子宫体部无胎盘影
- C. 窥器检查宫颈未见病变

D. 阴道穹隆扪诊可发现宫颈口周围有软组织

E. 妊娠晚期 B 型超声检查可见胎盘覆盖宫颈内口

39. 初产妇, 急产一体重 4 000 g 新生儿, 胎儿娩出后较多量持续性鲜红色阴道出血, 出血原因最可能是

- A. 宫缩乏力
- B. 子宫破裂
- C. 胎盘剥离不全
- D. 凝血功能障碍
- E. 软产道损伤

40. 对雌激素生理作用的叙述, 正确的是

- A. 抑制子宫收缩
- B. 促进水钠潴留, 维持和促进骨基质

代谢

C. 抑制输卵管平滑肌节律性收缩的

振幅

D. 加快阴道上皮细胞脱落

E. 使宫颈口闭合, 黏液分泌减少、变

黏稠

41. 中央性前置胎盘大出血的治疗方法正确的是

- A. 人工破膜
- B. 催产素引产阴道分娩
- C. 胎头吸引
- D. 为臀位行牵引术
- E. 剖宫产

42. 口服避孕药后月经第 9 天不规则出血, 正确的处理方法是

- A. 加倍服药
- B. 需立即停药
- C. 加服少量孕激素
- D. 加服少量雄性激素
- E. 加服少量雌激素

43. 病理性缩复环最常见于

- A. 男性骨盆
- B. 高张性宫缩乏力

- C.软产道损伤  
D.枕后位  
E.先兆子宫破裂
- 44.关于胎膜早破患者阴道流液的 pH 说法正确的是
- A.pH 4.5  
B.pH 4.5~5.5  
C.pH 5.5~6.0  
D.pH  $\geq$ 6.5  
E.pH 6.0~6.5
- 45.部分性葡萄胎核型常是
- A.三倍体  
B.二倍体  
C.单倍体  
D.四倍体  
E.五倍体
- 46.下列疾病中,最可能于凌晨反复出现咳嗽和气短症状的是
- A.慢性肺脓肿  
B.慢性支气管炎  
C.支气管哮喘  
D.肺结核  
E.支气管扩张
- 47.维持阴道正常酸性环境的主要菌群是
- A.葡萄球菌  
B.肠球菌  
C.大肠埃希菌  
D.棒状杆菌  
E.乳酸杆菌
- 48.羊水栓塞 DIC 的早期,首选的处理是
- A.输新鲜血  
B.止血药  
C.肝素治疗  
D.输纤维蛋白原  
E.肌注双嘧达莫
- 49.治疗具有严重细胞免疫缺陷患者的唯一有效措施是
- A.保护性隔离  
B.抗生素预防性治疗  
C.输新鲜血  
D.免疫球蛋白替代疗法  
E.免疫重建
- 50.子宫肌瘤红色变性常发生在
- A.肌瘤扭转时  
B.性功能活跃时  
C.分娩期  
D.妊娠期  
E.月经期经量多时
- 51.绒癌最常见的转移部位依次是
- A.肺、脑、肝、阴道  
B.阴道、肺、肝、脑  
C.肝、心、脑、肺  
D.肺、阴道、肝、脑  
E.肝、肺、阴道、脑
- 52.与子宫肌瘤的临床表现无明显相关的是
- A.不孕  
B.反复早期流产  
C.排便困难  
D.贫血  
E.尿频尿急尿痛
- 53.关于哮喘的治疗下列错误的是
- A.避免接触过敏原  
B.清除感染灶  
C.去除各种诱发因素  
D.不需抗炎治疗  
E.解除支气管痉挛
- 54.新生儿窒息复苏评估的三大指标是
- A.呼吸,心率,哭声  
B.心率,呼吸,皮肤颜色  
C.呼吸,皮肤颜色,哭声  
D.心率,呼吸,肌张力  
E.心率,皮肤颜色,肌张力
- 55.支气管淋巴结结核出现声嘶是由于肿大的淋巴结压迫



配套名师  
高清视频

- A.迷走神经  
B.右侧颈静脉  
C.左侧颈静脉  
D.喉返神经  
E.肺动脉
- 56.小儿生理性贫血发生的时期是在出生后
- A.7~8 个月  
B.2~3 个月  
C.6~7 个月  
D.1 个月内  
E.4~5 个月
- 57.诊断脑出血最迅速、最可靠的检查是
- A.脑电图  
B.脑血管造影  
C.脑脊液检测  
D.头颅 CT  
E.头颅 MRI
- 58.临床常用药物流产方法是
- A.米非司酮  
B.卡孕栓  
C.米非司酮+米索前列醇  
D.环磷酰胺  
E.卡孕栓+米索前列醇
- 59.法洛四联症较少合并以下哪种疾病
- A.脑缺氧发作  
B.感染性心内膜炎  
C.脑脓肿  
D.脑栓塞  
E.肺炎
- 60.不引起肠黏膜损伤的腹泻致病菌是
- A.空肠弯曲菌  
B.耶尔森菌  
C.金黄色葡萄球菌  
D.侵袭性大肠杆菌  
E.产毒性大肠杆菌
- 61.肾病综合征诊断标准中,24 小时尿蛋白总量临界值应
- A.>4.5 g/d  
B.>4 g/d  
C.>3.5 g/d  
D.>3.0 g/d  
E.>2.5 g/d
- 62.反映缺铁性红细胞生成的最佳指标是
- A.血清铁蛋白  
B.血清铁  
C.转铁蛋白饱和度  
D.总铁结合力  
E.红细胞游离原卟啉
- 63.下列关于小儿免疫系统的说法,错误的是
- A.IgM 不能通过胎盘  
B.IgG 不能通过胎盘  
C.脐血 IgM 水平过高,提示可能有宫内感染  
D.新生儿时期各种 T 细胞亚群功能均显不足  
E.新生儿 B 淋巴细胞发育已完善,但不成熟
- 64.营养性缺铁性贫血选用的治疗,最恰当的是
- A.硫酸亚铁加叶酸  
B.维生素 C 加叶酸  
C.维生素 B<sub>12</sub>加高蛋白饮食  
D.硫酸亚铁加维生素 C 加高蛋白饮食  
E.以上都不是
- 65.导致儿童风湿热的最常见病原体是
- A.肺炎克雷伯杆菌  
B.流感嗜血杆菌  
C.大肠埃希菌  
D.A 组乙型溶血性链球菌  
E.肺炎链球菌
- 66.新生儿 ABO 溶血病发生在
- A.母血型“A”,子血型“O”  
B.母血型“AB”,子血型“O”



- C.母血型“O”,子血型“AB”  
 D.母血型“O”,子血型“A”或“B”  
 E.母血型“B”,子血型“O”
- 67.水痘最常见的并发症为  
 A.败血症  
 B.心肌炎  
 C.皮肤继发细菌感染  
 D.肺炎  
 E.脑炎
- 68.新生儿败血症的发生,从感染途径分析,以哪一项最常见  
 A.羊水穿刺感染  
 B.产前感染  
 C.产时感染  
 D.产后感染  
 E.宫内输血消毒不严
- 69.男婴足月顺产,出生体重 3 200 g,生后 48 小时血清总胆红素 297.5  $\mu\text{mol/L}$ 。在检查黄疸原因时,首选治疗方法是  
 A.输血浆  
 B.换血  
 C.口服苯巴比妥  
 D.清蛋白输注  
 E.光照疗法
- 70.左向右分流型的先天性心脏病多见的并发症是  
 A.心律失常  
 B.脑栓塞  
 C.肺炎  
 D.喉返神经麻痹  
 E.亚急性细菌性心内膜炎
- 71.我国使用的围生期概念是  
 A.妊娠 20 周~生后 1 周  
 B.妊娠 26 周~生后 4 周  
 C.妊娠 28 周~生后 4 周  
 D.妊娠 28 周~生后 1 周  
 E.妊娠 24 周~生后 1 周
- 72.先心病中最常见的类型是  
 A.动脉导管未闭  
 B.房间隔缺损  
 C.室间隔缺损  
 D.法洛四联症  
 E.肺动脉狭窄
- 73.我国法定传染病中甲类传染病有  
 A.天花和鼠疫  
 B.狂犬病和天花  
 C.霍乱和副霍乱  
 D.艾滋病与霍乱  
 E.鼠疫和霍乱
- 74.母体免疫球蛋白能通过胎盘转移给胎儿的是  
 A.IgM  
 B.IgA  
 C.IgE  
 D.IgD  
 E.IgG



配套名师高清视频

### 答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

- 75.老年女性,不慎摔倒,左髌部着地,当即左髌剧痛,不能站立,急诊来院,检查见左下肢缩短,外旋畸形。其最可能的诊断是  
 A.左髌关节前脱位  
 B.左髌关节后脱位  
 C.左髌关节中心脱位  
 D.左股骨颈骨折  
 E.左股骨干骨折

76.男,29岁。发作性左腰区疼痛1周,每次疼痛数小时,腹部X线平片可见左侧腹部有一高密度阴影,在肾下极下2cm,直径为1.1cm,诊断考虑是左输尿管结石,目前首选治疗方案为

- A.大量饮水
- B.输尿管镜取石
- C.解痉、抗感染
- D.体外冲击波碎石术
- E.以上都不是

77.男,36岁。10岁时因右侧隐睾行睾丸固定术,近1个月以来右侧阴囊肿大伴疼痛,查体:右侧阴囊下垂明显;皮温不高,睾丸肿大,质硬,有明显沉重感,透光试验阴性。应初诊为

- A.右睾丸炎
- B.右附睾炎
- C.右睾丸肿瘤
- D.右睾丸鞘膜积液
- E.右睾丸结核

78.男,31岁。1.5小时前被自行车撞到腰部。血压100/65mmHg,尿常规:红细胞30~40/高倍视野,最可能的诊断是

- A.肾蒂裂伤
- B.肾盂裂伤
- C.肾挫伤
- D.肾皮质深部裂伤
- E.肾碎裂伤

79.男,31岁。头痛进行性加重1个月。入院前3天出现喷射状呕吐3次,抽搐1次。查体:神志清楚,双侧视神经乳头水肿,颈软。最可能的诊断是

- A.蛛网膜下腔出血
- B.脑血管畸形
- C.脑软化
- D.颅内压增高
- E.陈旧性脑梗死

80.女,22岁。半年前诊断为精神分裂症,平时服用利培酮治疗。病情稳定,半月前因与男朋友分手,情绪低落,话少。近3天加重,整日躺在床上,不语不动,拒绝进食,常双眼含泪,家人反复询问下有时能用点头、摇头表示。患者目前首要的处理方法是

- A.暗示疗法
- B.认知疗法
- C.加用抗抑郁药
- D.电抽搐治疗
- E.抗精神病药加量

81.风湿性心脏病,心功能Ⅲ级的妇女,患异位妊娠,左侧输卵管妊娠破裂,手术应行

- A.右附件切除
- B.右附件切除+左输卵管结扎
- C.左输卵管切除+右输卵管结扎
- D.子宫次全切除术+右附件切除
- E.右输卵管切除

82.女,18岁,未婚。月经规律,无停经史,突发下腹部疼痛伴恶心、呕吐8小时。查体:P78次/分,BP100/70mmHg。直肠腹部触诊:子宫前位,正常大,右侧附件区触及一个6cm×5cm×5cm囊实性包块,边界清楚,触痛明显。最可能的诊断是

- A.浆膜下子宫肌瘤
- B.急性阑尾炎
- C.输卵管妊娠破裂
- D.卵巢肿瘤蒂扭转
- E.卵巢黄体破裂

83.初产妇,25岁。停经49天,阵发性腹痛伴阴道流血3天,妇科检查:宫颈口开大1cm,有羊膜囊堵塞子宫口,子宫孕49天大小。最可能的诊断是

- A.先兆流产
- B.过期流产

- C.完全流产
- D.难免流产
- E.习惯性流产

84.女性,30岁,已婚。放置宫内节育器2年,停经48天,少量阴道出血3天,突然右下腹剧烈撕裂样疼痛,血压80/40 mmHg,右下腹压痛,反跳痛明显,但肌紧张不明显。妇科检查:后穹隆饱满,宫颈举痛(+),宫口闭,子宫正常大小,呈漂浮感,双附件触诊不满意,本病例最可能的诊断是

- A.先兆流产
- B.黄体破裂
- C.卵巢囊肿蒂扭转
- D.输卵管妊娠破裂
- E.急性阑尾炎

85.肾病综合征患儿开始应用泼尼松治疗,口服泼尼松后,4周尿蛋白已经转阴,并且已经开始隔日顿服,突发上呼吸道感染,尿蛋白又(+++),经常规抗炎治疗后,尿蛋白仍(+++),下一步治疗应采用

- A.治疗不变,泼尼松仍然隔日顿服
- B.应用环磷酰胺
- C.泼尼松重新开始起始治疗量每日三次口服
- D.应用激素+环磷酰胺
- E.以上均不对

86.3个月婴儿,腹泻3天,大便每天10多,呈蛋花汤样,伴呕吐,尿少,精神萎靡,拒奶,面色苍白,前囟、眼窝凹陷,口唇樱红,皮肤弹性差。除诊断婴儿腹泻、中度脱水外,还应考虑

- A.低血容量休克
- B.代谢性碱中毒
- C.低镁血症
- D.低钙血症
- E.代谢性酸中毒

87.女,40岁。瘢痕子宫,妊娠39周,规

律宫缩8小时。宫口6 cm,先露S=+1,突然腹痛加剧。查体:T 37.5℃,P 100次/分,BP 90/60 mmHg,宫口4 cm,先露S=-2,胎心60次/分,2分钟后胎心消失。最可能的诊断是

- A.腹腔感染
- B.子宫破裂
- C.胎盘早剥
- D.羊水栓塞
- E.先兆子宫破裂



配套名师高清视频

88.女,56岁,G<sub>4</sub>P<sub>2</sub>。绝经5年,阴道脱出肿物4年,脱出肿物增大3个月。不能自行回缩,伴排尿困难。妇科检查见宫颈及部分宫体已脱出于阴道口外。妇科超声及泌尿系统超声均未提示异常。适宜的处理为

- A.阴道全封闭术
- B.阴道半封闭术
- C.盆底修复及子宫切除术
- D.经腹圆韧带缩短术
- E. Manchester 手术

89.8岁男孩,常有活动后心悸、气促,心脏听诊于胸骨左缘第2~3肋间可闻及Ⅱ~Ⅲ级喷射性收缩期杂音,肺动脉瓣区第二心音亢进和固定分裂。该患儿最可能的诊断是

- A.肺动脉狭窄
- B.室间隔缺损
- C.动脉导管未闭
- D.法洛四联症
- E.房间隔缺损

90.女婴,一个月。生后间断呕吐,呕吐物为奶液,体重增长不满意。查体:可见胃蠕动波,右上腹触及包块。最可能的诊断是

- A.先天性巨结肠
- B.先天性肥厚性幽门狭窄
- C.胃扭转
- D.胃食管反流
- E.幽门痉挛

91. 7 个月小儿出现低钙性手足抽搐, 应怎样处理

- A. 补钙—止抽
- B. 止抽—补钙
- C. 维生素 D<sub>2</sub>—止抽—补钙
- D. 止抽—补钙—维生素 D<sub>2</sub>
- E. 补钙—维生素 D<sub>2</sub>—止抽

92. 男孩, 7 岁。水肿 4 天, 伴血尿、尿少 2 天。查体: P 112 次/分, R 33 次/分, BP 120/85 mmHg, 颜面、双下肢明显水肿, 烦躁不安、气促, 双肺底可闻及湿啰音, 肝肋下 1.5 cm。尿常规: 蛋白 (+)。尿沉渣镜检: RBC25/HP。目前应首选的药物是

- A. 毛花苷丙
- B. 呋塞米
- C. 硝普钠
- D. 地西泮
- E. 青霉素

93. 男性, 30 岁。车祸后半小时, 血压 90/50 mmHg, 心率 121 次/分, 下腹膨隆, 不能自排小便, 尿道口有少量流血, X 线提示骨盆骨折, 尿道造影提示后尿道断裂, 最佳处理是

- A. 立即导尿
- B. 耻骨上穿刺排尿
- C. 后尿道修补术
- D. 抗休克治疗后耻骨上膀胱造瘘术
- E. 尿道会师术

94. 男婴, 30 天。过期产, 出生体重 4 500 g, 母亲无糖尿病病史。生后人工喂养, 常鼻塞, 时有呼吸困难, 吃奶差。哭声弱、反应差、便秘, 体检: T 35 °C, P 90 次/分, 皮肤轻度黄染。血象: Hb 90 g/L, RBC  $3.6 \times 10^{12}/L$ , WBC  $11 \times 10^9/L$ 。对该患儿最主要的治疗是

- A. 保肝、利胆、退黄
- B. 应用抗生素抗感染

- C. 服用甲状腺制剂
- D. 保暖给氧, 支持呼吸
- E. 不需用药, 继续观察

95. 女, 24 岁, 经产妇。阴道分娩后 72 小时, 自觉乳房胀痛, 发热, T 37.5 °C, 下腹部阵发性疼痛伴少量阴道流血。正确的处理是

- A. 口服镇痛剂
- B. 排空乳房
- C. 应用抗生素
- D. 局部理疗
- E. 静脉滴注缩宫素

96. 男孩, 6 岁。咳嗽伴喘息 1 天, 无发热。既往有反复喘息发作 4~5 次。其外祖父患有支气管哮喘。查体: 呼吸急促, 可见轻度三凹征, 呼气相延长, 双肺满布哮鸣音。目前应首选的治疗是

- A. 吸入沙丁胺醇
- B. 静脉滴注青霉素
- C. 口服白三烯调节剂
- D. 静脉注射地塞米松
- E. 口服西替利嗪

97. 孕 3 产 1。因停经 7 个月, 阴道流血 4 天, 增多 1 小时, 急诊入院, 查血压 90/60 mmHg, P 115 次/分, 宫底剑突下三横指, 臀先露 LSA, 胎心 136 次/分, 有不规律宫缩。为进一步确诊首选的检查是

- A. 颈管内指诊
- B. 肛诊
- C. 阴道检查
- D. B 超检查
- E. 腹部平片

98. 女, 28 岁。初产妇, 妊娠 39 周, 规律宫缩 10 小时, 查宫口扩张 6 cm, LOA, 先露 S = +1, 胎心 140 次/分, 胎儿监护 NST 有反应型, 需要进一步的处理是

- A. 给予宫颈封闭

- B. 催产素加强宫缩
- C. 超声评估胎儿大小
- D. 严密观察产程
- E. 肌注哌替啶

99. 4岁患儿, 发热、干咳10天, 体温39℃, 双眼疱疹性结膜炎, 颈部可触及成串肿大的淋巴结, 右肺呼吸音稍低, 少许干啰音, PPD硬结直径18mm。诊断考虑

- A. 急性支气管炎
- B. 支气管肺炎
- C. 右侧胸膜炎
- D. 原发型结核
- E. 支气管炎合并结膜炎

100. 女, 35岁。妊娠35<sup>+2</sup>周, 2周前血压升高至160/100mmHg, 未治疗。现突然持续腹痛、逐渐加重, 感头晕、恶心, 阴道有少量流血。查体: T 36.8℃, P 120次/分, BP 100/60mmHg, 呼吸急促。面色苍白, 腹部隆起, 板状腹, 胎方位不清, 未闻及胎心。最可能的诊断是

- A. 胎盘早剥
- B. 先兆子宫破裂

### B1型题

- C. 早产临产
- D. 临产伴急性阑尾炎
- E. 妊娠合并急性胰腺炎

101. 胎龄为36周的新生儿, 生后7小时皮肤出现黄染, 生后3天出现抽搐, 体检: 一般状态差, 前囟平, 皮肤及巩膜重度黄染, 心肺正常, 腹软, 四肢张力增强, 血胆红素342μmol/L, 血钙2.0mmol/L, 此患儿最可能患

- A. 低钙
- B. 化脑
- C. 核黄疸
- D. 低血糖
- E. 癫痫



配套名师高清视频

102. 3岁小儿患金葡菌肺炎, 突然呼吸困难, 发绀烦躁, 体温40℃, 左侧呼吸运动及呼吸音减弱, 叩之不浊, 心率162次/分, 肝肋下2.5cm, 本例最大可能并发

- A. 肺气肿
- B. 心包炎
- C. 心肌炎
- D. 呼吸衰竭
- E. 张力性气胸

### 答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(103~104题共用备选答案)

- A. Mills征阳性
- B. Dugas征阳性
- C. Thomas征阳性
- D. Lasegue试验阳性
- E. Finkelstein试验阳性

103. 肩关节脱位主要体征为

104. 肱骨外上髁炎主要体征为

(105~107题共用备选答案)

- A. 嗜睡、腹胀、便秘
- B. 高腭弓、通贯手
- C. 智力正常
- D. 尿有鼠尿味
- E. 四肢细长

105. 21-三体综合征

106. 先天性甲状腺功能减低症

107. 苯丙酮尿症

(108~110题共用备选答案)

- A. 萎缩性阴道炎  
 B. 阿米巴阴道炎  
 C. 滴虫性阴道炎  
 D. 外阴阴道假丝酵母菌病  
 E. 细菌性阴道病
108. 育龄妇女阴道 pH 升高时容易发生  
 109. 阴道分泌物镜检可见线索细胞, pH >4.5, 加入 10% 氢氧化钾溶液后可产生烂鱼肉样腥臭气体  
 110. 糖尿病患者及长期使用广谱抗生素患者易发生  
 (111~113 题共用备选答案)  
 A. 胎头在脐左上, 胎心在脐上  
 B. 胎头位于母体左侧, 胎心位于母体腹前壁靠近脐下  
 C. 胎头在脐右上, 胎心靠脐上  
 D. 胎头位于宫底部, 胎心位于脐右下方  
 E. 胎头位于耻骨上方, 胎心位于脐左下方
111. LOA 是指  
 112. LSA 是指  
 113. RSA 是指  
 (114~115 题共用备选答案)  
 A. 月经周期正常, 经期延长  
 B. 月经周期规律, 但周期短  
 C. 月经周期无规律  
 D. 突然大量出血, 并发痛经

**A3/A4 型题**

- E. 周期、经期、经量都不正常  
 114. 黄体萎缩不全  
 115. 黄体发育不全  
 (116~118 题共用备选答案)  
 A. 细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白升高、糖降低、氯化物降低  
 B. 细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白降低、糖正常、氯化物正常  
 C. 细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白稍高、糖正常、氯化物正常  
 D. 细胞数  $400 \times 10^6/L$ 、蛋白正常、糖降低、氯化物正常  
 E. 细胞数  $1200 \times 10^6/L$ 、蛋白增高、糖降低、氯化物降低
116. 化脓性脑膜炎  
 117. 结核性脑膜炎  
 118. 病毒性脑膜炎  
 (119~120 题共用备选答案)  
 A. 润滑和冲洗阴道, 减少感染机会  
 B. 防止胎体畸形  
 C. 不利于胎儿体液平衡  
 D. 保持羊膜腔内恒温  
 E. 胎儿不受挤压
119. 关于羊水的功能错误的是  
 120. 破膜后羊水起的作用是

**答题说明**

以下提供若干个案例, 每个案例下设若干考题。请根据案例所提供的信息, 在每一道考试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- (121~124 题共用题干)  
 6 个月健康小儿, 体重为 6 kg, 用牛奶人工喂养。  
 121. 如采用 8% 的牛奶, 每天应给多少

- 毫升  
 A. 500 mL  
 B. 550 mL  
 C. 660 mL

D.600 mL

E.700 mL

122.除牛奶外,还应给予多少毫升水

A.200 mL

B.240 mL

C.280 mL

D.350 mL

E.300 mL

123.每天需要的总能量应为

A.450 kcal

B.500 kcal

C.550 kcal

D.660 kcal

E.600 kcal

124.现在该小儿可以添加的辅食,除外

A.菠菜泥

B.白菜泥

C.米粉

D.苹果泥

E.肉末

(125~126 题共用题干)

患儿,7岁,眼睑及双下肢明显水肿,少尿1周。查体:精神状态尚可,眼睑水肿,双下肢呈凹陷性水肿,血压90/60 mmHg,心肺正常。尿常规:蛋白(+++),红细胞0~3/HP。血浆总蛋白45 g/L,白蛋白22 g/L,抗“O”正常, $C_3$ 补体正常,胆固醇11.2 mmol/L;肌酐46  $\mu$ mol/L。尿素氮1.56 mmol/L。胸片示:少许胸腔积液。

125.该患儿最可能的诊断为

A.急性肾炎

B.急进性肾病

C.肾炎性肾病

D.单纯性肾病

E.病毒性肾病

126.该患儿病理性类型最可能为

A.膜性肾病

B.系膜增生性

C.局灶性阶段性肾小球硬化

D.微小病变型

E.膜性增生性肾炎

(127~130 题共用题干)

3岁男孩,生后即发现有青紫现象,久站喜蹲踞,心脏听诊可在胸骨左缘第2肋间闻及Ⅱ级喷射性杂音,肺动脉第二心音减低。

127.该患儿最可能的诊断是

A.房间隔缺损

B.室间隔缺损

C.动脉导管未闭

D.肺动脉狭窄

E.法洛四联症

128.一般首选哪项检查以进一步明确诊断

A.心电图

B.胸部X线检查

C.磁共振成像

D.心血管造影

E.多普勒彩色血流显像

129.如行胸部X线检查,最可能的改变是

A.右房、右室大,肺动脉段凸出,肺野充血

B.左房、左室大,肺动脉段凹陷,肺野充血

C.左室、右室大,肺动脉段凸出,肺野充血

D.右室大,肺动脉段凹陷,肺野清晰

E.右室大,肺动脉段凸出,肺野清晰

130.若患儿突发偏瘫,检查血常规示白细胞 $12.6 \times 10^9/L$ ,红细胞 $5.7 \times 10^{12}/L$ ,则可能并发了

A.亚急性细菌性心内膜炎

B.脑积水

C.病毒性脑炎

- D. 脑脓肿、脑栓塞  
 E. 艾森曼格综合征

(131~133 题共用题干)

经产妇, 45 岁。近 6 年痛经并逐渐加重, 伴经量增多及经期延长, 需服强止痛药。查子宫均匀增大如孕 12 周, 质硬, 有压痛, 血红蛋白 75 g/L。

131. 痛经逐渐加重的原因, 最可能的是

- A. 功能性痛经  
 B. 子宫腺肌病  
 C. 子宫内膜结核  
 D. 子宫黏膜下肌瘤  
 E. 子宫肌瘤

132. 最需要的辅助检查是

- A. 诊断刮宫  
 B. 子宫输卵管碘油造影  
 C. 输卵管通液术  
 D. 宫腔镜检查  
 E. B 超检查

133. 本例确诊后的处置应选择

- A. 镇痛药物治疗  
 B. 雌激素治疗  
 C. 手术治疗  
 D. 化学药物治疗  
 E. 放射治疗

(134~136 题共用题干)

10 个月女婴, 不能独坐, 尚不能认识亲人与陌生人。平时少哭少动, 经常便秘, 进食少。查体: 表情呆板, 前囟未闭, 头大, 颈短, 眼距宽, 眼睑水肿, 舌大常伸出口外, 头发稀少, 心率 86 次/分, 心音稍低钝, 腹部膨隆, 腹胀明显。

134. 该患儿最可能的诊断是

- A. 佝偻病  
 B. 先天愚型  
 C. 先天性甲状腺功能减低症  
 D. 先天性巨结肠

E. 黏多糖病

135. 应进行哪项检查以明确诊断

- A. 血钙、磷及碱性磷酸酶测定  
 B. 染色体检查  
 C. 腹部 B 超  
 D. 骨骼 X 线片  
 E. 血  $T_3$ 、 $T_4$ 、TSH



配套名师  
高清视频

136. 该患儿的治疗药物首选

- A. 维生素 D  
 B. 钙剂  
 C. 特殊饮食疗法  
 D. 甲状腺素  
 E. 胃肠动力药

(137~139 题共用题干)

50 岁女性, 孕 5 产 5, 绝经 3 年, 阴道不规则流血 1 个月。妇科检查: 外阴阴道正常, 宫颈肥大、糜烂、触之易出血, 子宫后屈、稍大, 双侧附件未见异常。

137. 该患者绝经后最可能的出血原因是

- A. 宫颈炎  
 B. 子宫内膜炎  
 C. 子宫内膜癌  
 D. 子宫颈尖锐湿疣  
 E. 子宫颈癌

138. 进一步确诊时需做

- A. B 型超声检查  
 B. 宫颈涂片细胞学检查  
 C. 子宫颈碘试验  
 D. 宫颈活组织检查  
 E. 阴道镜检查

139. 若以上检查未发现可疑病灶, 下一步最恰当的处理是

- A. 子宫镜+子宫内膜活检  
 B. 分段刮宫  
 C. 宫颈激光  
 D. 宫颈锥切术  
 E. 3~6 个月后复查



(140~142 题共用题干)

患者,女,63岁。绝经13年,近3个月阴道出血2次,每次持续4天,妇科检查:外阴、阴道无萎缩,宫颈光滑,子宫前位,正常大小,右侧附件区10 cm×5 cm×3 cm肿物,质地中等,光滑、实性,活动良好,无腹水,全身淋巴结无转移。

140.最可能的诊断为

- A.子宫内膜癌
- B.卵巢畸胎瘤
- C.卵巢颗粒细胞瘤
- D.卵巢无性细胞瘤
- E.卵巢睾丸母细胞瘤

141.可能有变化的肿瘤标记物是

- A.β-hCG
- B.CA125
- C.性激素
- D.AFP
- E.CA19-9

142.辅助治疗应加用

- A.孕激素治疗
- B.放疗
- C.雌激素治疗
- D.化疗
- E.雄激素治疗

(143~146 题共用题干)

男性,63岁。尿频,排尿迟缓4年,间歇肉眼血尿1年。B超检查可见膀胱壁毛糙,可见1.5 cm×2.0 cm×2.0 cm大小强回声光团伴声影,前列腺4.2 cm×4.0 cm×5.0 cm大小,残余尿100 mL。

143.该患者主要的诊断是

- A.前列腺增生
- B.前列腺增生合并膀胱血块
- C.膀胱肿瘤
- D.慢性膀胱炎合并膀胱结石
- E.前列腺增生合并膀胱结石

144.该患者宜采用下列哪种治疗

- A.膀胱切开取石术
- B.抗感染
- C.膀胱肿瘤电切术
- D.膀胱内碎石术
- E.前列腺电切术及膀胱碎石术

145.膀胱结石的典型症状是

- A.肉眼血尿
- B.排尿中断
- C.中药排石
- D.会阴部下坠感
- E.剧烈腰痛

146.诊断膀胱结石最可靠的方法是

- A.有尿线中断史
- B.膀胱刺激症状
- C.B超检查
- D.膀胱区平片检查
- E.直肠指检

(147~149 题共用题干)

患者,女,32岁。停经35天,以突发左下腹撕裂样痛1小时就诊,现腹痛渐加重,发冷,BP 80/40 mmHg, P 120次/分,全腹压痛、反跳痛阳性,移动浊音阳性。妇科检查:宫颈举痛,子宫稍大、软,漂浮感,双附件区压痛,左侧明显,未触及包块。

147.最简便又最能帮助迅速确立诊断的检查方法是

- A.B型超声
- B.妊娠试验
- C.腹腔镜检查
- D.后穹窿穿刺
- E.诊断性刮宫

148.此患者最可能的诊断是

- A.流产合并感染
- B.急性输卵管炎
- C.急性阑尾炎
- D.输卵管妊娠破裂

E.完全流产

149.对于该患者,最恰当的处理方法是

- A.纠正休克后手术
- B.纠正休克同时手术
- C.立即进行开腹探查
- D.输血
- E.中药活血化瘀治疗

150.若该患者行保守手术,术后 12 日血 HCG 未下降,再次出现出血,腹痛。考虑是什么原因

- A.腹部炎症
- B.术后出血
- C.持续异位妊娠
- D.卵巢囊肿
- E.绒毛膜癌



配套名师高清视频

本单元试卷到此结束



# 参考答案

## 第四单元

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
E	D	A	A	E	C	A	E	A	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	B	E	C	B	E	D	A	E
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	C	E	D	E	E	C	E	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	D	A	E	E	A	E	E	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
E	E	E	D	A	C	E	C	E	D
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	E	D	B	D	B	D	C	E	E
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
C	E	B	D	D	D	C	D	E	C
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
D	C	E	E	D	D	C	C	D	D
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
C	D	D	D	C	E	B	C	E	B
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
D	B	D	C	B	A	D	D	D	A
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
C	E	B	A	B	A	D	C	E	D
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
E	A	C	A	E	E	A	C	C	A

续表

121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
D	E	E	E	D	D	E	E	D	D
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
E	E	C	C	E	D	E	D	B	C
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
C	D	E	E	B	C	D	D	B	C

46.【解析】支气管哮喘表现为发作性喘息、气急、呼吸困难,有时咳嗽是唯一症状。在凌晨发作是哮喘的特征之一,这是因为在凌晨时,迷走神经兴奋性强,容易引起支气管痉挛狭窄,导致哮喘的发作(C)。其余这 4 种疾病都没有凌晨反复发作的特点。

75.【解析】股骨颈骨折① $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的外旋畸形,患肢缩短;②患髋有压痛,下肢轴向叩痛;③Bryant 三角底边短缩,股骨大转子顶端在 Nelaton 线之上,大转子明显突出。

(103~104 题)【解析】在正常情况下将手搭到对侧肩部,肘部可以贴近胸膛,称为 Dugas 征阴性。有脱位时,将患侧肘紧贴胸壁时,手掌搭不到健侧肩部;或手掌搭在健侧肩部时,肘部无法贴近胸壁,称为 Dugas 征阳性。伸肘握拳、屈腕、前臂旋前,肘部外侧出现疼痛为阳性伸肌腱牵拉试验(Mills 征),其提示肱骨外上髁炎。髋屈曲畸形试验(Thomas 征)阳性常见于髋关节结核。Lasegue 试验也称直腿抬高加强试验,阳性常见于腰椎间盘突出症。握拳尺偏(Finkelstein)试验:握拳尺偏腕关节时,桡骨茎突处出现疼痛,称为 Finkelstein 试验阳性,见于桡骨茎突狭窄性腱鞘炎。



修订更新

