

中西医内外妇儿 100 道预测题

1. 治疗支气管哮喘寒哮证，应首选的方剂是

- A. 射干麻黄汤
- B. 玉屏风散
- C. 六君子汤
- D. 定喘汤
- E. 金匱肾气丸

2. 患者，女，60 岁。反复发作胸闷胸痛半月余，头晕眼花，头痛耳鸣，形寒肢冷，心悸气短，腰膝酸软，夜尿频多，大便溏薄，舌淡胖，脉沉弱。心电图 V₃、V₄、V₅、V₆ 导联 ST 段下移，T 波倒置。其证型是

- A. 痰湿痹阻
- B. 气阴两虚
- C. 寒痰痹阻
- D. 心肾阳虚
- E. 肝气郁结

3. 肺炎球菌肺炎典型的痰色是

- A. 砖红色
- B. 铜绿色
- C. 暗红色
- D. 咖啡色
- E. 铁锈色

4. 肺癌的早期最容易被忽略的症状是

- A. 发热
- B. 咯血
- C. 胸痛
- D. 咳嗽
- E. 短气

5. 心脏瓣膜病的主要中医病因是

- A. 七情所伤
- B. 饮食不节
- C. 禀赋不足
- D. 劳倦体虚
- E. 感受外邪

6. 某骨髓增生异常综合征患者，面色萎黄，唇甲色淡，头晕目眩，失眠多梦，耳鸣眼花，气短懒言，疲乏无力，胸闷心悸，动则尤甚，肋下癥积，舌体胖大，舌质淡红，舌苔薄白，脉虚无力。治疗应首选的方剂是

- A. 大补元煎加减



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- B. 清骨散加減
- C. 右归丸加減
- D. 八珍汤加減
- E. 血府逐瘀汤加減

7. 治疗冠心病心绞痛气阴两虚证，可采用的是

- A. 血府逐瘀汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、钙离子拮抗剂
- B. 补阳还五汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、利尿剂
- C. 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤与硝酸酯制剂、ACEI、钙离子拮抗剂
- D. 生脉散合炙甘草汤与硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂、钙通道阻滞剂
- E. 当归四逆汤合苏合香丸与利尿剂、硝酸酯制剂、 β 受体阻滞剂

8. 帕金森病最多见的初发症状是

- A. 肌强直
- B. 运动迟缓
- C. 姿势步态异常
- D. 眼睑阵挛
- E. 震颤

9. 缓解急性心肌梗死疼痛最有效的药物是

- A. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）
- B. 硝酸甘油
- C. 吗啡
- D. 安痛定
- E. 硝苯地平（心痛定）

10. 慢性胃炎脾胃湿热证的治法是

- A. 温中散寒，健脾益气
- B. 清利湿热，醒脾化浊
- C. 益气养胃，温中健脾
- D. 理气和胃，健脾益气
- E. 疏肝健脾，益气养胃

11. 消化性溃疡并发幽门梗阻，应首选的治疗措施是

- A. 阿托品加输液
- B. 洛赛克加输液
- C. 抗生素加消食中药
- D. 禁食、胃肠减压、补液
- E. 服中药消导化滞

12. 怀疑胃溃疡恶变时的最佳处理措施是

- A. 边治疗溃疡边密切观察
- B. 胃镜取活检明确诊断，指导治疗
- C. 服中药活血化瘀，清热解毒



英杰医学
JINYINGJIE.COM

- D. 立即化疗
- E. 立即手术

13. 中医学认为肝硬化之病位主要在

- A. 肝、胆、脾、胃
- B. 肝、胆、肺、肾
- C. 肝、心、脾、肾
- D. 肝、脾、肾
- E. 肝、心、脾

14. 下列各项，对诊断肝性脑病最有意义的是

- A. 血清尿素氮
- B. 丙氨酸转移酶
- C. 血氨
- D. 血清胆红素
- E. 尿酮体

15. 治疗溃疡性结肠炎脾肾阳虚证的方剂是

- A. 白头翁汤
- B. 理中汤合四神丸
- C. 参苓白术散
- D. 驻车丸
- E. 痛泻要方

16. 慢性肾小球肾炎形成蛋白尿的主要病机是

- A. 心脾气虚
- B. 肺肾气虚
- C. 脾肾两虚
- D. 心肾阴虚
- E. 肝肾阴虚

17. 尿毒症终末期最理想的治疗措施是

- A. 血液透析
- B. 肾切除
- C. 输新鲜血
- D. 每天口服生大黄 8~12g
- E. 用中药保留灌肠

18. 患者，男，24岁。患急性白血病，高热，口渴多汗，壮热，口渴多汗，烦躁，头痛面赤，身痛，口舌生疮，咽喉肿痛，咳黄痰，舌质红绛，苔黄，脉大。治疗应首选的方剂是

- A. 知柏地黄丸合二至丸
- B. 黄连解毒汤合清营汤
- C. 温胆汤合桃红四物汤
- D. 葛根芩连汤



英杰医学

YINGJIE.COM

E. 犀角地黄汤

19. 治疗癫痫发作期阳痫证，应首选的方剂是

- A. 定痫丸
- B. 通窍活血汤
- C. 黄连温胆汤
- D. 左归丸
- E. 龙胆泻肝汤

20. 患者，男，74岁。胸痛反复发作2年。2小时前，胸痛再次发作，持续不缓解，烦躁不安，大汗淋漓。经检查诊断为急性前间壁心肌梗死。其心电图特征性改变出现的导联

- A. V₁、V₂、V₃
- B. II、III、aVF
- C. V₁、V₂、V₃、V₄、V₅
- D. V₁、V₂、V₃、aVF、II、III
- E. V₅、V₆、V₇

21. 患者胸闷憋气，心痛频发，四肢厥逆，大汗淋漓，面色苍白，口唇发绀，手足青至节，虚烦不安，神志淡漠，舌质青紫，脉微欲绝。治疗应首选的方剂是

- A. 人参养荣汤合左归饮
- B. 炙甘草汤合生脉散
- C. 参附龙牡汤
- D. 苓桂术甘汤合左归丸
- E. 苏合香丸合左归饮

22. 急性心肌梗死最常见的心律失常是

- A. 房性早搏或心房纤颤
- B. 室性早搏
- C. 房室传导阻滞
- D. 预激综合征
- E. 右束支传导阻滞

23. 风湿性心脏瓣膜病并发栓塞，最常见于

- A. 二尖瓣狭窄合并心力衰竭
- B. 二尖瓣狭窄合并心房纤颤
- C. 二尖瓣关闭不全合并心力衰竭
- D. 二尖瓣关闭不全合并主动脉瓣关闭不全
- E. 二尖瓣狭窄合并关闭不全

24. 患者，男，40岁。颅脑术后第5天，但持续高热4天，全身浮肿，近2天每日尿量不足1000 ml，血尿素氮260 mmol/L，血肌酐>740 μmol/L，血钾6.6 mmol/L。其诊断是

- A. 急性肾衰竭
- B. 休克
- C. 心力衰竭

- D. 肝肾综合征
- E. 以上均非

25. 患者，男，21岁。呼吸困难，咳嗽，汗出1小时而就诊。查体：端坐呼吸，呼吸急促，口唇微绀，心率114次/分，律不齐，双肺布满哮鸣音。为迅速缓解症状，应立即采取的最佳治法是

- A. 口服氨茶碱
- B. 肌注氨茶碱
- C. 喷吸沙丁胺醇
- D. 口服泼尼松
- E. 口服阿托品

26. 煮沸法消毒杀灭一般细菌所需时间为

- A. 20分钟
- B. 40分钟
- C. 60分钟
- D. 80分钟
- E. 100分钟

27. 下列除哪项外，其他均属于腰麻（蛛网膜下腔阻滞）术后的并发症

- A. 尿潴留
- B. 呼吸抑制
- C. 颅神经麻痹
- D. 马尾丛综合征
- E. 化脓性脑脊髓膜炎

28. 正常成年人，24小时尿量为

- A. 800~900 mL
- B. 1000~2000 mL
- C. 1600~1800 mL
- D. 1900~2000 mL
- E. 2200~2500 mL

29. 输血后，出现酱油色尿，呼吸困难，血压下降，见于

- A. 发热反应
- B. 溶血反应
- C. 过敏反应
- D. 充血性心力衰竭
- E. 枸橼酸中毒

30. 下列各项，不是甲亢手术并发症的

- A. 呼吸困难和窒息
- B. 声音嘶哑
- C. 呛咳



英杰医学
JINYINGJIE.COM

- D. 甲状腺危象
- E. 吞咽困难

31. 肾脏损伤不出现的临床表现是

- A. 排尿困难
- B. 膀胱刺激征
- C. 尿潴留
- D. 高血压
- E. 尿外渗

32. 患者，男，27岁。发现颈前肿块3个月。诊断为甲状腺腺瘤，腰膝酸软，头晕耳鸣，舌质红，苔少，脉细数。局部时有发胀，胸闷，有痰难咯，舌淡红苔薄白，脉弦。治疗应首选

- A. 八珍汤
- B. 海藻玉壶汤
- C. 逍遥散
- D. 柴胡疏肝散
- E. 二陈汤

33. 伴鼠尿臭味的皮肤病是

- A. 白癣
- B. 带状疱疹
- C. 黑点癣
- D. 湿疹
- E. 黄癣

34. 下列何病适用醋酸白实验

- A. 湿疹
- B. 淋病
- C. 尖锐湿疣
- D. 银屑病
- E. 梅毒

35. 前列腺增生症最重要的症状是

- A. 尿潴留
- B. 尿频
- C. 进行性排尿困难
- D. 血尿
- E. 尿痛

36. 血栓闭塞性脉管炎寒湿证的治法是

- A. 清热解毒，活血化瘀
- B. 活血通络，散寒止痛
- C. 清热活血，疏通经络



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- D. 温阳通脉，祛寒化湿
- E. 清热解毒，化痰通络

37. 首选用于治疗急性乳腺炎，肝胃郁热证的方剂是

- A. 托里消毒散
- B. 普济消毒饮
- C. 瓜蒌牛蒡汤
- D. 柴胡清肝汤
- E. 五味消毒饮

38. 胆道蛔虫梗阻出现腹痛的特点是

- A. 突发中上腹剧烈刀割样持续性疼痛
- B. 持续性、广泛性剧烈腹痛伴腹肌紧张
- C. 右上腹进行性锐痛
- D. 剑突下钻顶样疼痛
- E. 右上腹阵发性绞痛

39. 患者，男，胸部损伤，现损伤后期症见肋肋隐痛，悠悠不休，口干咽燥，心中烦热，头晕目眩，腰膝酸软，遗精；舌红少苔，脉弦细，应选用的方药是

- A. 八珍汤
- B. 六味地黄丸
- C. 接骨紫金丹
- D. 十灰散
- E. 复元活血汤

40. 局麻药内加肾上腺素的主要目的是

- A. 预防过敏反应
- B. 延缓药物吸收，延长作用时间
- C. 使局部血管收缩，减少出血
- D. 预防术中血压下降
- E. 预防术中脉搏减慢

(41~42 题共用选项)

- A. 阳和汤
- B. 桃红四物汤
- C. 四妙勇安汤
- D. 八珍汤合左归丸
- E. 十全大补丸

41. 治疗血管闭塞性脉管炎气血两虚证应首选

42. 治疗动脉硬化性闭塞症脾肾阳虚证应首选

(43~44 题共用备选答案)

- A. 普鲁卡因
- B. 乙醚

- C. 丁卡因
 - D. 硫喷妥钠
 - E. 布比卡因
43. 黏膜表面麻醉，应首选的局麻药是
44. 局部浸润麻醉，应首选的局麻药是

(45~48 题共用备选答案)

- A. 大黄黄连泻心汤加减
 - B. 麦门冬汤加减
 - C. 化肝煎加减
 - D. 导痰汤加减
 - E. 丁香透膈散加减
45. 对于瘢痕性幽门梗阻脾胃虚寒证者，宜用
46. 对于瘢痕性幽门梗阻痰湿阻胃证者，宜用
47. 对于瘢痕性幽门梗阻胃中积热证者，宜用
48. 对于瘢痕性幽门梗阻气阴两虚证者，宜用

(49~50 题共用备选答案)

- A. 五神汤
 - B. 银翘散
 - C. 五味消毒饮
 - D. 仙方活命饮
 - E. 黄连解毒汤
49. 首选用于治疗疔疮初期的方剂是
50. 首选用于治疗有头疽初期（成痈期）的方剂是

51. 成年女子宫体与宫颈的比例是

- A. 1 : 1
- B. 1 : 2
- C. 2 : 1
- D. 3 : 1
- E. 3 : 2

52. 宫颈癌的好发部位是

- A. 宫颈鳞状上皮
- B. 宫颈柱状上皮
- C. 子宫体
- D. 子宫颈外口柱状上皮与鳞状上皮交界处
- E. 宫体浆膜层

53. 中医学认为妊娠剧吐的主要发病机理是

- A. 脾胃虚弱，肝气偏旺
- B. 冲气上逆，胃失和降
- C. 肝失条达，气机郁滞



- D. 痰湿内停，阻郁脾阳
- E. 肝气郁结，胃气上逆

54. 孕妇末次月经为 2019 年 3 月 15 日，其预产期是

- A. 2020 年 1 月 20 日
- B. 2019 年 12 月 28 日
- C. 2019 年 12 月 22 日
- D. 2020 年 12 月 15 日
- E. 2020 年 12 月 15 日

55. 关于正常枕先露分娩机制的叙述，正确的是

- A. 下降—衔接—内旋转—俯屈—仰伸—复位及外旋转
- B. 衔接—俯屈—内旋转—下降—仰伸—复位及外旋转
- C. 衔接—下降—俯屈—内旋转—仰伸—复位及外旋转
- D. 下降—俯屈—衔接—内旋转—仰伸—复位及外旋转
- E. 衔接—下降—内旋转—俯屈—仰伸—复位及外旋转

56. 患者，女，29 岁，已婚。孕 8 个月，头晕头痛，耳鸣作响，心悸怔忡，夜寐多梦，舌红，少苔，脉弦细滑，血压 150/90 mmHg。治疗应首选

- A. 半夏白术天麻汤
- B. 杞菊地黄丸
- C. 羚角钩藤汤
- D. 知柏地黄汤
- E. 牛黄降压丸

57. 患者，女，25 岁，已婚。产后 2 天，高热寒战，小腹疼痛拒按，恶露量多，色紫黯如败酱，气臭秽，烦躁，口渴引饮，尿少色黄，大便燥结；舌红，苔黄而干，脉数有力。其诊断是

- A. 产褥感染热陷心包证
- B. 产褥感染感染邪毒证
- C. 产后发热血瘀证
- D. 产后发热血虚证
- E. 产后发热痰湿证

58. 下列关于胎盘组成的叙述，正确的是

- A. 滑泽绒毛膜、羊膜、底蜕膜
- B. 滑泽绒毛膜、真蜕膜、底蜕膜
- C. 叶状绒毛膜、包蜕膜、真蜕膜
- D. 叶状绒毛膜、羊膜、底蜕膜
- E. 叶状绒毛膜、真蜕膜、底蜕膜

59. 关于异位妊娠的临床表现说法错误的是

- A. 有 6~8 周的停经史
- B. 腹痛
- C. 阴道少量不规则流血

- D. 腹腔内大出血而致晕厥
 - E. 阴道后穹窿常不饱满
60. 临产的重要标志是
- A. 见红，破膜，规律宫缩
 - B. 见红，规律宫缩，宫口开张不明显
 - C. 见红，先露下降，伴尿频
 - D. 规律宫缩，见红
 - E. 规律宫缩，进行性宫口扩张和胎先露部下降

61. 下列关于滴虫阴道炎的叙述，错误的是

- A. 为性传播疾病
- B. 分泌物为豆腐渣样
- C. 性伴侣应同时检查和治疗
- D. 治疗后复查为阴性并不能确诊为治愈
- E. 为感染阴道毛滴虫所引起

62. 治疗不孕症肾阴虚型宜选用

- A. 大补元煎
- B. 温胞饮
- C. 开郁种玉汤
- D. 六味地黄丸
- E. 养精种玉汤

63. 下列各项，属宫颈癌早期临床特点的是

- A. 不规则阴道出血
- B. 接触性出血
- C. 大量脓血性恶臭白带
- D. 下肢肿痛
- E. 输尿管上段扩张

64. 患者，女，30岁，已婚。月经周期正常，但经量多（5包纸/次），色深红、质稠，心烦口渴，尿黄便结，舌红苔黄，脉滑数。妇科盆腔，及B超检查无异常，基础体温呈双向。治疗应首选

- A. 保阴煎
- B. 清经散
- C. 清热固经汤
- D. 安冲汤
- E. 桃红四物汤

65. 下列哪项属于子宫内膜的周期性变化

- A. 增生期
- B. 泌乳期
- C. 性成熟期
- D. 排卵期

E. 黄体期

66. 患者，女，25岁。在分娩时突发呼吸困难，其后咯血而死。尸检发现肺小血管内有胎脂及角化上皮。其死因可能是

- A. 血栓栓塞
- B. 气体栓塞
- C. 脂肪栓塞
- D. 羊水栓塞
- E. 瘤细胞栓塞

67. 患者，女，23岁。每逢经行小腹胀痛拒按，月经量少，色紫暗有块，块下痛减，伴胸胁、乳房作胀，舌暗，脉弦。治疗应首选

- A. 柴胡疏肝散
- B. 膈下逐瘀汤
- C. 少腹逐瘀汤
- D. 桂枝茯苓丸
- E. 逍遥散

68. 治疗子宫内膜不规则脱落之湿热蕴结证，应首选

- A. 清肝止淋汤
- B. 二妙丸
- C. 清经散
- D. 两地汤
- E. 固经丸

69. 下列不属于先兆流产症状的是

- A. 阴道流血
- B. 腹痛
- C. 腰背痛
- D. 小腹坠胀
- E. 阴道胎块

70. 尿路感染常见病机不包括

- A. 阴虚火旺
- B. 心火偏亢
- C. 肾阳衰微
- D. 膀胱气化失司
- E. 湿热下注膀胱

71. 患者，女，26岁。新产后，突然阴道大量出血，血色鲜红，头晕目花，心悸怔忡，气短懒言，肢冷汗出，面色苍白，舌淡，脉虚数。选用的治法为

- A. 活血化瘀，调冲止血
- B. 活血化瘀，理血归经
- C. 补气固冲，摄血止崩



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

53/54

- D. 补脾益气，固冲摄血
- E. 养阴清热，安冲止血

72. 患者，女，25岁，已婚。停经54天，3天来阴道少量出血，色淡红，腰酸腹坠，隐痛，头晕耳鸣，小便频数，舌淡苔白，脉沉滑尺弱。检查：尿妊娠试验(+)，子宫大小与孕月相符。治疗应首选

- A. 维生素E加寿胎丸
- B. 维生素E加胎元饮
- C. 维生素E加桂枝茯苓丸
- D. 黄体酮加圣愈汤
- E. 黄体酮加保阴煎

73. 妊娠剧吐常发生于停经

- A. 6天左右
- B. 10天左右
- C. 4周左右
- D. 6周左右
- E. 10周左右

74. 确诊早孕，最可靠的辅助方法是

- A. 妇科内诊，基础体温测定
- B. 阴道后穹窿穿刺，基础体温测定
- C. 基础体温测定，HCG测定
- D. 尿妊娠试验，基础体温测定
- E. B超检查，尿妊娠试验

75. 前置胎盘患者终止妊娠的指征不包括

- A. 反复大量流血甚至休克者
- B. 胎龄达35周以上
- C. 胎儿成熟度检查提示胎儿肺成熟
- D. 胎龄未达36周，出现胎儿窘迫征象
- E. 胎儿出现难以存活的畸形

76. 小儿死亡率最高的年龄期是

- A. 学龄期
- B. 学龄前期
- C. 幼儿期
- D. 新生儿期
- E. 婴儿期

77. 咽部有灰白色假膜，轻拭不去，重擦出血，白膜复生，可见于

- A. 鹅口疮
- B. 白喉
- C. 乳蛾
- D. 麻疹黏膜斑



E. 口疮

78. 下列各项，不属于胎黄的病位是

- A. 脾
- B. 胃
- C. 肝
- D. 胆
- E. 肾

79. 治疗新生儿黄疸湿热熏蒸证应选用

- A. 茵附汤
- B. 茵陈蒿汤
- C. 八正散
- D. 清胃黄连丸
- E. 参苓白术散

80. 小儿感冒容易出现兼证，多见

- A. 夹火、夹痰、夹湿
- B. 夹火、夹痰、夹滞
- C. 夹风、夹痰、夹滞
- D. 夹惊、夹痰、夹滞
- E. 夹湿、夹惊、夹滞

81. 反复浮肿伴低蛋白血症高胆固醇血症，尿蛋白定量 $>100\text{ mg}/24\text{ h}$ 。症见五心烦热，面色潮红，头痛眩晕，口干唇赤，腰膝酸软，汗多便干，舌红苔少，脉细数。其病证诊断是

- A. 肾病综合征，气滞血瘀型
- B. 肾病综合征，脾肾阳虚型
- C. 肾病综合征，肝肾阴虚型
- D. 肾病综合征，脾虚湿困型
- E. 急性肾炎，风水相搏型

82. 下列哪项不是注意力缺陷多动障碍的临床特征

- A. 动作过多
- B. 注意力不集中
- C. 智力低下
- D. 学习困难
- E. 冲动任性

83. 小儿鹅口疮口腔局部的临床特征是

- A. 口腔黏膜出现单个或成簇的小疱疹
- B. 口腔黏膜充血、水肿，可有疱疹
- C. 口腔创面有纤维素渗出物形成或灰白色假膜，易拭去
- D. 口腔黏膜表面覆盖有白色乳凝块样片状物，不易拭去
- E. 口腔黏膜出现大小不等的糜烂或溃疡



84. 免疫性血小板减少症血热伤络证的治法是

- A. 清热解毒，凉血止血
- B. 清热解毒，凉血宁络
- C. 滋阴清热，凉血宁络
- D. 益气健脾，摄血养血
- E. 活血化瘀，理气止血

85. 幼儿麻疹发热与出疹的关系是

- A. 发热数小时~1 天出疹
- B. 发热 1~2 天出疹
- C. 发热 3~4 天出疹，出疹时发热更高
- D. 发热 3~4 天出疹，疹出热退
- E. 发热与出疹无明显关系

86. 猩红热的主要病机是

- A. 痧毒疫疔蕴于肺胃
- B. 麻疹热毒犯于肺卫
- C. 麻疹热毒蕴于脾胃
- D. 痧毒疫疔侵犯肝胆
- E. 以上都不是

87. 患儿，18 个月。腹泻时轻时重，已经 3 个月，大便清稀无臭，夹不消化食物，有时便后脱肛，形寒肢冷，面色晄白，精神萎靡，睡时露睛，舌淡苔白，指纹色淡。治疗应首选的方剂是

- A. 异功散合平胃散
- B. 附子理中汤合四神丸
- C. 保和丸合二陈汤
- D. 金匱肾气丸合人参乌梅汤
- E. 参苓白术散合理中丸

88. 患儿，5 个月。腹泻水样便，每日 10 余次，尿量少。查体：昏睡，呼吸深快，皮肤弹性极差，前囟及眼窝明显凹陷，四肢凉。实验室检查：二氧化碳结合力 10 mmol/L。应首先考虑的是

- A. 重度脱水，酸中毒
- B. 中度脱水，酸中毒
- C. 中度脱水
- D. 轻度脱水
- E. 以上均非

89. 猩红热的致病菌是

- A. 风疹病毒
- B. 溶血性链球菌
- C. 大肠杆菌



英杰医学

- D. 麻疹病毒
 - E. 柯萨奇病毒
90. 乳婴儿中药用量为成人量的
- A. 1/6
 - B. 1/5
 - C. 1/4
 - D. 1/3
 - E. 1/2

91. 下列属于早产儿生理性黄疸特点的是
- A. 出生后 5~6 天出现, 30~35 天完全消退
 - B. 出生后 3~4 天出现, 21~28 天完全消退
 - C. 出生后 3~4 天出现, 15~20 天完全消退
 - D. 出生后 2~3 天出现, 10~14 天完全消退
 - E. 出生后 1~2 天出现, 3~7 天完全消退

92. 过敏性紫癜血热妄行证的首选方剂是
- A. 银翘散
 - B. 犀角地黄汤
 - C. 四妙散
 - D. 葛根黄芩黄连汤合小承气汤
 - E. 茜根散

93. 患儿, 女, 3 个月。口腔、舌面满布白屑, 面赤唇红, 烦躁不宁, 吮乳啼哭, 大便干结, 小便短黄。治疗应首选制霉菌素加
- A. 清热泻脾散
 - B. 泻黄散
 - C. 六味地黄丸
 - D. 导赤散
 - E. 清胃散

94. 患儿, 10 个月, 入院时诊断为腺病毒肺炎痰热闭肺证。今突然虚烦不安, 额汗不温, 口唇发绀。查体: 体温 38℃, 呼吸 64 次/分, 心率 165 次/分, 心音低钝, 肝脏比入院时增大 2 cm, 舌暗紫, 指纹沉而色青, 达于命关。治疗应首选
- A. 西地兰加参附龙牡汤
 - B. 青霉素加生脉散
 - C. 地塞米松加参附龙牡汤
 - D. 西地兰加真武汤
 - E. 地塞米松加麻杏石甘汤

95. 病毒性脑膜炎与化脓性脑膜炎脑脊液检查相同的是
- A. 氯化物减低
 - B. 蛋白质增高
 - C. 糖升高

- D. 白细胞明显增高
- E. 颅内压降低

96. 患儿，男，6岁。面色不华已逾3个月，指甲苍白，纳食不佳，四肢乏力，大便溏泻，舌淡苔薄白，脉细无力。血常规示小细胞低色素性贫血。治疗应首选的方剂是

- A. 八珍汤
- B. 大补元煎
- C. 六君子汤
- D. 保和丸
- E. 补中益气汤

97. 患儿，女，5岁。反复咳嗽2个月，咳嗽呈发作性，干咳痰少，夜间加剧，用抗生素治疗无效，口服氨茶碱能明显减轻症状。应首选考虑的是

- A. 寒性哮喘
- B. 热性哮喘
- C. 急性上呼吸道感染
- D. 咳嗽变异性哮喘
- E. 急性支气管炎

98. 麻疹的传播途径是

- A. 性传播
- B. 接触传播
- C. 母婴传播
- D. 飞沫传播
- E. 血液传播

99. 佝偻病后遗症期最主要的表现是


- A. 骨骼畸形
- B. 睡眠不安及多汗
- C. X线长骨骺端呈毛刷样改变
- D. 血磷下降，血钙正常
- E. 肌肉韧带松弛

100. 新生儿心率低于多少时需采用心脏按压术

- A. 30次/分
- B. 40次/分
- C. 50次/分
- D. 60次/分
- E. 70次/分



扫码关注公众号，获取更多资料和资讯



金英杰医学
JINYINGJIE.COM