

M1 型题 -部分模拟题

(金英杰临床考试研究院出品)

M 型题每个案例下设若干个提问，每个题干下设有若干个备选答案，请选出最合适的一个。每道题完成点击下一题后将不能回看和修改。

M1 001.女婴，4 个月。1 个半月前诊断为“化脓性脑膜炎”，抗生素治疗 3 周后病情平稳出院。近 1 周患儿出现烦躁哭闹、呕吐，家长发现头颅进行性增大，前囟饱满扩大，头皮静脉扩张，头颅 CT 示脑室系统扩大。最可能的诊断是 **参考答案：C**

- A.硬脑膜下积液
- B.脑脓肿
- C.脑积水
- D.脑室管膜炎
- E.抗利尿激素异常分泌综合征
- F.化脓性脑膜炎复发
- G.脑水肿

M1 002.女婴，2 个月。过期产，出生体重 4kg，出生后吃奶慢，便秘，大便 6~7 天一次，至今黄疸尚未完全消退。查体：哭声低哑，手脚凉，腹部膨隆。最可能的诊断是

参考答案：C

- A.习惯性便秘
- B.低血糖
- C.先天性甲状腺功能减退症
- D.新生儿肝炎综合征
- E.先天性巨结肠
- F.病理性黄疸
- G.新生儿坏死性小肠结肠炎
- H.新生儿寒冷损伤综合征

M1 003.男孩，4 岁。发热 2 天，皮疹 1 天，伴咽部疼痛。查体：T39.2℃，全身皮肤弥漫性充血，伴密集针尖大小丘疹，咽红，扁桃体 II 度肿大，可见少许渗出。血常规：HB135g/L，WBC 12.6×10⁹/L，N0.65，PLT 250×10⁹/L。CRP15mg/L。最可能的诊断是**参考答案：A**

- A.猩红热

- B.水痘
- C.麻疹
- D.幼儿急疹
- E.丘疹样荨麻疹
- F.手足口病
- E.咽结合膜热
- F.川崎病
- G.风疹

M1 004.男孩，5岁。因体格和智力发育落后来诊。查体：身材矮小，眼距宽，鼻梁低，外耳小，头围小，骨龄落后于年龄，通贯手，胸骨左缘第3~4肋间可闻及3/6级收缩期杂音。确诊需要做的检查是 **参考答案：D**

- A.尿有机酸测定
- B.血清T3、T4、TSH检测
- C.头颅CT
- D.染色体核型分析
- E.超声心动图
- F.头颅MRI
- G.尿蝶呤分析
- H.TRH刺激试验
- I.新生儿血滴纸片检测

M1 005.男，50岁。车祸致枕部着地，昏迷1小时。查体：P50次/分，R12次/分，BP170/100mmHg。右枕部头皮挫伤灶。GCS8分，瞳孔左：右=4mm：2mm，左侧对光反射消失，右侧肢体偏瘫。对诊断最有价值的检查是**参考答案：E**

- A.脑血管造影
- B.腰椎穿刺
- C.头颅X线平片
- D.头颅超声
- E.头颅CT
- F.头颅MRI
- G.脑电图
- H.脑磁图
- I.放射性核素

M1 006.女，25岁。孕40周，拟行剖宫产手术。既往体健，无输血史。入院后化验血HB 70g/L，术前给予输注悬浮红细胞，开始输注30分钟后，患者出现皮肤潮红、出汗、呼吸困

难、视物模糊。查体：T36.5°C，会厌部水肿。应首先考虑的输血不良反应是**参考答案：C**

- A.输血相关循环超负荷
- B.急性溶血性输血反应
- C.过敏反应
- D.输血相关移植物抗宿主病
- E.细菌污染反应
- F.迟发性溶血性输血反应
- G.输血相关肺损伤
- H.大量输血影响

M1 007.男，46岁。头痛、偶伴间断喷射性呕吐2个月，癫痫发作1次，近1周来头痛症状加重。查体：P56次/分，BP160/95mmHg。双侧视神经乳头水肿，眼底可见出血，右眼外展不全。临床诊断为颅内压增高，其最有价值的诊断依据是**参考答案：C**

- A.喷射性呕吐
- B.剧烈头痛
- C.视神经乳头水肿
- D.右侧展神经麻痹
- E.癫痫发作
- F.血压升高
- G.脉压增高
- H.心率缓慢
- I.眼底出血

M1 008.女，25岁。2年来常在遇到不高兴的事情时，生气哭闹，出现四肢强直和抽搐样表现，发作时能听清楚家人的呼唤，不语，流眼泪，无唇舌咬伤和大小便失禁。本次因再次出现类似发作就诊。入院查体：呼之不应，不时四肢抽搐样发作，瞳孔无散大，对光反射存在。最可能的诊断是**参考答案：D**

- A.创伤后应激障碍
- B.恐惧性焦虑障碍
- C.原发性癫痫
- D.分离（转换）障碍
- E.抑郁障碍
- F.神经症性障碍
- G.双相障碍
- H.恶劣心境
- I.广泛性焦虑障碍

M1 009.女，35岁。突然听到丈夫在车祸中去世的消息，表现为不认识亲人，凭空看到丈夫就站在自己面前，说：“我给你做饭吧”，随即进厨房做饭，家人劝阻也不理睬，两天后突然清醒，对病情经过不能完全回忆。该患者的状态是**参考答案：D**

- A.朦胧状态
- B.强迫状态
- C.谵妄状态
- D.幻觉妄想状态
- E.抑郁状态
- F.焦虑障碍
- G.分离（转换）障碍
- H.急性应激障碍
- I.癫痫小发作

M1 010.男，19岁，大学一年级学生。自述上大学2个月以来，每天过得都很压抑，思念乡里的家人，不能与同学打成一片，郁郁寡欢，晚上常独自流泪，但能坚持上课，有强烈的退学回家念头。否认自杀企图或悲观厌世的想法。该患者的诊断为 **参考答案：D**

- A.强迫障碍
- B.抑郁发作
- C.焦虑障碍
- D.适应障碍
- E.急性应激障碍
- F.分离（转换）障碍
- G.恐惧症

M1 011.女，25岁。进行性全身无力1年余。晨起时无力症状较轻，活动后加重。否认甲亢病史。查体：未见明显的肌肉萎缩及肌张力异常，四肢肌力4级，四肢腱反射正常，肌疲劳试验阳性。最可能的诊断是 **参考答案：A**

- A.重症肌无力
- B.急性脊髓炎
- C.吉兰-巴雷综合征
- D.多发性肌炎
- E.周围性瘫痪
- F.低血钾
- G.低血糖
- H.肌萎缩性脊髓侧索硬化症

M1 012.男，40岁。患慢性再生障碍性贫血2年，头晕、心悸加重10天。2个月前在输血过程中出现体温升高，达39.5°C，经对症处理后缓解。此次入院时化验血Hb50g/L。需给予伴外输血治疗，应首选的血液成分是 **参考答案：B**

- A.浓缩红细胞
- B.去白细胞的红细胞
- C.悬浮红细胞
- D.红细胞
- E.冰冻红细胞
- F.冷沉淀
- G.血浆白蛋白
- H.新鲜冰冻血浆
- I.洗涤红细胞

M1 013.男，70岁。2年来经常不能完整叙述新近发生的事情，且常常无中生有地讲述一些从未发生过的事情。患者意识清楚，常搞错时间和地点。最可能的症状是**参考答案：E**

- A.急性脑综合征
- B.脑衰弱综合征
- C.紧张综合征
- D.精神自动症
- E.遗忘综合征
- F.阿尔兹海默症
- G.慢性脑综合征
- H.戒断综合征

M1 014.女，60岁。晨起后突感右上肢无力，持物掉落，伴言语不利，休息半小时后缓解。既往有高血压、糖尿病病史。查体：未见脑神经异常，四肢运动、感觉及共济运动正常。最可能的诊断是**参考答案：E**

- A.脑出血
- B.低血糖
- C.高血压脑病
- D.癫痫单纯性部分性发作
- E.短暂性脑缺血发作
- F.蛛网膜下腔出血
- G.糖尿病性神经病
- H.脑血栓形成

M1 015.男，50岁。因多年慢性肾衰竭准备行肾移植。因医院库存血液不足，需亲属献血给患

者用。患者兄、妹各献血400mL，血液检测合格，拟供血者输注。此时应对这两袋血液采取的处理措施是**参考答案：E**

- A.反复洗涤
- B.细菌灭活
- C.滤除白细胞
- D.病毒灭活
- E.γ射线照射
- F.浓缩红细胞
- G.冰冻红细胞

M1 016.女，35岁。反复关节痛2年，予双氯芬酸治疗后症状有所缓解。1年前患者出现面部水肿，查尿蛋白（+++），诊断为慢性肾炎，予静脉注射白蛋白、利尿等治疗后症状好转。近2个月出现牙龈出血、皮肤瘀点，月经量增多。血常规：Hb 93g/L，WBC $6.8 \times 10^9/L$ ，N0.85，PI $50 \times 10^{12}/L$ ，ANA（+）。最可能的诊断是**参考答案：E**

- A.再生障碍性贫血
- B.Evans综合征
- C.过敏性紫癜
- D.急性白血病
- E.系统性红斑狼疮
- F.慢性白血病
- G.血小板减少性紫癜
- H.血友病

M1 017.男，30岁。因消化性溃疡行胃大部切除、毕2式吻合术治疗。术后第5天，突发右腹剧痛。查体：心肺未见明显异常，手术切口无明显渗出，全腹肌紧张、压痛（+），以右上腹为著，最可能的诊断是**参考答案：A**

- A.十二指肠残端破裂
- B.急性胆囊炎并穿孔
- C.输入段肠袢梗阻
- D.胃肠吻合口出血
- E.急性胰腺炎
- F.输出段肠袢梗阻
- G.急性化脓性阑尾炎
- H.胃肠吻合口破裂
- I.倾倒综合征

M1 018.女，50岁。大便习惯改变伴体重减轻2个月。近2个月来无诱因排稀便，5~6次/日，偶伴少量脓血黏液，便前腹痛。查体：T36.5°C，P80次/分，R18次/分，BP120/80mmHg。双肺呼吸音清，未闻及干湿啰音，心率80次/分，律齐。腹软，左下腹可触及一质硬、固定、椭圆形包块肠鸣音亢进。最可能的诊断是**参考答案：B**

- A.结肠息肉
- B.乙状结肠癌
- C.乙状结肠扭转
- D.溃疡性结肠炎
- E.肠套叠
- F.克罗恩病
- G.单纯型肠梗阻
- H.肠结核
- I.肠易激惹综合征

M1 019.男，30岁。间断右下腹痛1年，加重伴腹泻1个月。大便每日4~5次，黄色稀便，无黏液脓血，伴低热，体重下降4kg。既往反复发作肛瘘1年，曾手术治疗。查体：T37.5°C，右下腹轻压痛。肛门视诊可见肛瘘开口。粪隐血(+++)。肠镜检查发现回肠末端、回盲瓣多发溃疡，病变之间黏膜相对正常，结肠及直肠未见明显异常。**参考答案：E**

116.目前最可能的诊断是

- A.肠结核
- B.淋巴瘤
- C.贝赫切特病
- D.溃疡性结肠炎
- E.克罗恩病
- F.肠息肉
- G.慢性菌痢
- H.中毒型巨结肠

M1 020.女，50岁。2天前因肺炎入院，给与吸氧，静脉滴注抗生素、止咳、化痰等治疗。1天来出现呼吸困难，烦躁，呼吸急促。动脉血气分析：pH7.44PaCO₂mmHg，PaO₂55mmHg，BE-3mmol/L。目前对血气分析的判断，最准确的是**参考答案：B**

- A.代谢性酸中毒
- B.I型呼吸衰竭
- C.呼吸性酸中毒
- D.II型呼吸衰竭
- E.代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
- F.呼吸性碱中毒

G.呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

H.代谢性酸中毒合并代谢性碱中毒

M1 021.男，60岁。乏力、食欲缺乏、双下肢水肿3个月，腹胀、右季肋部隐痛2周。既往慢性乙型肝炎病史12年，未规律诊治。腹部B超：右肝后叶可见直径2.5cm低回声结节，腹腔内可见游离液性暗区。为明确诊断，最有意义的实验室检查是**参考答案：E**

A.癌胚抗原

B.丙氨酸氨基转移酶

C.糖链抗原199

D.胆红素

E.甲胎蛋白

F.CA19-9

G.流式细胞学检查

H.腹水检查

M1 022.女，50岁。2周前无明显诱因出现中上腹隐痛，皮肤巩膜黄染，小便呈浓茶样，1周前腹痛缓解，皮肤黄染减退，无皮肤瘙痒。实验室检查：ALT90U/L，尿胆红素(+)。该患者最可能的疾病与胰头癌的鉴别诊断要点是**参考答案：A**

A.黄疸有无波动

B.血清淀粉酶改变

C.皮肤有无瘙痒

D.尿胆红素阳性

E.肝功能改变

G.小便浓茶样

H.腹痛部位

I.皮肤有无黄染

M1 023.女，20岁。发热、咳嗽、咳脓痰3天查体：T38.6°C，左肺中下野可闻及湿啰音，呼吸音减弱。胸部X线片示左肺中下野大片状致密阴影，内有液气平面。1周前患者曾过量服用安定后昏迷，经洗胃等救治后意识清晰。最可能的诊断是**参考答案：A**

A急性肺脓肿

B.肺结核

C.军团菌肺炎

D.金黄色葡萄球菌肺炎

E.肺炎克雷伯菌肺炎

F.铜绿假单胞杆菌肺炎

G.支气管扩张

H.急性肺水肿

M1 024.男，60岁。反复咳嗽12年，活动后气促5个月。咳嗽于每年冬春季发作，每次持续2~3个月，经抗感染治疗可好转。吸烟40余年，约20支/日。查体：双肺呼吸音低，右下肺可闻及少量细湿啰音。胸部X线片示双肺纹理增多肺功能检查残气量增高，FEV₁/FVC 0.55，最可能的诊断是**参考答案：D**

- A.特发性肺纤维化
- B.肺结核
- C.支气管哮喘
- D.慢性阻塞性肺疾病
- E.支气管扩张
- F.肺癌
- G.慢性支气管炎
- H.肺气肿

M1 025.男，30岁。反复干咳3年。间断发作，发作时口服多种抗生素无效，可自行缓解，曾行肺功能检查结果正常。近2周来再次出现咳嗽，凌晨常咳醒，不伴喘息。查体：双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音。胸部X线片未见异常。为明确诊断，首选的检查是**参考答案：A**

- A.支气管激发试验
- B.血IgE检测
- C.胸部 CT
- D.心电图
- E.动脉血气分析
- F.支气管舒张试验
- G.支原体IgM抗体
- H.超声心动图
- I.PPD试验

M1 026.男，45岁。反复腹胀、食欲缺乏、牙龈出血2年。进肉食后出现行为异常，胡言乱语12小时。既往体健，否认传染病接触史，无放射性物质接触史，饮酒史20年，每天白酒6两左右。无精神病家族史。最可能的诊断是**参考答案：A**

- A肝性脑病
- B.食物中毒
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.尿毒症
- E.急性脑血管病
- F.急性白血病

G.急性脑综合征

H.酒精中毒

M1 027.男，30岁。高处坠落伤3小时。查体：T37.8℃，P110次/分，BP80/50mmHg神志清楚，面色苍白，胸壁无明显压痛，未及骨擦感。双肺呼吸音稍粗，未闻及干湿性啰音，心率110次/分，律齐。全腹压痛，以上腹部为重，无反跳痛，腹肌稍紧张。诊断性腹腔穿刺抽出不凝固血液。最可能的诊断是**参考答案：B**

A.肝破裂

B.脾破裂

C.胰腺破裂

D.小肠破裂

E.胃破裂

F.十二指肠破裂

G.肾损伤

H.结肠破裂

I.肺损伤

M1 028.女，25岁。右鼻翼皮肤红肿、疼痛，中心有脓头，自行挑破、挤压、排1天后局部肿胀加重伴寒战、高热、头逐渐神志不清。查体：T:39℃，P90次/分BP100/60mmHg最可能的诊断是 **参考答案：A**

A.化脓性海绵状静脉窦炎

B.面部蜂窝织炎

C.眼眶内化脓性炎症

D.菌血症

E.面部疖

F.化脓性脑膜炎

G.脓血症

M1 029.女，25岁。乏力伴刺激性干咳咽痛、食欲不振1个月。近1周来低热，咳少量黏液痰，痰中带少量血丝。无寒战、盗汗。胸部X线片示两肺下野不规则片状浸润影。血清中支原体IgM抗体1:64阳性。治疗首选的药物种类是**参考答案：E**

A.头孢菌素类

B.青霉素类

C.氨基糖苷类

D.碳青霉烯类

E.大环内酯类

F.抗结核药物

- G.喹诺酮类
- H.四环素类
- I.磺胺类

M1 030.女, 30岁.产后高热, 体温39.3℃, 无咳嗽、咳痰。查体: 心肺无明显异常。血常规: Hb104g/L, WBC $8.9 \times 10^9/L$, N0.74.胸部X线片大致正常。静脉滴注多种抗素治疗2周无效。复查胸部X线片示: 肺弥漫分布直径约2mm的小结节影。该患者最可能的诊断是**参考答案: D**

- A.绒毛膜癌肺转移
- B.白血病肺浸润
- C.过敏性肺炎
- D.血行播散型肺结核
- E.结节病
- F.支原体肺炎
- G.原发综合征
- H.干酪性肺炎
- I.病毒性肺炎

M1 031.女, 65岁。反复咳嗽、咳痰20年, 活动后气促5年, 反复双下肢水肿6个月。1周前受凉后咳嗽、咳痰增多, 气促加重, 烦躁失眠。动脉血气分析: pH7.29, PaCO₂80mmHg, PaO₂55mmHg, BE+2.1mmol/L应考虑的酸碱失衡状态为**参考答案: D**

- A.代偿性呼吸性酸中毒
- B.代偿性呼吸性碱中毒
- C.失代偿性呼吸性碱中毒
- D.失代偿性呼吸性酸中毒
- E.失代偿性代谢性酸中毒
- F.失代偿性代谢性酸中毒合并呼吸性碱中毒
- G.失代偿性呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- H.代偿性呼吸性碱中毒合并代谢性碱中毒

M1 032.男, 40岁。持续高热8天, 伴恶心、食欲缺乏、腹泻。查体: 皮肤巩膜无黄染, 前胸部可见散在的淡红色斑丘疹, 脾肋下可触及, 质软、有压痛。实验室检查: WBC $3.2 \times 10^9/L$, N0.72, L0.25, Plt $120 \times 10^9/L$ 。ALT 108 U/L, TBIL12umol/L。最可能的诊断是**参考答案: A**

- A.伤寒
- B.细菌性痢疾
- C.肾综合征出血热
- D.流行性斑疹伤寒
- E.急性无黄疸型肝炎

- F.血小板减少性紫癜
- G.钩端螺旋体病
- H.亚急性重型肝炎
- I.霍乱

M1 033.女, 65岁。夜尿增多3年, 乏力4个月。曾服用“龙胆泻肝丸”5年。查体: BP145/90mm/Hg, 贫血貌。实验室检查: 血Hb74g/L, SCr220umol/L。尿比重1.010, 尿糖(+), 尿蛋白(+), 尿RBC2~3/HP。B超示双肾萎缩。其肾功能减退最主要的原因是

参考答案: A

- A.慢性肾小球肾炎
- B.慢性肾盂肾炎
- C.糖尿病肾病
- D.慢性间质性肾炎
- E.高血压肾损害
- F.慢性肾小管损害
- G.IGA肾病
- H.继发肾病综合征

M1 034.男, 20岁。踢球时突然一过性意识丧失, 后自行恢复。发作时无四肢抽搐和口吐白沫。超声心动图示舒张期室间隔与后壁厚度之比为1.7, SAM现象阳性。该患者意识丧失最可能的原因是**参考答案: A**

- A.肥厚型梗阻性心肌病
- B.直立性低血压
- C.癔症
- D.血管迷走性晕厥
- E.限制型心肌病
- F.扩张性心肌病
- G.癫痫发作
- H.风湿性心瓣膜病

M1 035.男, 50岁。乏力、皮肤色素沉着1年余, 感冒后出现食欲缺乏、呕吐、腹泻1天。既往: 饮酒20年, 白酒2两/日。查体: T39°C, P110次/分, BP70/40mmHg。神志淡漠, 体型偏瘦, 皮肤较黑, 掌纹、乳晕、齿龈、颊黏膜等色素沉着明显。最可能的诊断是**参考答案: B**

- A.甲状腺危象
- B.肾上腺危象
- C.黏液性水肿昏迷
- D.垂体危象

- E.肝性脑病
- F.慢性脑病综合征
- G.急性脑病综合征
- H.慢性酒精中毒

M1 036.女，30岁。误服有机磷杀虫药60mL后出现恶心、呕吐、流涎，全身湿冷，双侧瞳孔呈针尖样1小时来诊，经初步洗胃、胆碱酯酶复能药、阿托品治疗后症状缓解，但继之出现躁动，因而停用静脉阿托品。16小时后患者上述症状再次出现，呼吸心跳停止，心肺复苏抢救成功。患者心搏骤停的原因最可能是**参考答案：A**

- A.中间型综合征
- B.迟发性神经病变
- C.呼吸肌受累致呼吸、循环衰竭
- D.中毒性心肌炎
- E.阿托品减量过快
- F.恶性综合征
- G.胆碱能复能药物过量

M1 037.男，30岁。间断水肿3年，血压升高4个月。查体：BP165/95mmHg，双下肢轻度水肿。尿沉渣镜检RBC30~35/HP，尿蛋白定量1.5g/24h。SCr135umol/L，Alb 42g/L。患者降压治疗首选的药物是**参考答案：E**

- A.β受体拮抗剂
- B.α受体拮抗剂
- C.保钾利尿剂
- D.二氢吡啶类
- E.血管紧张素转换酶抑制剂
- F.血管紧张素II受体拮抗剂
- G.袢利尿剂
- H.非二氢吡啶类

M1 038.男，45岁。车祸致左枕部着地，当即意识丧失，送至附近医院途中右侧肢体间断性抽搐伴喷射状呕吐3次。查体：P56次/分，BP160/95mmHg，浅昏迷、躁动，右侧瞳孔直径约4mm，左侧2mm；对光反射：左侧存在，右侧消失；左侧肌力3级，右侧肌力5级；左枕部头皮血肿，颈项强直。最主要的诊断是**参考答案：C**

- A.右额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- B.左额广泛脑挫裂伤伴左小脑幕切迹疝
- C.右额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝
- D.左额急性硬脑膜下血肿伴右小脑幕切迹疝

- E.左额急性硬脑膜下血肿伴左小脑幕切迹疝
- F.右额急性硬脑膜下血肿伴枕骨大孔疝
- G.左额急性硬脑膜下血肿伴枕骨大孔疝
- H.右额急性硬脑膜外血肿伴右小脑幕切迹疝
- I.左额急性硬脑膜外血肿伴右小脑幕切迹疝

M1 039.女，45岁。车祸中头部受伤后出现短暂昏迷。1.5小时后剧烈头痛，频繁呕吐。急诊查体：神志清楚，双侧瞳孔大小多变对光反射迟钝，肢体活动正常。行头颅CT检查过程中，发生呼吸骤停。其呼吸骤停最可能的原因是**参考答案：C**

- A.脑挫裂伤
- B.急性颅内血肿并发小脑幕切迹疝
- C.急性颅后窝血肿并发枕骨大孔疝
- D.脑干损伤
- E.脑震荡
- F.蛛网膜下腔出血
- G.颅底骨折
- H.急性脑内血肿

M1 040.男，31岁。2天前突发胸背部痛，继而下肢无力，麻木，排尿困难，无视物模糊、饮水呛咳、吞咽困难。起病前1周有上呼吸道感染史。既往史无特殊。查体：神清语利。脑神经检查未见异常。双上肢肌力5级，肌张力正常。双下肢肌力2级，肌张力低，腱反射未引出，病理征阴性。T4以下针刺觉减退。最可能的诊断是**参考答案：D**

- A.周期性瘫痪
- B.多发性肌炎
- C.重症肌无力
- D.急性脊髓炎
- E.吉兰-巴雷综合征
- F.低钾血症
- G.脊髓压迫症
- H.多发性神经病
- I.亚急性坏死性脊髓炎

M1 041.男，65岁。突发头痛、头晕和行走困难10小时。既往有高血压和糖尿病史10年。查体：神志清，颈直抵抗，对答尚清晰，双眼可见眼震，瞳孔等大，对光反射存在，无明确面舌瘫和肢体瘫痪，听力正常，腱反射对称，无深浅反射异常，未引出病理征，行走步基宽大不稳，直线行走不能，该患者的最可能的诊断是**参考答案：C**

- A.延髓出血破入脑室
- B.丘脑出血破入脑室
- C.小脑出血破入脑室
- D.原发性脑室出血
- E.脑桥出血破入脑室
- F.蛛网膜下腔出血
- G.内囊出血破入脑室
- H.脑叶出血破入脑室
- I.基底节出血破入脑室

M1 042.男，71岁。进行性右手震颤、动作迟缓3年，翻身困难1年。查体：面具脸，右手静止性震颤、四肢肌张力增高，行走缓慢，有前列腺增生、轻度肾功能不全和房颤病史。对该患者最恰当的治疗药物是**参考答案：A**

- A.复方左旋多巴
- B.金刚烷胺
- C.溴隐亭
- D.司来吉兰
- E.苯海索
- F.卡比多巴
- G.左旋多巴
- H.恩卡他朋
- I.普拉克索

M1 043.男，35岁。食欲缺乏、腹胀2个月。查体：浅表淋巴结未触及，巩膜无黄染，肝肋下未触及，脾肋下8.5cm，质硬。化验血常规：Hb100g/L，WBC $6.7 \times 10^9/L$ ，原始细胞0.02，早幼粒细胞0.02，中幼粒细胞0.08，分叶核粒细胞0.37，L0.04，M0.01，PLT $543 \times 10^9/L$ 。该患者最可能的诊断是**参考答案：D**

- A.急性早幼粒细胞白血病
- B.巨幼细胞贫血
- C.骨髓纤维化
- D.慢性粒细胞白血病
- E.慢性淋巴细胞白血病
- F.急性粒细胞白血病
- G.再生障碍性贫血
- H.急性红细胞白血病
- I.急性未分化型白血病

M1 044.女, 31岁。甲状腺次全切除术后6小时, 觉憋气, 烦躁, 迅速加重。查体: P110次/分, BP120/90mmHg, 神志清楚, 颈部肿胀, 口唇发绀, 无声音嘶哑。呼吸急促, 双肺呼吸音粗, 未闻及啰音。此时应给予的紧急处理措施是**参考答案: B**

- A.立即面罩高流量吸氧
- B.开放伤口, 据情况行气管切开
- C.立即注射呼吸兴奋剂
- D.保持引流管通畅
- E.半坐位, 充分吸痰
- F.立即气管插管
- G.环甲膜穿刺术

M1 045.男, 35岁。牙龈出血、皮肤瘀斑, 间断鼻出血10天, 既往体健。血常规: Hb64g/L, WBC $10.5 \times 10^9/L$, PLT $26 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞学检查: 增生明显活跃, 胞浆中较多颗粒且MPO染色强阳性的细胞占0.65, 其中有的可见成堆Auer小体, 若进行流式细胞术检查, 此种细胞最可能的细胞免疫学表型是**参考答案: E**

- A.CD14阳性、HLA-DR阳性
- B.CD41阳性、HLA-DR阳性
- C.CD10阳性、CD19阳性
- D.CD13阳性、HLA-DR阳性
- E.CD33阳性、HLA-DR阴性
- F.CD34阳性、HLA-DR阴性
- G. CD33阴性、HLA-DR阴性
- H. CD10阴性、CD19阳性

M1 046.女, 28岁。40分钟前至2楼阳台上跌下, 枕部着地, 伤后即昏迷。入院时查体: P50次/分, BP140/90mmHg。深度昏迷, 双侧瞳孔直径5mm。对光反射迟钝, 四肢强直, 双侧Babinski征阳性。在急诊科静脉输入20%甘露醇250mL后。进一步有效的检查是**参考答案: E**

- A.脑电图
- B.头颅ECT
- C.头颅X线片
- D.头颅MRI
- E.头颅CT
- F.脑血管造影
- G.腰椎穿刺
- H.肌电图
- I.眼底镜检查

M1 047.女，23岁。1个月前分娩后出现失眠、心情烦躁。近2周加重，认为自己很笨，没有能力带好小孩，怕小孩夭折，觉得丈夫不再爱自己了，猜疑丈夫有外遇，整日以泪洗面，称不想活了，甚至要带孩子一起去死，遂入院治疗。经治疗后，病情逐渐好转，近1周显兴奋、容易激动，好管闲事，自我感觉良好，称将来要称为中国女首富，丈夫根本配不上自己。目前患者采取的有效治疗方案是**参考答案：D**

- A.非典型抗精神病药+抗抑郁药物
- B.抗抑郁药物+苯二氮卓类
- C.电抽搐治疗+抗抑郁药物
- D.心境稳定剂+非典型抗精神病药
- E.心境稳定剂+抗抑郁药物
- F.心境稳定剂+电抽搐治疗
- G.典型抗精神病药物+电抽搐
- H.抗躁狂药物
- I.非典型抗精神病药物+苯二氮卓类

M1 048.女，17岁。因学习压力大，成绩下降，近一个月每天上学至校门口时感到紧张、害怕，发生喷射性呕吐，将早餐尽数呕吐出，消化科检查未发现异常，体重无明显下降，请病假在家时从不呕吐，进食亦无异常。该患者最可能的诊断是**参考答案：C**

- A.应激相关障碍
- B.神经性呕吐
- C.特定恐惧症
- D.社交恐惧症
- E.惊恐障碍
- F.神经性厌食症
- G.神经性贪食症
- H.双相障碍
- I.分离（转换）障碍

M1 049.女，28岁。频繁发作右下颌区剧烈疼痛3个月。成闪电样，刀割样痛，洗脸刷牙讲话均可诱发。听力正常，面部无麻刺感，张口无困难，查体：颞颌关节无明显压痛。神经系统未见明显阳性体征。最可能的诊断是**参考答案：C**

- A.牙周炎
- B.舌咽神经痛
- C.三叉神经痛
- D.腮腺炎
- E.颞颌关节紊乱
- F.面神经痛

G.舌下神经痛

H.牙髓炎

M1 050.女，45岁。急性白血病接受化疗的过程中诉食欲差、疲乏无力，有时恶心。查体： $T37^{\circ}\text{C}$ ， $P90$ 次/分， $R18$ 次/分， $BP110/70\text{mmHg}$ 。血常规： $\text{HB}90\text{g/L}$ ， $\text{RBC}3.1\times 10^{12}/\text{L}$ ， $\text{WBC}5.6\times 10^9/\text{L}$ ， $\text{PLT}65\times 10^9/\text{L}$ 。患者要求输血。此时正确地处理措施是**参考答案：B**

A.输注机采血小板

B.不予输血并向患者说明理由

C.输注血浆200mL

D.输注全血1单位

E.输注悬浮红细胞1单位

F.输注人血白蛋白

G.输注冷沉淀

H.输注浓缩红细胞

I.输注去白红细胞