

护士资格 7 月 23 日上午场考题：

1、下列不属于护理伦理的基本原则的是

- A.行善原则
- B.自主原则
- C.公平原则**
- D.公正原则
- E.不伤害原则

解析:护理伦理基本原则包括自主原则、不伤害原则、公正原则、行善原则等。

2、患者：“我每天都要喝一点酒。”护士：“请问您每天具体喝多少？”护士使用的沟通技巧是

- A.重述
- B.倾听
- C.澄清**
- D.反映
- E.反馈

解析:澄清:护士根据自己的理解,将患者一些模棱两可、含糊不清或不完整的陈述描述清楚,与患者进行核实,从而确保信息的准确性。患者对护士所说的“喝一点酒”,患者说的话模糊不清,护士与患者再次核实,从而确保护士接收到信息的准确性,属于澄清。

3、某医院护士在执行氯化钾给药医嘱时,将静脉滴注看错为静脉推注,结果为患者静脉推注氯化钾 10ml 后,患者死亡。该医疗事故等级为

- A.一级医疗事故**
- B.二级医疗事故
- C.三级医疗事故
- D.四级医疗事故
- E.严重护理差错

解析:一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的。题解析:一级医疗事故:造成患者死亡、重度残疾的。题干患者静脉推注氯化钾 10ml 后,患者死亡,故属于一级医疗事故。

4、患者女性,56 岁,近日来出现咳嗽、打喷嚏时不自主排尿现象,这种现象称为

- A.压力性尿失禁**
- B.反射性尿失禁
- C.急迫性尿失禁
- D.功能性尿失禁
- E.部分尿失禁

解析:压力性尿失禁:病人平时尚能控制排尿,但当腹内压突然增高(如咳嗽、喷嚏、大笑、举重等)时,使膀胱内压超过尿道阻力,少量尿液不自主地由尿道口溢出。患者出现咳嗽、打喷嚏时不自主排尿现象,属于压出。患者出现咳嗽、打喷嚏时不自主排尿现象,属于压力性尿失禁。

5、尖锐湿疣的产妇，最合适的分娩方式为

- A.钳产术阴道分娩
- B.无痛分娩
- C.阴道分娩
- D.阴道助产

**E.剖宫产术**

解析:尖锐湿疣孕妇，若病灶局限于外阴部，病人可经阴道分娩。若病灶广泛，易发生软产道裂伤引起大出血或巨大病灶堵塞软产道时，应行剖宫产术结束分娩。

6、尸斑开始出现的时间是死亡后

- A.2~4 小时**
- B.4~6 小时
- C.7~8 小时
- D.6~12 小时
- E.24 小时以上

解析:一般尸斑出现的时间是死亡后 2~4 小时，最易发生于尸体的最低部位。

7、婴儿发生气道异物梗阻时，正确的急救方法是

- A.卧位颈部挤压法
- B.卧位腹部冲击法
- C.立位胸部冲击法
- D.立位腹部冲击法

**E.俯卧背部叩击法**

解析:对于 1 岁以内气道异物的婴儿，可采用冲胸法。施救者取坐位，前臂放置上，将患儿骑跨并俯卧于施救者的前臂上，头低于躯干，施救者手指张开托住患儿下颌并固定其头部，用另一只手的掌根部在婴儿背部肩胛区用力叩击 5 次。

8、热射病伴休克患者，降温方式是

- A.冰盐水灌肠
- B.4℃生理盐水静脉推注
- C.动脉快速推注适量 4℃5%葡萄糖盐水**
- D.10%水合氯醛 10~20ml 保留灌肠
- E.冰肥皂水

解析:中暑高热伴休克时降温措施可采取动脉快速推注适量 4℃5%葡萄糖盐水。

9、口腔有铜绿假单胞菌感染的患者应选用的漱口液是

- A.0.02%呋喃西林溶液
- B.1%~3%过氧化氢
- C.2%~3%硼酸溶液
- D.0.1%醋酸溶液
- E.1%~4%碳酸氢钠

解析:0.1%醋酸溶液:用于铜绿假单胞菌感染时。口腔 pH 偏碱性时适用。

10、患者，男，67 岁，因冠心病入院，在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红

色泡沫样痰。此时护士应为患者采取的卧位是

- A.去枕仰卧位
- B.左侧卧位
- C.端坐位，两腿下垂
- D.休克卧位
- E.头低足高位

解析:急性肺水肿临床表现:在输液过程中，病人突然出现呼吸困难，感到胸闷、气促，咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，严重时痰液可由口鼻涌出肺部可闻及湿啰音，心率快、心律不齐。题干患者在静脉输液过程中出现胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫样痰，考虑为急性肺水肿。应协助病人取端坐位，两腿下垂，以减少下肢静脉血回流，减轻心脏负担。



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM