

2022年中医医师资格执业押题

第二单元

A1型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 肝硬化患者出现肝掌、蜘蛛痣、男性乳房发育的主要原因是
 - 门脉高压
 - 低蛋白血症
 - 肝功能不全
 - 肾上腺皮质功能减退
 - 垂体性腺功能紊乱
 - 下列除哪项外,都应按重症胰腺炎处置
 - Cullen 征
 - 持续性中上腹痛
 - 血、尿淀粉酶突然下降
 - 有高淀粉酶活性的腹水
 - 皮肤呈斑点状
 - 周围型肺癌最常见的组织学类型是
 - 鳞状上皮细胞癌
 - 小细胞癌
 - 类癌
 - 腺癌
 - 大细胞未分化癌
 - 抢救肺炎链球菌肺炎合并感染性休克的重要措施是
 - 监测生命体征
 - 补充血容量
 - 纠正代谢性酸中毒
 - 应用糖皮质激素
 - 应用血管活性药物
 - Graham-Steel杂音常见于
 - 二尖瓣关闭不全
 - 三尖瓣关闭不全
 - 二尖瓣狭窄
 - 主动脉瓣关闭不全
 - 肺动脉瓣狭窄
 - 根据高血压分级标准,血压为166/92mmHg,属于
 - 正常高值
 - 1级高血压
 - 2级高血压
 - 3级高血压
 - 单纯收缩期高血压
 - 尿路感染最常见的致病菌为
 - 大肠埃希菌
 - 变形杆菌
 - 克雷白杆菌
 - 粪链球菌
 - 葡萄球菌
 - 慢性肾衰竭的透析指征,错误的是
 - 血尿素氮 28.6mmol/L
 - 血钾>6mmol/L
 - 尿毒症心包炎
 - 血肌酐 675 μmol/L
 - 并发贫血,红细胞压积低于15%
 - 以下不符合慢性髓细胞白血病实验室检查的是
 - 白细胞计数 $201 \times 10^9/L$
 - 骨髓增生明显活跃
 - NAP呈强阳性
 - 出现Ph染色体
 - 早期红细胞和血小板均正常
- 如有问题添加: j y j q q 6 6 6
- 治疗非重型再障首选的药物是
 - 达那唑
 - 吲哚美辛
 - 甲泼尼龙
 - 秋水仙碱
 - 环孢素
 - 甲状腺功能TSH升高,血FT3、FT4降低,可能的诊断是
 - 甲状腺功能亢进症
 - 甲状腺功能减退症
 - 呆小症

- D. 血脂紊乱
- E. 甲状腺癌

12. 2型糖尿病患者以餐后高血糖为主,应首先选用的药物是

- A. 格列本脲
- B. 二甲双胍
- C. 罗格列酮
- D. 格列齐特
- E. 阿卡波糖

13. 以下不属于有助于系统性红斑狼疮诊断的是

- A. ANA 阳性
- B. 抗 Sm抗体阳性
- C. dsDNA阳性
- D. 血清补体C3水平升高
- E. 血清补体C4水平下降

14. 引起原发性脑出血最常见的原因是

- A. 脑血管畸形
- B. 高血压性动脉硬化
- C. 血液病
- D. 脑动脉炎
- E. 颅内动脉瘤

15. 脑出血患者出现典型三偏征伴同向偏视,最可能的出血部位是

- A. 壳核出血
- B. 丘脑出血
- C. 脑桥出血
- D. 小脑出血
- E. 脑叶出血

16. 下列各项中,哪项是有机磷农药中毒的发病机制

- A. 乙酰胆碱活性降低,胆碱酯酶积聚
- B. 胆碱酯酶活性降低,乙酰胆碱积聚
- C. 胆碱酯酶活性增高,乙酰胆碱减少
- D. 乙酰胆碱被水解为胆碱及乙酸
- E. 胆碱酯酶不被磷酸化

17. 不属于肝细胞性黄疸的特点是

- A. 尿胆红素阳性
- B. 尿胆原常增多
- C. 血清结合型、非结合型胆红素均增高
- D. 血清仅结合型胆红素增高
- E. 大便颜色正常或变深

如有问题添加: jyj qq666

18. 一严重脑出血病人,急性期间出现呕吐咖啡色胃内容物,应考虑

- A. 急性胃炎
- B. 既往有消化性溃疡

- C. 既往有肝硬化
- D. 应激性溃疡

E. 伴发急性胆囊炎

19. 肠鸣音亢进,呈金属音者见于

- A. 急性肠炎
- B. 消化道出血
- C. 机械性肠梗阻
- D. 麻痹性肠梗阻
- E. 急性胃炎

20. 下列选项中,除哪项均可出现P2增强

- A. 肺心病
- B. 动脉导管未闭
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 左心衰竭
- E. 二尖瓣狭窄

21. 鼻梁塌陷而致鼻外形似马鞍状见于

- A. 鼻中隔偏曲
- B. 肥大鼻息肉
- C. 鼻窦炎
- D. 先天性梅毒
- E. 红斑狼疮

关注胖大海医考,获取更多医考资料

22. 正常人支气管肺泡呼吸音不应该出现在

- A. 胸骨角附近
- B. 胸骨上窝
- C. 肩胛间区的第3胸椎水平
- D. 右肺尖
- E. 肩胛间区的第4胸椎水平

23. 胃肠道穿孔应采用的检查方法是

- A. 卧位腹平片
- B. 立位腹平片
- C. 卧位腹透
- D. 盆腔像
- E. 全消化道造影

24. 下列描述为右上肺中心型肺癌的典型X线的是

- A. 两上肺锁骨下区的片状阴影
- B. 左心缘影呈直线状斜向外下方
- C. 肺门肿块和右肺上叶不张连在一起形成横行"S"状的下缘
- D. 肺内有多发的薄壁空洞
- E. 肺内有多发的肿块影

25. 下列关于左心室肥大的心电图的说法,错误的是

- A. $Rv5$ 或 $Rv6 > 2.5mV$
- B. $Rv5$ 或 $Rv6 + Sv1 > 4.0mV$ (男)
- C. 心电轴左偏

- D. 以R波为主的导联中, S-T段下移 0.05mV
E. T波高尖
26. CK-MB在急性心肌梗死(AMI) 发生后多久开始升高
- A. 4~10小时
B. 12~36小时
C. 3~8小时
D. 9~30小时
E. 3~6小时

关注胖大海医考, 不定时直播课

27. 中性粒细胞核左移不见于
- A. 急性大出血
B. 急性溶血反应
C. 感染
D. 一氧化碳中毒
E. 恶性贫血
28. 急性型再障患者的骨髓增生程度是
- A. 极度活跃
B. 明显活跃
C. 活跃
D. 减低
E. 极度减低
29. 脊柱前凸多见于
- A. 脊髓灰质炎
B. 强直性脊柱炎
C. 脊柱结核
D. 佝偻病
E. 髋关节结核
30. 下列哪项不会出现肺下界上移
- A. 膈肌麻痹
B. 腹腔积液
C. 腹内压升高
D. 肺不张
E. 肺气肿
31. 落日现象可见于
- A. 小颅
B. 尖颅
C. 方颅
D. 巨颅
E. 长颅
32. 胃肠病变时常用的触诊方法是
- A. 浅部触诊法
B. 深部滑行触诊法
C. 双手触诊法
D. 深压触诊法
E. 冲击触诊法

33. 遗传病史属于
- A. 现病史
B. 既往史
C. 个人史
D. 婚姻史
E. 家族史
34. 在诊断中排在第三位的应是
- A. 主要疾病
B. 曾患过的疾病
C. 家族主要成员所患的疾病
D. 并发症
E. 伴发病
35. 下列选项中, 属于呼气性呼吸困难的是
- A. 急性喉炎
B. 支气管哮喘
C. 气管异物
D. 支气管肿瘤
E. 大面积肺不张
36. 先出现意识障碍, 后出现发热常见于
- A. 流脑
B. 伤寒
C. 流行性出血热
D. 脑出血
E. 休克型肺炎
37. 病侧呼吸动度减弱伴叩诊为鼓音、呼吸音消失者, 见于
- A. 肺实变
B. 肺气肿
C. 肺不张
D. 气胸
E. 胸膜增厚
38. 肠套叠可见腹痛, 并伴有
- A. 急性发热
B. 黄疸
C. 呕吐
D. 腹泻
E. 血便
39. 黏液脓血便, 多见于
- A. 阿米巴痢疾
B. 细菌性痢疾
C. 急性胃肠炎
D. 疟疾
E. 霍乱
40. 对于过敏性鼻炎患者, 增高的是

- A. IgG
- B. IgA
- C. IgM
- D. IgD
- E. IgE

41. 下列发疹性传染病按皮疹出现的先后次序排列, 依次为

- A. 猩红热、天花、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- B. 猩红热、风疹、水痘、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- C. 天花、水痘、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- D. 水痘、猩红热、天花、麻疹、斑疹伤寒、伤寒
- E. 水痘、天花、猩红热、麻疹、斑疹伤寒、伤寒

42. 甲型肝炎和戊型肝炎共有的主要传播途径是

- A. 粪-口传播
- B. 母婴传播
- C. 血液传播
- D. 体液传播
- E. 性传播

43. 传染(感染) 的含义是指

- A. 病原体侵入人体的结果
- B. 病原体侵入人体及环境因素
- C. 病原微生物借助传播媒介作用于人体
- D. 宿主对病原微生物缺乏防御能力
- E. 病原体与人或动物机体相互作用与斗争的过程

44. 病原体侵入人体后, 引起机体发生免疫应答, 同时通过病原体本身的作用或机体的变态反应, 导致组织损伤, 引起病理改变与临床表现, 此种情况是

- A. 隐性感染
- B. 显性感染
- C. 重复感染
- D. 潜伏感染
- E. 机会性感染

45. 流行性出血热的"三痛"是指

- A. 头痛、腰痛和身痛
- B. 头痛、腰痛和关节痛
- C. 头痛、腰痛和腓肠肌痛
- D. 头痛、腰痛和眼眶痛
- E. 头痛、腰痛和腹痛

46. 关于志贺菌属, 下列哪项说法是正确的

- A. 为革兰阴性杆菌, 有鞭毛
- B. 对化学消毒剂不敏感
- C. 在外界生存时间甚短期
- D. 对理化因素抵抗力强
- E. 产生外毒素和内毒素

47. 确诊伤寒的依据是

- A. 发热中毒症状, 周围白细胞减低
- B. 大便培养阳性
- C. 血培养阳性
- D. 肥达反应"H" "O" 滴度增高
- E. 嗜酸性粒细胞减少

48. HIV主要感染的细胞是

- A. 单核巨噬细胞
- B. 小神经胶质细胞
- C. 骨髓干细胞
- D. B细胞
- E. CD4+淋巴细胞

49. 艾滋病患者在艾滋病期常见的呼吸系统并发症为

- A. 巨细胞病毒引起的病毒性肺炎
- B. 肺炎链球菌肺炎
- C. 卡氏肺孢子菌肺炎
- D. 葡萄球菌肺炎
- E. 念珠菌引起的肺真菌病

50. 流行性乙型脑炎病变最严重的区域通常是

- A. 大脑皮质
- B. 脊髓
- C. 脑桥
- D. 小脑
- E. 延髓

51. 下列关于人禽流感病理改变的叙述, 错误的是

- A. 肺部病变最明显
- B. 肺泡内无透明膜形成
- C. 少数患者有广泛肝小叶中心坏死
- D. 少数患者有急性肾小管坏死
- E. 少数患者有淋巴细胞功能衰竭

52. 暴发型流脑的临床特点是

- A. 高热、出血、肾损害
- B. 高热、惊厥、休克、呼吸衰竭
- C. 心悸、气促、相对缓脉
- D. 高热、瘀斑、休克、呼吸衰竭
- E. 高热、皮疹、脾大

53. 下列关于布鲁菌病的说法不正确的是

- A. 主要传染源是牛、猪、羊
- B. 病理变化广泛, 其中以骨骼肌肉系统最常见
- C. 急性感染症状包括发热、多汗、乏力、肌肉和关节疼痛等
- D. 成人患病治疗首选多西环素联合利福平
- E. 免疫学检查包括平板凝集试验、试管凝集试验等

54. 下列哪项不是中毒型菌痢的临床特征

- A. 急性高热, 反复惊厥, 昏迷

- B. 腹痛、腹泻明显
C. 迅速发生休克,呼吸衰竭
D. 大便常规检查发现大量白细胞
E. 脑脊液检查正常
55. 下列流感实验室检查结果,不符合单纯型流感的是
A. 白细胞总数减少
B. 中性粒细胞数减少
C. 淋巴细胞数相对增加
D. 血小板减少
E. 单核细胞数正常
56. 患者被家狗咬伤,担心患狂犬病,以下不属于发病影响因素的是
A. 咬伤部位
B. 咬伤的严重性
C. 局部处理情况
D. 是否及时、全程、足量注射狂犬病疫苗和免疫球蛋白
E. 既往是否曾被咬伤
- 关注胖大海医考,获取更多医考资讯
57. 《素问·阴阳应象大论》说: "壮火之气衰,少火之气壮",其中"壮火""少火"的本义是
A. 药食气味纯阳与温和之别
B. 人体阳气亢盛与平和之别
C. 病理之火与生理之火的区别
D. 邪火与正气之别
E. 相火与君火之别
58. 据《素问·评热病论》,下列除哪项外,均为"劳风"的症状
A. 头项强急不舒
B. 唾出若涕
C. 目眩不明
D. 腰脊强痛
E. 恶风而振寒
59. 《素问·至真要大论》认为"皆属于火"的病证为
A. 诸病有声,鼓之如鼓
B. 诸痛痒疮
C. 诸胀腹大
D. 诸转反戾,水液浑浊
E. 诸病肘肿,疼酸惊骇
60. 《素问·痿论》关于痿证的治疗原则,下列哪一项除外
A. 独取阳明
B. 补其荣
C. 通其俞
D. 补益五脏
E. 因时制宜

61. 小结胸病的主脉是
A. 浮数
B. 浮缓
C. 浮大
D. 浮滑
E. 浮而动数
62. 生姜泻心汤证的病机是
A. 邪热聚结心下,气机阻滞,兼阳虚不固
B. 误下损伤脾胃,寒热错杂于中,升降失常
C. 脾胃不和,寒热错杂,水饮食滞
D. 脾胃重虚,寒热错杂,水谷不化
E. 胃虚痰阻,胃气不和,虚气上逆
63. 关于通脉四逆汤的加减法,下列哪项论述是错误的
A. 面色赤加葱九茎
B. 腹中痛,去甘草加芍药二两
C. 呕者加生姜二两
D. 咽痛者去芍药加桔梗一两
E. 利止脉不出者去桔梗加人参二两
64. 原文"自利不渴者,属太阴,以其脏有寒故也....."中,不渴是因为
A. 脾虚失运,寒湿弥漫
B. 太阴虚寒,里有寒饮
C. 里无热邪,津液未伤
D. 脾肾阳虚,水湿内生
E. 下利后饮水过多
65. 百合病的病位在
A. 心
B. 胸膈
C. 心肺
D. 心肾
E. 肺肾
66. 桂枝加龙骨牡蛎汤证的病机是
A. 阴阳两虚
B. 肝肾阴虚
C. 心肾阳虚
D. 心脾气虚
E. 心肺气虚
67. 关于厚朴七物汤证的临床表现,以下哪项不是
A. 下利
B. 腹满
C. 发热
D. 脉浮数
E. 饮食如故
68. "诸有水者,腰以下肿,当利小便,腰以上肿,当发汗乃愈",出自《金匱要略》哪一篇

中医医师资格笔试各单元考试科目及分值

中医执业医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基35、中诊35、中药35、方剂35、法规10
第二单元	西内50、西诊40、传染30、伦理10、中医经典20
第三单元	中内90、针灸60
第四单元	中外50、中妇50、中儿50

中医助理医师资格考试内容(仅供参考)

第一单元	中基20、中诊20、中药20、方剂20、 西内25、西诊20、传染15、伦理5、法规5
第二单元	中内45、针灸30、中外25、中妇25、中儿25

- A. 《水气病脉证并治》
 B. 《痰饮咳嗽病脉证并治》
 C. 《消渴小便不利淋病脉证并治》
 D. 《黄疸病脉证并治》
 E. 《呕吐啰下利病脉证治》
69. 《温热论》中提到“湿与温合”的情况,以下哪项不是其病机变化
 A. 湿郁热蒸
 B. 清窍为之壅塞
 C. 水主之气不能上荣
 D. 蒙蔽于上
 E. 浊邪害清
70. 关于其邪始终在气分流连的治疗,以下哪项不确切
 A. 可冀其战汗透邪
 B. 法宜甘温益胃
 C. 疏瀹枢机,灌溉汤水,使邪气松达,与汗偕行
 D. 汗后宜身凉脉静
 E. 更有邪盛正虚,不能一战而解,停一二日再战汗而愈者
71. 温病战汗后,若出现气脱,叶氏认为临床表现是
 A. 汗出肤冷,倦卧不语,脉虚和缓
 B. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉弦而数
 C. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉象急疾
 D. 肤冷汗出,躁扰不卧,脉虚而细
 E. 汗出肤冷,倦卧不语,脉象细数
72. 违背了不伤害原则的是
 A. 用无可辩驳的语气证明,临床死亡即将来临且病人痛苦时,允许病人死亡
 B. 糖尿病人腿部有严重溃疡,有发生败血症的危险,予以截肢
 C. 在化疗中,导致造血和免疫系统不良影响
 D. 对病人的呼叫或提问置之不理

A2型题

78. 患者,男性,24岁,上腹部隐痛,腹胀,食欲减退,消瘦,乏力已有半年余.胃镜检查:胃体前壁黏膜斑块样充血,红白相间,以红为主,较多黏液.活检后病理检查:有淋巴细胞、浆细胞浸润及肠上皮化生,应考虑诊断为

E. 病人要求撤消或终止治疗而允许病人死亡
 73. 下列医患关系中,属于技术内容的是

- A. 医务人员对病人良好的服务态度
 B. 医务人员对病人高度的责任心
 C. 医务人员对病人的同情和尊重
 D. 医务人员以精湛的医术为病人服务
 E. 病人对医务人员的尊重

74. 下列不属于医德品质内容的是

- A. 仁爱
 B. 诚挚
 C. 严谨
 D. 公正
 E. 专业

75. 分工明确、相互依赖是现代医疗活动的鲜明特点,体现的道德原则是

- A. 互相尊重
 B. 互相爱护
 C. 互相支持
 D. 互相监督
 E. 互相学习

76. 下列属于现代医学目的的是

- A. 重治疗轻预防
 B. 提高生命质量
 C. 过度追求技术发展
 D. 克服疾病
 E. 避免死亡

77. 下列不是辅助检查应遵循的道德要求的是

- A. 目的明确,诊治需要.
 B. 知情同意,尽职尽责.
 C. 综合分析,切忌片面.
 D. 密切联系,加强协作.
 E. 全面系统,认真细致.

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- A. 慢性萎缩性胃炎
 B. 慢性非萎缩性胃炎
 C. 糜烂性胃炎
 D. 肥厚性胃炎
 E. 消化性溃疡

79. 患者,男,48岁.慢性咳嗽、咳痰多年,既往临床诊断为慢性阻塞性肺疾病,有哮喘的家族史,为明确诊断,应完善的检查是

- A. 肺功能
- B. 胸部X线
- C. 过敏原测定
- D. 胸部CT
- E. 血气分析

80. 患者,女,31岁.心悸、气促1年.查体: 两颊暗红,颈静脉明显怒张,下肢浮肿,心浊音界向左扩大,心区可闻及舒张期隆隆样杂音,肝右肋下 4cm,质软,有压痛,肝颈静脉回流征阳性.应首先考虑的是

- A. 二尖瓣狭窄并发右心衰竭
- B. 二尖瓣关闭不全后期所致右心衰竭
- C. 主动脉瓣狭窄并发左心衰竭
- D. 主动脉瓣关闭不全并发左心衰竭
- E. 肺源性心脏病致右心衰竭

关注胖大海医考,获取更多医考资料

81. 患者,男,39岁.乙肝病毒携带者,肝区隐痛不适,查 AFP>500 μg/L,彩超提示肝区结节影,病灶>2cm.该患者最可能的诊断是

- A. 肝脓肿
- B. 继发性肝癌
- C. 肝硬化
- D. 原发性肝癌
- E. 肝血管瘤

82. 患者,女,26岁,半年前确诊为原发免疫性血小板减少症患者,应用糖皮质激素治疗至今无效,为取得良好效果,减少复发,首选的治疗方案是

- A. 糖皮质激素联合环磷酰胺治疗
- B. 输注血小板
- C. 造血干细胞移植
- D. 脾切除
- E. 免疫抑制治疗

83. 患者,男,41岁,平素不爱运动,体型肥胖,爱吃油炸食物,经常饮酒.近日查体发现: 血液检查: 总胆固醇 6.3mmol/L,LDL 3.35mmol/L,TG1.62mmol/L,根据检查结果,患者目前首选的治疗药物为

- A. 依折麦布
- B. 阿托伐他汀
- C. 考来烯胺
- D. 普罗布考
- E. 烟酸缓释片

84. 患者,男,38岁.因双手关节对称性肿胀、疼痛3个月,经检查在当地医院诊为类风湿关节炎,则其检查

结果最不可能出现的是

- A. 轻度贫血
- B. 血小板减少
- C. 反应蛋白升高
- D. 血沉加快
- E. 类风湿因子阳性

85. 患者,男,67岁.2小时前突然出现左侧肢体乏力,吃饭时握筷子不稳,左脚走路拖步,症状逐渐加重,但意识清楚,在家入陪同下来院就诊.其最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 脑出血
- C. 癫痫
- D. 蛛网膜下腔出血
- E. 颅内占位病变

86. 患者,女,60岁,车祸后瘫痪,肢体能在床面上做水平移动,但不能抬离床面,此时的肌力分级为

- A. 1级
- B. 2级
- C. 3级
- D. 4级
- E. 5级

87. 女,25岁.大咯血急诊入院,既往有反复咳嗽,大量脓痰及咯血病史.胸片示左下肺肺纹理紊乱.诊断最可能的是

- A. 肺结核
- B. 肺炎
- C. 肺癌
- D. 支气管扩张
- E. 肺脓肿

88. 男,30岁.既往有乙型肝炎病史.近1个月来右上腹反复疼痛,查体: 肝肋下3cm,质硬,有结节感.实验检查应首选下列哪项

- A. 乙肝两对半检查
- B. 血清白蛋白
- C. 单胺氧化酶
- D. 甲胎蛋白
- E. 碱性磷酸酶

89. 女,45岁.既往有胆道结石病史,今天出现持续性明显腹痛,放射到腰背部,伴呕吐.查体: 上腹部肌紧张,明显压痛伴反跳痛,肠鸣音减弱.血AMS 3600U/L.诊断应考虑

- A. 胆石症胆道感染
- B. 急性胰腺炎
- C. 急性胃炎

- D. 急性肝炎
- E. 急性肝脓肿

90. 患者,男,50岁,心前区剧痛2小时.查体: 血压120/80mmHg,端坐呼吸,两肺中下肺野可闻及细湿啰音,心率120次/分,律齐,S1减弱.ECG: V1~V5病理性Q波及ST段上抬.该患者的治疗过程中,不可应用的药物是

- A. 毛花苷C
- B. 吗啡
- C. 利尿剂
- D. 消心痛
- E. 多巴酚丁胺

91. 一昏迷病人,急诊入院,病史不详.查体: 神志不清,多汗,双侧瞳孔缩小,呼吸及汗液发出大蒜味.诊断应考虑

- A. 急性巴比妥类药物中毒
- B. 海洛因中毒
- C. 急性有机磷中毒
- D. 急性乙醇中毒
- E. 糖尿病酮症酸中毒

92. 患者,男,33岁.因高热就诊于某医院,经检查诊断为人感染高致病性禽流感,下列预防该病传染的处理措施中属于切断传播途径的是

- A. 加强不吃未熟的肉类和蛋类的预防知识宣传
- B. 加强密切接触禽类人员的监测
- C. 对患者进行隔离治疗
- D. 患者亲属预防性服用中药汤剂
- E. 接触患者的医务人员戴口罩、勤洗手

93. 男,28岁.有静脉注射毒品史5年,近2个月出现间歇性发热、咳嗽、伴乏力、食欲不振,体重明显下降.曾用抗生素治疗,但疗效欠佳.查: 全身淋巴结肿大,口腔见鹅口疮,肝于肋下2cm可触及,血常规: WBC $4.1 \times 10^9/L$,RBC $4.6 \times 10^{12}/L$,PLT $151.1 \times 10^9/L$,CD4+T淋巴细胞计数 $<200/\mu L$,大便真菌培养阳性.本病例最可能的诊断是

- A. 疟疾
- B. 艾滋病
- C. 败血症
- D. 结核病
- E. 伤寒

94. 患儿,男,4岁,发热、头痛2天入院,全身皮肤有散在出血点,脑脊液检查: 压力240mmHg,白细胞数 $948 \times 10^6/L$,多核0.92,单核0.08,蛋白4.5g/L,氯化物102mmol/L,糖1.5mmol/L.应考虑

- A. 病毒性脑膜炎
- B. 流行性乙型脑炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 钩体病脑膜炎

95. 患者,男,35岁.入院诊断为流行性乙型脑炎,现见高热、抽搐、呼吸衰竭,考虑其临床分期为

- A. 初期
- B. 发热期
- C. 恢复期
- D. 极期
- E. 后遗症期

96. 患儿,女,15岁.持续发热2周,入院经血培养、肥达检测确诊为"伤寒",经氧氟沙星治疗10天,体温降至正常,入院后第12天,突然出现剧烈腹痛,出冷汗.体查: 腹部压痛及反跳痛,肝浊音界消失.血常规: WBC $3.6 \times 10^9/L$,N0.85,腹部X线摄片示膈下游离气体,考虑并发"胃肠穿孔".最可能的部位是

- A. 胃、十二指肠
- B. 空肠末端
- C. 回肠末端
- D. 横结肠
- E. 升结肠

97. 患者,男,28岁.饮用污水后,突然出现剧烈腹泻,随后呕吐,由水样物转为"米泔水"样物.该患者最可能的诊断是

- A. 金葡菌胃肠炎
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 霍乱
- D. 病毒性肠炎
- E. 大肠埃希菌性肠炎

98. 患者,女,29岁.受凉后感冒,现恶寒发热3天,伴头身疼痛,无汗,喘咳,痰涎清稀量多,胸痞,舌苔白滑,脉浮,该患者的病因病机是

- A. 风寒束表,阳郁化热,表寒里热
- B. 风寒束表,水饮内停,表寒里饮
- C. 风寒犯表,营卫不和,卫闭营郁
- D. 风寒袭表,营卫不和,卫强营弱
- E. 素有郁热,复感风寒,外寒内热

99. 患者,女,60岁,年老体弱,身肿日久,腰以下为甚,按之凹陷不易恢复,脘腹胀闷,纳减便溏,面色不华,神疲乏力,四肢倦怠,小便短少,舌质淡,苔白滑,脉沉弱.据《素问·汤液醪醴论》所述,该病的治疗原则主要是

- A. 平治于权衡
- B. 缪刺其处,以复其形
- C. 微动四极
- D. 温衣
- E. 开鬼门,洁净府

100. 患者,女,28岁,产后第4天,症见脉微弱,呕不能食,大便反坚,但头汗出,眩晕头昏者,此属

- A. 痉病
- B. 郁冒
- C. 大便难
- D. 产后中风
- E. 产后胃实

101. 患者,女,42岁,现处于温病后期,症见夜晚发热,白天退热,热退后无汗出,就诊后确定热自阴来,治宜选用

- A. 加减复脉汤
- B. 三甲复脉汤
- C. 大定风珠
- D. 青蒿鳖甲汤
- E. 黄连阿胶汤

102. 患者,女,31岁,患流感3天,现身热夜甚,神烦少寐,时有谵语,目常喜开或喜闭,口渴或不渴,斑疹隐隐,脉细数,舌绛而干.治宜清营汤,患者"反不渴"是因为

- A. 邪热不甚
- B. 兼有痰邪
- C. 兼有瘀血
- D. 邪热蒸腾营阴上泛
- E. 热扰心神而不觉

A3型题

答题说明

每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案,请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

(103~105题共用题干)

患者,女,32岁.一周前受凉后感冒,表现为鼻塞、咳嗽,未予治疗,今日突发寒战、发热,咳嗽、咳痰,痰中带有血丝,遂来医院就诊.

103. 患者最可能的诊断是

- A. 肺炎链球菌肺炎
- B. 支气管哮喘
- C. 肺炎支原体肺炎
- D. 上呼吸道感染
- E. 肺结核

104. 为明确诊断,患者应进行的检查不包括

- A. 血常规
- B. 胸部X线
- C. 痰涂片
- D. 肺功能
- E. 痰培养

105. 若患者胸部X线见肺叶、肺段分布的密度均匀白影,并可于阴影中见到支气管气道征,其治疗应的抗生素为

- A. 青霉素类
- B. 头孢二代
- C. 大环内酯类
- D. 喹诺酮类
- E. 四环素类

(106~108题共用题干)

患者,男,56岁.患有慢性乙型肝炎,未定期复查.1小时前患者吃鱼后出现腹部不适,继而出现呕血,家人紧急将其送往医院,至医院时患者出现头晕、心慌、乏力等症状.

106. 考虑其出血原因为

- A. 消化性溃疡
- B. 急性糜烂出血性胃炎
- C. 食管胃底静脉曲张破裂
- D. 胃癌
- E. 消化道穿孔

107. 其失血量至少为

- A. 100ml
- B. 250ml
- C. 400 ml
- D. 800ml
- E. 1000ml

108. 此时下列治疗措施不恰当的是

- A. 卧床、禁食
- B. 立即手术治疗
- C. 内镜治疗
- D. 垂体后叶素静脉注射
- E. 气囊压迫止血

(109~111题共用题干)

患者,男,39岁,发作时先觉胃部一股气体上升,并有咀嚼、吞咽动作,喃喃自语,走动,似在找东西,呼唤无反应,持续约4分钟,既往有颅脑外伤史。

109.为明确诊断,首选的检查是

- A. 颅脑MRI
- B. 颅脑CT
- C. 脑电图
- D. 腰椎穿刺
- E. 血培养

110.明确诊断后,判断其发作属于

- A. 强直性发作
- B. 单纯部分性发作
- C. 阵挛性发作
- D. 失神发作
- E. 复杂部分性发作

11.如排除继发性因素,则其用药首选

- A. 苯妥英钠
- B. 苯巴比妥
- C. 卡马西平
- D. 丙戊酸钠
- E. 乙琥胺

(112~114题共用题干)

患者,女,43岁.保洁工作者.1年前开始出现双手腕、掌指关节肿胀、疼痛,自泡热水、涂药后未见明显改善,近3个月出现关节僵硬,晨起时明显,无面部斑疹、脱发等。

112.该患者最可能的诊断是

- A. 骨关节炎
- B. 类风湿关节炎
- C. 风湿性关节炎
- D. 系统性红斑狼疮
- E. 痛风性关节炎

113.若该患者双手X线检查提示骨损害为I期,则其表现为

- A. 近端指间关节梭形肿胀
- B. 远端指间关节畸形,关节融合
- C. 关节脱位
- D. 关节间隙变窄
- E. 关节面出现虫蚀样破坏

14.下列只能缓解症状,不能阻止该病进展的药物是

- A. 柳氮磺吡啶
- B. 青霉胺
- C. 来氟米特
- D. 布洛芬
- E. 氨甲蝶呤

(115~117题共用题干)

患者,女,43岁.月经量过多,平素自觉乏力、易倦、心悸、纳差等,伴面色苍白、心率增快.遂至医院就诊血常规示: Hb 95g/L.血清铁蛋白10ug/L,血清铁,总铁结合力升高超过65umol/L,转铁蛋白饱和度14.8%,FEP/Hb4.68ug/gHb;骨髓铁染色显示骨髓小粒可染铁消失,铁粒幼红细胞14.2%.

115.该患者最可能的诊断是

- A. 缺铁性贫血
- B. 白细胞减少症
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 急性白血病
- E. 再生障碍性贫血

116.若上述诊断正确,则与其查体情况不符的是

- A. 匙状甲
- B. 异食癖
- C. 口腔炎
- D. 脾脏中度肿大
- E. 注意力不集中

117.若上述诊断正确,其首选的治疗措施是

- A. 脾切除
- B. 注射铁剂
- C. 口服糖皮质激素
- D. 口服铁剂
- E. 输注血红蛋白

(118~120题共用题干)

男性患者,46岁,慢性肾小球肾炎病史6年,近1年来病情明显加重,出现恶心呕吐、厌食,伴头痛、意识障碍,于当地医院查肾功能示CCr 43 ml/min,实验室检查GFR53mL/(min·1.73m²),诊断为慢性肾衰竭。

118.该患者的CRF分期为

- A. 1期(肾损伤GFR正常)
- B. 2期(肾损伤 GFR轻度下降)
- C. 3期(GFR轻度到重度下降)
- D. 4期(GFR重度下降)
- E. 5期(肾衰竭)

119.该患者的蛋白摄入应控制在

- A. 0.2~0.4g/(kg.d)
- B. 0.4~0.6g/(kg.d)
- C. 0.6~0.8g/(kg.d)
- D. 0.8~1.0g/(kg.d)
- E. 1.0~1.2g/(kg.d)

120.若该患者血常规示贫血,治疗应选用的药物是

- A. 琥珀酸亚铁

- B. 叶酸及维生素B12
- C. 泼尼松

- D. 雄激素
- E. 促红细胞生成素(EPO)

B型题

答题说明

以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号相应字母所属的方框涂黑，每个备选答案可能被选择一次、多次或者不被选择。

(121~122题共用备选答案)

- A. TSH
- B. TT₃ TT₄
- C. FT₃ FT₄
- D. TPOAb TGAb
- E. TRAb

- 121. 诊断甲亢的首选指标是
- 122. 反应甲状腺功能最敏感的指标是

(123~124题共用备选答案)

- A. 深昏迷，口唇呈樱桃红色
- B. 瞳孔缩小，出汗流涎
- C. 瞳孔扩大，谵妄幻觉
- D. 深昏迷，瞳孔时大时小
- E. 昏迷伴肌纤维颤动

- 123. 阿托品中毒时常见
- 124. 一氧化碳中毒时常见

(123~124题共用备选答案)

- A. P波与QRS波毫无关系，P-P间隔与R-R间隔各有其固定规律
- B. PR间期恒定，部分P波后无QRS波群
- C. PR间期逐渐延长，直到1个P波后脱落1个QRS波群
- D. PR间期 >0.20 秒；每个P波后，均有QRS波群
- E. P波增宽 $0.12s$ ，出现双峰，切迹间距 $0.04s$

- 125. 二度I型房室传导阻滞的心电图表现是
- 126. 三度房室传导阻滞的心电图表现是

(127~128题共用备选答案)

- A. V₁-V₆
- B. V₁-V₃
- C. II III aVF
- D. V₃-V₅
- E. I aVI

- 127. 高侧壁特征性心电图改变出现在() 导联
- 128. 下壁特征性心电图改变出现在() 导联

(129~130题共用备选答案)

- A. 稽留热

- B. 弛张热
- C. 间歇热
- D. 回归热
- E. 不规则热

- 129. 斑疹伤寒所致的发热热型通常为
 - 130. 霍奇金病所致的发热热型通常为
- (131~132题共用备选答案)

- A. 咳声嘶哑
- B. 犬吠样咳嗽
- C. 无声咳嗽
- D. 鸡鸣样咳嗽
- E. 金属调咳嗽

- 131. 纵隔肿瘤的咳嗽声的特点为
 - 132. 百日咳的咳嗽声的特点为
- (133~134题共用备选答案)

- A. 痉挛性偏瘫步态
- B. 醉酒步态
- C. 慌张步态
- D. 蹒跚步态
- E. 剪刀步态

- 133. 小脑病变患者出现的步态是
 - 134. 脑瘫患者出现的步态是
- (135~136题共用备选答案)

- A. 血清尿素氮检查
- B. 血 β_2 -微球蛋白
- C. 血肌酐检查
- D. 尿 β_2 -微球蛋白
- E. 内生肌酐清除率

- 135. 肾功能检查中，反应近端肾小管重吸收功能的是
 - 136. 肾功能检查中，肾小球损伤的敏感指标是
- (137~138题共用备选答案)

- A. QRS 波群
- B. PR间期
- C. QT 间期
- D. ST段

E. P波

137. 心电图上,反映心室早期缓慢复极的波段是

138. 心电图上,心房的除极波是

(139~140题共用备选答案)

A. 干扰素

B. 利巴韦林

C. 奥司他韦

D. 拉米夫定

E. 沙奎那韦

139. 流行性出血热抗病毒治疗首选的药物是

140. 流感抗病毒治疗首选的药物是

(141~142题共用备选答案)

A. HBsAg

B. 抗-HBs

C. HBeAg

D. 抗-HBe

E. 抗-HBc

141. 感染HBV 后最早出现的血清学标志是

142. 表示病毒复制活跃的是

(143~144题共用备选答案)

A. 钩端螺旋体

B. 奈瑟菌

C. HIV

D. 汉坦病毒

E. 黄病毒

143. 引发肾综合征出血热的病原体是

144. 引发流行性脑脊髓膜炎的病原体是

(145~146题共用备选答案)

A. 传染病患者进入恢复期后,已稳定退热一段时间,潜伏于组织内的病原体再度繁殖,使发热等初发症状再度出现

B. 传染病患者在恢复期,体温未稳定下降至正常,又再度升高

C. 在感染某种病原体基础上再次感染同一病原体

D. 人体同时感染两种或两种以上的病原体

E. 传染病痊愈以后再次感染病原体发病

145. 复发是指

146. 再燃是指

(147~148题共用备选答案)

A. 严防商品化原则

B. 维护社会公益原则

C. 互盲和保密原则

D. 维护供受双方和后代利益的原则

E. 知情同意原则

147. 在人工辅助生殖技术中,医疗机构与医务人员对捐赠者和受者的有关信息保密,体现了

148. 供精、供卵、供胚胎应以捐赠助人为目的,禁止买卖。这体现了人工辅助生殖技术中的

(149~150题共用备选答案)

A. 尊重患者原则

B. 生命价值原则

C. 知情同意原则

D. 保密原则

E. 最优化原则

149. 临床诊疗的道德原则中,最普通、最基本的治疗原则是

150. 临床诊疗的道德原则中,医疗行为原则的重要伦理依据是

