



# 口腔执业（助理）医师资格考试

JINYINGJIE.COM



## 口外 100 测试题

金英杰口腔直播教研组 编

JINYINGJIE.COM

- 1、利用电热或红外线烤箱高热烘烤进行灭菌的方法属于
  - A、煮沸消毒法
  - B、化学消毒法
  - C、干热灭菌法
  - D、医用酒精消毒法
  - E、高压蒸汽灭菌
- 2、关于锐性分离的说法错误的是
  - A、用于精细的层次解剖或分离粘连坚实的瘢痕组织
  - B、使用的器械为锐性的手术刀和手术剪
  - C、此法对组织损伤小
  - D、动作要求细巧、准确
  - E、可在盲视下进行
- 3、脓肿或无效腔的引流物的去除应在
  - A、手术后 24~48 小时
  - B、放置 24 小时后
  - C、24 小时内去除引流物
  - D、一般在 24 小时内引流量少于 20~30ml 时去除
  - E、渗出液完全消除为止
- 4、换药时应用棉球清洁的正确动作是
  - A、揩
  - B、擦
  - C、蘸
  - D、涂
  - E、蹭
- 5、缝合的创口，一般在 7~10 天内全部愈合者，称为
  - A、一期愈合
  - B、二期愈合
  - C、感染创口
  - D、无菌创口
  - E、延期愈合
- 6、淋巴结检查的正确顺序应是
  - A、枕部、耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下
  - B、腮腺、颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前
  - C、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺、颊
  - D、耳后、耳前、腮腺、颊、颌下、颏下、枕部
  - E、颊、颌下、颏下、枕部、耳后、耳前、腮腺
- 7、正常人每日唾液总量为 1000~1500ml，其中腮腺和下颌下腺的分泌量占
  - A、50%

B、60%

C、70%

D、80%

E、90%

8、舌下腺囊肿穿刺可抽出

A、血液

B、蛋清样黏液

C、乳白色豆渣样分泌物

D、黄绿色清亮物质

E、黄绿色脓性物质

9、四头带临床上常用一段绷带，将其两端剪开一定长度，形成四个带头即可。带的长度一般为

A、35cm

B、50cm

C、70cm

D、80cm

E、100cm

10、涎腺分泌功能检查常选用的方法是

A、酸性物刺激测定

B、碱性物刺激测定

C、核磁共振检查

D、1天内自然分泌量

E、某一时段内自然分泌量测定

11、常用的局麻药物中，属于酯类的是

A、丁卡因

B、利多卡因

C、布比卡因

D、阿替卡因

E、甲哌卡因

12、临床上常用利多卡因进行表面麻醉的浓度是

A、0.25%~1%

B、0.5~1%


C、0.5%

D、1%

E、2%~5%

13、表浅的黏膜下脓肿切开引流，拔除松动的乳牙或恒牙，最常用的局麻方法是

A、涂布麻醉



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

- B、阻滞麻醉  
C、冷冻麻醉  
D、吸入麻醉  
E、低温麻醉
- 14、下列各选项中分布于上颌 87654|45678 腭侧牙龈及黏骨膜的神经是
- A、腭前神经  
B、眶下神经  
C、上牙槽后神经  
D、上牙槽中神经  
E、鼻腭神经
- 15、局麻药中加入血管收缩剂的作用中，除外的是
- A、加快局麻药吸收  
B、降低毒性反应  
C、延长局麻时间  
D、减少术区出血  
E、清晰术野
- 16、拔除上颌牙时，患者体位应是
- A、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面平行  
B、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成  $45^{\circ}$   
C、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成  $90^{\circ}$   
D、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成  $60^{\circ}$   
E、头部应稍后仰，张口时上颌（牙合）平面与地面成  $30^{\circ}$
- 17、不属于牙拔除术中并发症的一项是
- A、干槽症  
B、牙折断  
C、软组织损伤  
D、牙槽突骨折  
E、邻近软组织损伤
- 18、不属于拔牙的禁忌证的是
- A、不稳定的心绞痛  
B、充血性心力衰竭  
C、未控制的心律不齐  
D、未控制的高血压  
E、2年内发生过心肌梗死
- 19、牙拔除后至少多长时间，拔牙创内形成凝血块而将创口封闭
- A、5分钟  
B、10分钟  
C、15分钟

D、30 分钟

E、45 分钟

20、以下哪种情况需行系带矫正术

A、系带位置影响牙齿萌出排列

B、舌系带过短影响发音

C、唇系带过短影响唇的运动

D、系带影响义齿的就位和稳定

E、以上均需要

21、可影响种植体骨结合的因素是

A、患者全身及局部的健康状况

B、患者的牙槽突的质量

C、口腔卫生习惯

D、种植体的应力分布

E、以上均是

22、手术创伤对种植体的骨结合有一定的影响，由于钻孔产热过高，严格控制产热和散热，用骨钻钻孔时，速度不能超过

A、500r/min

B、1000r/min

C、1500r/min

D、2000r/min

E、2500r/min

23、急性冠周炎早期局部治疗应首先采用

A、拔除患牙

B、龈袋烧灼

C、龈袋冲洗上药

D、切开引流

E、开髓引流

24、下列哪个间隙感染扩散不会引起颞间隙感染（助理不考）

A、咬肌间隙

B、下颌下间隙感染

C、颊间隙感染

D、颞下间隙

E、翼下颌间隙

25、广泛的颊间隙感染引流切口应该在下颌骨下缘（助理不考）

A、0.5~1cm

B、0.3~0.5cm

C、1~2cm

D、2~3cm

E、2.5~3.5cm

26、慢性中央性颌骨骨髓炎病变比较局限者，死骨与周围组织分离的时间在发病后

- A、1~2周
- B、3~4周
- C、4~8周
- D、2个月以上
- E、半年以上

27、感染形成脓肿时面部肿胀明显，但脓肿难以自行溃破，不易发现波动感的间隙为

- A、咬肌间隙
- B、眶下间隙
- C、口底多间隙
- D、下颌下间隙
- E、颞间隙感染

28、新生儿颌骨骨髓炎的感染来源多为（助理不考）

- A、腺源性
- B、血源性
- C、损伤性
- D、牙源性
- E、医源性

29、以下哪一项最可能是引起颞间隙感染的来源（助理不考）

- A、下颌磨牙的根尖周脓肿
- B、化脓性扁桃体炎
- C、下牙槽神经阻滞麻醉消毒不严
- D、颞乳突炎
- E、第一前磨牙的根尖化脓性炎症

30、颌面部疔疖最常见的致病菌是

- A、白色念珠菌
- B、溶血性链球菌
- C、厌氧性链球菌
- D、铜绿假单胞菌
- E、金黄色葡萄球菌

31、下颌骨骨折的临床愈合所需时间

- A、4~6周
- B、5~7周
- C、6~8周
- D、7~9周

E、3个月

32、出血性休克的早期表现除外的是

- A、轻度烦躁
- B、口渴
- C、呼吸浅快
- D、皮肤苍白
- E、心率减慢

33、出现机体失代偿的表现是一般丢失的血容量已达到

- A、15%以下
- B、15%以上
- C、20%以上
- D、30%以上
- E、50%以上

34、LeFortIII型骨折是指

- A、锥形骨折
- B、下颌骨骨折
- C、上颌骨低位骨折
- D、上颌骨中位骨折
- E、上颌骨高位骨折

35、颌骨骨折的复位标准是

- A、骨性愈合
- B、纤维性愈合
- C、骨折线上的牙齿不松动
- D、恢复原有咬合关系
- E、无感染发生

36、脑挫裂伤意识障碍取决于

- A、损伤的部位
- B、损伤的程度
- C、损伤的时间
- D、周围的环境
- E、损伤的原因

37、运送昏迷患者可采用的体位是

- A、俯卧位
- B、仰卧位
- C、侧卧位
- D、头侧向一侧
- E、以上体位均可

38、X线表现呈“M”或“V”形，是哪一类型骨折的特征性表现

- A、上颌骨骨折
- B、下颌骨骨折
- C、眶底骨折
- D、颧弓骨折
- E、颅底骨折

39、颌面部创口初期缝合最宽时间为

- A、6h
- B、12h
- C、24h
- D、48h

E、大于 48h 的创口，只要没有明显的化脓，清创后仍可作初期缝合

40、牙槽突骨折后用牙弓夹板、金属丝等方法固定后，注意应至少跨过骨折线几个正常牙位

- A、2 个
- B、3 个
- C、4 个
- D、5 个
- E、6 个

41、牙龈瘤来源于

- A、牙周膜
- B、牙槽骨
- C、颌骨骨皮质
- D、牙龈上皮
- E、牙周膜及颌骨牙槽突的结缔组织

42、最易发生恶变的色素痣是（助理不考）

- A、皮内痣
- B、复合痣
- C、交界痣
- D、雀斑样色素痣
- E、毛痣

43、关于甲状舌管囊肿，哪一项是不正确的

- A、可发生于颈正中线上任何部位
- B、多见于 1~10 岁的儿童
- C、若囊肿发生于舌盲孔下面或前后部，可随吞咽上下移动
- D、不会发生癌变
- E、多无自觉症状

44、第二鳃裂囊肿常位于

- A、乳突附近

- B、下颌角附近
- C、颈前正中
- D、颈根部
- E、舌骨水平，胸锁乳突肌上 1/3 前缘附近

45、临床上最多见的鳃裂囊肿来源于

- A、第一鳃裂
- B、第二鳃裂
- C、第三鳃裂
- D、第四鳃裂
- E、胸腺咽管

46、单纯行刮除术后易复发的颌骨囊肿是

- A、根端囊肿
- B、角化囊肿
- C、始基囊肿
- D、含牙囊肿
- E、血管外渗性囊肿

47、颈淋巴转移率最高，且早期转移的肿瘤是

- A、舌癌
- B、唇癌
- C、颊癌
- D、牙龈癌
- E、上颌窦癌

48、来源于间叶组织的恶性肿瘤通常称为

- A、良性肿瘤
- B、恶性肿瘤
- C、肉瘤
- D、临界瘤
- E、瘤样病变

49、下列关于含牙囊肿的描述中，正确的是

- A、发生于牙冠或牙根形成之后
- B、可来自一个牙胚，含一个牙
- C、可来自多个牙胚，含多个牙
- D、含牙囊肿就是滤泡囊肿
- E、以上说法均正确

50、血管瘤其病程进入静止消退期一般是在

- A、出生以后
- B、1 年以后

C、2 年以后

D、3 年以后

E、4 年以后

51、腺样囊性癌常沿什么扩散（助理不考）

A、神经

B、淋巴结

C、血液

D、骨膜

E、筋膜

52、外伤后涎瘘的诊断主要通过

A、CT

B、MRI

C、ECT

D、B 超

E、造影

53、下颌下腺炎常见的原因是

A、淋巴结炎

B、冠周炎

C、牙槽脓肿

D、结石阻塞导管

E、血源性感染

54、较大的囊肿可将舌抬起，状似“重舌”，是哪种囊肿的特征性表现

A、舌下腺囊肿单纯型

B、舌下腺囊肿口外型

C、皮样囊肿

D、表皮样囊肿

E、囊性水瘤

55、唾液腺恶性肿瘤中最常见的是（助理不考）

A、沃辛瘤

B、多形性腺瘤

C、腺样囊性癌

D、黏液表皮样癌

E、以上说法均正确

56、慢性复发性腮腺炎腮腺造影 X 线表现为

A、导管移位，腺体内有充盈缺损

B、造影剂外溢呈团块状

C、导管中断，或圆形、卵圆形充盈缺损，其远心端导管扩张

- D、导管系统无异常改变或轻微扩张，末梢导管扩张呈点状、球状
- E、只有主导管分层状改变，没有末梢导管扩张
- 57、颞下颌关节急性脱位后限制下颌运动的固定方法可采用
- A、十字绷带包扎
- B、颅颌绷带包扎
- C、三角绷带包扎
- D、单眼绷带包扎
- E、四头绷带包扎
- 58、临床上最常见的颞下颌关节脱位是
- A、陈旧性脱位
- B、复发性脱位
- C、急性前脱位
- D、颞下颌关节强直
- E、不可复性关节盘前移位
- 59、关于不可复性关节盘前移位临床特点的叙述，哪项是错误的
- A、开口时下颌偏向健侧
- B、典型的关节弹响病史
- C、X线片显示关节前间隙增宽
- D、被动开口检查，开口度不能增大
- E、间断性关节绞锁史
- 60、颞下颌关节紊乱病是口腔颌面部常见病之一，以下列哪一年龄组患病率、就诊率最高
- A、15岁以内
- B、20岁以内
- C、20~30岁
- D、40~50岁
- E、50岁以上
- 61、下列属于三叉神经功能检查的是
- A、感觉功能
- B、角膜反射
- C、腭反射
- D、运动功能
- E、以上均是
- 62、哪项检查目的在于观察膝状神经节是否受损
- A、味觉检查
- B、听觉检查
- C、泪液检查
- D、有无面瘫

E、唾液分泌功能

63、贝尔面瘫与中枢性面瘫相鉴别的重要临床表现是

- A、眼睑闭合不全
- B、额纹消失，不能皱眉
- C、口角偏斜
- D、鼓腮不能
- E、鼻唇沟消失

64、对于原发性三叉神经痛有效的药物是

- A、卡马西平
- B、苯妥英钠
- C、氯硝西洋
- D、山莨菪碱
- E、以上均是

65、关于原发性三叉神经痛，下列哪项是错误的

- A、多为单侧发病
- B、可有“扳机点”存在
- C、疼痛呈阵发性、刀割样剧痛
- D、神经系统检查往往有阳性体征
- E、疼痛分布于三叉神经分布区域内

66、单侧唇裂形成的胚胎基础为

- A、一侧内侧鼻突与上颌突未联合
- B、两侧内侧鼻突未融合
- C、上颌突和下颌突未融合
- D、上颌突与外侧鼻突未融合
- E、下颌突与下颌突未融合

67、根据流行病学调查，新生儿唇腭裂的患病率大约为

- A、0.6:1000
- B、1.6:1000
- C、2.6:1000
- D、1.0:1000
- E、2.0:1000

68、目前，腭裂整复术多选择在

- A、3~6个月
- B、12~18个月
- C、6~12个月
- D、5~6岁
- E、8~12岁

69、以下有关腭裂临床表现中，不恰当的是

- A、吸吮功能障碍  
B、鼻腔内的分泌物可很自然地流入口腔  
C、易引起咽鼓管感染  
D、易发生中耳炎  
E、牙列正常
- 70、唇腭裂患儿要达到较满意的形态和功能效果，需进行序列治疗，一般包括（助理不考）  
A、心理治疗  
B、耳科治疗  
C、语音治疗  
D、唇、腭裂二期整复术  
E、以上均包括
- 71、目前唾液腺造影术可用于  
A、舌下腺及下颌下腺  
B、舌下腺及腮腺  
C、舌下腺  
D、腮腺及腭腺  
E、腮腺及下颌下腺
- 72、唾液腺造影的禁忌证是  
A、肿瘤  
B、慢性炎症  
C、涎瘘  
D、急性化脓性腮腺炎  
E、口干
- 73、颞下颌关节紊乱病关节盘诊断一般使用  
A、许勒位片  
B、关节造影  
C、开口位片  
D、锥形束 CT 片  
E、下颌横断（牙合）片
- 74、采用根尖片分角线投照技术显示被检查牙齿邻面影像重叠的原因  
A、投照垂直角度过大  
B、投照垂直角度过小  
C、X 线与被检查牙齿的邻面不平行  
D、X 线与被检查牙齿的邻面不垂直  
E、X 线中心线位置不正确
- 75、根尖片可显示下列哪种牙髓病变  
A、急性牙髓炎

- B、牙髓充血
- C、牙髓坏死
- D、牙内吸收
- E、以上都不是

76、华特位片用于协助诊断

- A、髁突骨瘤
- B、下颌骨肿瘤
- C、下颌骨颞孔
- D、颞下颌关节
- E、牙源性上颌窦炎

77、以下哪种病变 X 线片表现为根尖周圆形低密度透射区，边缘有一薄层密质白线

- A、急性根尖周炎
- B、慢性根尖脓肿
- C、根尖肉芽肿
- D、根尖囊肿
- E、牙骨质增生

78、可复性关节盘前移位时弹响杂音的特点

- A. 开口初期或开口初闭口末清脆单声弹响
- B. 开口末闭口初清脆单声弹响
- C. 多声破碎音
- D. 连续摩擦音
- E. 一般无弹响

79、牙颌面畸形的治疗包括（助理不考）

- A、术前正畸治疗
- B、确认手术计划
- C、正确施术
- D、完成术前准备
- E、以上都是

80、皮瓣移植后首先恢复的感觉是（助理不考）

- A、冷
- B、热
- C、痒
- D、痛
- E、以上都是

81、眶下神经阻滞麻醉口外注射法，注射针进入眶下孔内，注射麻药

- A、0.3~0.5ml
- B、0.5~1ml

C、1ml

D、1.5~2ml

E、2~3ml

82、在行下牙槽神经麻醉口内注射后，将注射针退出多少可行舌神经阻滞麻醉

A、退出 0.1cm

B、退出 0.5cm

C、退出 1.0cm

D、退出 1.5cm

E、退出 2.0cm

83、麻醉同侧下颌舌侧牙龈、黏骨膜、口底黏膜及舌前 2/3 部分，可行的阻滞麻醉方法是

A、眶下神经阻滞麻醉

B、颊神经阻滞麻醉

C、鼻腭神经阻滞麻醉

D、舌神经阻滞麻醉

E、腭前神经阻滞麻醉

84、颊长神经阻滞麻醉一般注射麻药量是

A、0.1ml

B、0.5~1ml

C、1.5~2ml

D、2.5ml

E、2~3ml

85、行口内注射行下牙槽神经阻滞麻醉后，针尖退至肌层、黏膜下时注射麻醉药可同时麻醉

A、颊神经

B、咬肌神经

C、下颌神经

D、鼻腭神经

E、腭前神经

86、下列再植牙成功的判断标准，除外的是

A、疼痛消失，无感染

B、X 线片示牙根无异常透射影

C、牙龈附着正常

D、行使功能达 7 年以上

E、牙齿无松动

87、安放拔牙钳放置时注意事项中，除外

A、手掌勿太接近关节部

B、钳喙的长轴必须与牙长轴垂直

- C、钳喙的位置必须在牙根部  
D、钳喙应紧贴牙面滑入牙颈部  
E、握钳时应握钳柄接近末端处
- 88、下列牙根拔除基本操作步骤，恰当的是  
A、根钳拔除法适用于高位残根  
B、如牙根断面是斜面，根挺应从斜面较高的一侧插入  
C、牙挺取根法适用于根的折断部位比较低，根钳无法夹住时  
D、牙挺取根法支点应为牙槽间隔，或腭侧骨板  
E、以上说法均正确
- 89、下列有关干槽症的治疗方法中，除外  
A、清创  
B、隔离外界刺激  
C、促进肉芽组织生长  
D、局部止血药物  
E、抗炎、止痛
- 90、下列不属于下颌第三磨牙阻生分类方法的是  
A、根据牙与下颌升支及第二磨牙的关系  
B、根据牙在骨内的深度  
C、根据牙龈覆盖阻生齿的程度  
D、根据阻生第三磨牙的长轴与第二磨牙的长轴关系  
E、可根据牙在正常牙列中线的位置
- 91、唾液腺黏液囊肿最常见的好发部位是  
A、上唇  
B、下唇  
C、腮腺  
D、舌下腺  
E、颌下腺
- 92、以下符合慢性阻塞性腮腺炎临床表现的是  
A、导管口流出混浊液体  
B、导管口流出黄色凝胶状液体  
C、导管口流出草黄色或草绿色液体流出  
D、导管口可有脓性或黏液脓性唾液流出  
E、导管口流出混浊的“雪花样”或黏稠的蛋清样唾液
- 93、有关急性化脓性腮腺炎治疗的说法中，错误的是  
A、可进行放射治疗  
B、可进行热敷  
C、可行切开引流

- D、可选用有效抗生素  
E、加强口腔卫生护理
- 94、关于急性化脓性腮腺炎病因的说法不包括
- A、主要致病菌是链球菌  
B、常见于腹部大手术后  
C、常见于高热或禁食的病员  
D、常见于体质虚弱、长期卧床的病员  
E、常见于急性传染病或脓毒血症的病员
- 95、下列不是“扳机点”在上颌支的部位的是
- A、眶下孔  
B、下眼睑  
C、鼻唇沟  
D、耳屏部  
E、鼻翼
- 96、三叉神经功能检查项目中不包括
- A、三叉神经分布区皮肤与黏膜的触、温、痛觉  
B、角膜反射  
C、腭反射  
D、希尔默试验  
E、咀嚼肌运动功能检查
- 97、下列关于“单侧完全性腭裂”的叙述，不恰当的是
- A、单侧完全性腭裂的裂隙自腭垂至切牙孔完全裂开  
B、裂隙斜向外侧直抵牙槽突  
C、裂隙与牙槽裂相连  
D、健侧裂隙缘与鼻中隔相连  
E、不会伴发同侧唇裂
- 98、进行单侧唇裂整复术最适合的年龄为
- A、出生后即刻  
B、1~2个月  
C、3~6个月  
D、7~12个月  
E、1~2岁
- 99、钝性分离最常使用的分离器械是
- A、锐性的手术刀  
B、手术剪  
C、血管钳  
D、刀柄


E、手指

100、下列关于引流物的放置时间的叙述中，正确的是

- A、无效腔的引流物应放置至脓液及渗出液完全消除为止
- B、污染创口引流物多在 24~48 小时后去除
- C、负压引流一般在 24 小时内引流量少于 20~30ml 时去除
- D、脓肿的引流物应放置至脓液及渗出液完全消除为止
- E、以上均正确



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM